

Helix pomatia Linnaeus, 1758; *Fruticicola fruticum* (Müller, 1774); *Trichia* (s.str.) *hispida* (Linnaeus, 1758); *Perforatella bidentata* (Gmelin, 1791); *Pseudotrichia rubiginosa* (A.Schmidt, 1853); *Euomphalia strigella* (Draparnaud, 1801).

МАТЕРИАЛЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ СЕРОГО ЖУРАВЛЯ (*GRUS GRUS* L.) В БРАСЛАВСКОМ РАЙОНЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузьменко В.В.

УО «ВГУ им. П.М. Машерова», г. Витебск, Беларусь, e-mail: kuvint@yandex.ru

Серый журавль (*Grus grus* L.) в Беларуси является редким гнездящимся, перелетным и транзитно мигрирующим видом [1], занесен в Красную книгу Республики Беларусь и ряд региональных Красных книг. Серый журавль очень пластичен и не связан с каким-то определенным типом ландшафта. Однако в гнездовое время он держится обязательно болотистых участков. В северной таежной части ареала такие участки журавли находят на обширных верховых и моховых болотах, южнее – в заболоченных, густо заросших ольшаником поймах крупных и средних рек, на юге – в зоне степей и лесостепи – в крупных озерных котловинах, занятых заболоченными лугами и тростниковыми зарослями. По озерным системам и поймам рек серый журавль заходит даже в полупустыни. В Западной Европе он может использовать даже небольшие заросшие тростником болота, расположенные среди сельскохозяйственных полей.

В Беларуси распространение его обусловлено наличием обширных заболоченных территорий, как правило, не затронутых мелиорацией и имеющих открытые участки, перемежающиеся с озерками и топями. Такие станции еще в значительной степени сохранились в северной Беларуси, а также в Полесской низменности республики, где и сконцентрировано большинство поселений этого вида.

В Западной Европе и России к концу 20 века численность серого журавля катастрофически сократилась, однако в настоящее время, благодаря природоохранным мерам, численность возросла и продолжает увеличиваться [2, 3]. В Беларуси в 50-70 г. прошлого века в результате осушительной мелиорации численность серого журавля резко сократилась. В последующие годы наблюдалась стабилизация и некоторое увеличение численности. К концу 20 в. популяция серого журавля в Беларуси оценивалась в 800-1500 тыс. гнездящихся пар [1].

В Белорусском Поозерье серый журавль встречается чаще на верховых, переходных и низинных болотах. Поскольку площади

нетронутых низинных и переходных болот в регионе незначительны, то основная масса серых журавлей обитает на верховых болотах, где они занимают краевые топкие переходные участки, осоково-тростниковые и сфагново-осоковые ассоциации близ озер и подмоховых ручьев, грядово-озерные комплексы. Сфагновые сосняки в качестве гнездовой станции выбираются редко и только в том случае, если есть мочажинные участки. Общая численность вида в Белорусском Поозерье оценивалась в 180-230 гнездящихся пар [4].

Проведенные нами исследования, а также специальное анкетирование среди работников лесохозяйственных хозяйств и государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь с целью учета мест обитания серого журавля позволили установить нам численность и биотопическое распределение вида в Браславском районе.

На территории района вид распространен более-менее равномерно. С зимовки прилетает рано, в третьей декаде марта, когда появляются первые проталины снега. Примечательно, что на пролете не образует больших скоплений. Обычно наблюдаются небольшие группы по 6-16 особей. Ввиду отсутствия крупных болотных массивов гнездится отдельными парами на небольших верховых болотах, заболоченных участках ольшаников, отдавая явное предпочтение заболоченным поймам рек и небольшим болотцам, расположенным посреди сельхозугодий. Потенциально численность серого журавля в Браславском районе составляет 50-60 гнездящихся пар, из них около 30 пар гнездится на территории национального парка «Браславские озера». В гнездовой период отмечается также от 7 до 30 особей неразмножающихся птиц.

Численность вида в районе и по Белорусскому Поозерью в целом стабильна, даже отмечается небольшое увеличение.

Литература

1. Никифоров М.Е., Козулин А.В., Гричик В.В., Тишечкин А.К. Птицы Беларуси на рубеже 21 века: статус, численность, распространение. - Минск: Н.А. Королев, 1997. - 188 с.
2. Журавли Евразии (распределение, численность, биология) Сборник научных трудов. Гл. редакция В. Морозов и др. – М., 2002. -304с.
3. BirdLife International/European Bird Census Council (2000) *European bird populations: estimates and trends*. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 10).
4. Ивановский В.В., Кузьменко В.В. Материалы к биологии серого журавля в Белорусском Поозерье// Сборник «Чтения памяти профессора Станчинского», Вып. 3. – Изд. Смоленского госпедуниверситета, 2000. – С. 199-201.