

# предисловіе.

Около тридцати леть назадь я выпустиль въ светь книгу подъ названіемъ: «Кометы и падающія звъзды» (С.-Петербургъ, 1881). Книги давно уже нътъ въ продажъ. Нъсколько разъ я собирался выпустить въ свъть второе изданіе, но каждый разь, когда принимался за дёло, приходиль къ заключенію, что въ прежнемъ видъ, хотя бы и исправленномъ, нельзя ее издать, а необходимо переработать всю книгу съ начала до конца. Открытія въ области кометь шли такъ быстро одно за другимъ, что только новое изложение предмета могло бы удовлетворить современному состоянію науки. Ръшившись выпустить въ свъть новое изданіе, я считаю долгомъ замътить, что отъ изданія 1881 года осталось всего нъсколько страниць; все же остальное написано вновь. Вследствіе этого я не призналь возможнымь обозначить на обложкъ «изданіе второе», хотя эти два слова всегда являются лестными для автора.

Въ началѣ прошлаго столѣтія падающія звѣзды не причислялись къ небеснымъ свѣтиламъ, а относились къ явленіямъ метеорологическимъ. Затѣмъ была уста-

новлена связь между падающими звъздами и кометами, и тогда же итальянскій астрономъ Скіанарелли издаль свои извъстныя письма «О кометахъ и падающихъ звъздахъ», переведенныя, между прочимъ, и на русскій явыкъ. Въ дальнъйшемъ же развитіи науки доказано, что между кометами и падающими звъздами нътъ качественнаго различія. Вотъ причина, почему я назвалъ свою книгу просто «Кометы», а не «Кометы и падающія звъзды», какъ въ 1881 году.

С. Глазенапъ.

## ВВЕДЕНІЕ.

Своею внѣшностью и неожиданнымъ появленіемъ кометы всегда производили сильное впечатлѣніе на людей. Во всѣ времена и почти во всѣхъ странахъ появленіе кометы разсматривалось, какъ предзнаменованіе какого-нибудь земного событія; оно приписывалось то счастью, то несчастью иногда отдѣльныхъ лицъ, иногда же цѣлаго народа, и это вполнѣ зависѣло отъ состоянія умовъ и отъ степени развитія людей.

Обыденныя небесныя явленія, какъ-то: восхожденіе и захожденіе Солнца, Луны и звъздъ, смъна весны льтомъ, льта осенью и т. д., совершаясь въ правильные извъстные промежутки времени, никого не удивляють и не поражають. Но какъ скоро на небъ происходить что-нибудь особенное, необыкновенное, т. е. замъчается необыденное небесное явленіе, то оно приковываеть взоры людей; они невольно обращають на него вниманіе и удивляются ему. Къ числу подобныхъ особенныхъ явленій принадлежить, несомнънно, появленіе большихъ кометь; эти свътила отличаются

особенною формою и имѣютъ иногда большіе, яркіе придатки, называемые хеостами или косами. Въ большинствѣ случаевъ кометы замѣчались тогда, когда уже достигали значительнаго блеска. Все это взятое вмѣстѣ съ субъективностью характера человѣка, въ глазахъ котораго земная жизнь, до самыхъ мельчайшихъ подробностей, тѣсно связана съ небесными явленіями,—служило къ тому, что неизвѣстная причина неожиданнаго появленія кометы переносилась безсознательно на земную жизнь и на земныя событія.

Рождались суевърія, вызывавшія страхъ и ужасъ. Къ счастью, миновали тъ времена, когда суевърія занимали видное мъсто въ жизни человъка. Вмъстъ съ образованіемъ исчезли суевърія, и кометы своимъ появленіемъ уже болъе не вызываютъ страха въ обществъ. Правда, отъ времени до времени еще появляется опасеніе передъ мыслью о возможности столкновенія Земли съ кометою, но въ большинствъ случаевъ оно вызывается искусственно и тотчасъ же разсъивается по выясненіи вопроса людьми науки. Я увъренъ, что у прочитавшихъ настоящую книгу никакого страха передъ появленіемъ кометь не будетъ; наоборотъ, они пожелаютъ, вмъстъ со мною, чтобы эти чудныя свътила почаще украшали звъздное небо и восхищали насъ своимъ днянымъ видомъ.

# 1. Видъ и размъры кометъ и ихъ косъ.

Своимъ внёшнимъ видомъ большія кометы рёзко отличаются отъ всёхъ другихъ свётилъ; онё не представляются яркими точками, какъ звёзды, и не имёютъ правильной формы круглаго или эллиптическаго диска, какъ Солнце, Луна или планеты; онё украшены хвостомъ или косою, особымъ придаткомъ, достигающимъ иногда пышной формы и значительной величины. Замёчательнёе всего то, что кометы совершенно прозрачны; сквозь нихъ видны самыя слабыя звёзды.

Слово комета означаеть свътило съ волосами, съ косою; древніе такъ и изображали кометы.

Косы являются характернымь признакомъ большихъ блестящихъ кометъ, но слабыя кометы, видимыя только въ телескопъ, бываютъ и безъ косъ и нохожи болъе на туманныя пятна, во множествъ наполняющія вселенную. Правда, по свидътельству лътописцевъ, иногда появлялись кометы безъ хвостовъ. Такая напримъръ, появилась въ 1585 году; она была блестящая и по яркости равнялась Юпитеру. Точно также вторая комета 1665 и комета 1682 г., по описаню очевидцевъ, были безъ косъ и будто бы совершенно круглыя. Но къ описаніямъ очевидцевъ того времени слѣдуеть относиться съ разборомъ.

Первая изъ этихъ кометъ наблюдалась до изобрътенія телескопа, а двъ послъднія — вскоръ послъ его



Рис. 1. Кометы по изображенію древнихъ.

изобрътенія, когда еще не научились владъть имъ для точныхъ наблюденій; поэтому едва ли можно утверждать, что кометы были безъ косъ; быть можеть, у кометь были слабыя косы, невидимыя просто глазомъ. У многихъ кометь косы появляются черезъ нъкоторое

время послѣ ихъ открытія и развиваются до громаднѣйшихъ размѣровъ только послѣ того, какъ комета прошла черезъ точку, лежащую всего ближе къ Солнцу и называемую перигеліемъ. Напримѣръ, комета 1682 г., о которой мы сейчасъ упомянули, не имѣла косы до 26 августа, а затѣмъ появилась коса, которая съ 29 числа того же мѣсяца разстилалась по




Рис. 2. Комета Донати 1858 г.

дугѣ въ 30 градусовъ. То же самое было и съ кометою 1585 г.: коса украсила ее лишь черезъ двѣ недѣли послѣ ея появленія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ коса, невидимая просто глазомъ, замѣтна въ бинокль пли телескопъ.

Итакъ, внъшнее отличіе кометъ, одаренныхъ косами, отъ другихъ свътилъ, въ высшей степени характерно. Впослъдствіи мы узнаемъ, что косы кометъ составляють одно изъ существенныхъ отличій этихъ свѣтиль.

Кометы им'йоть иногда простую, а иногда и двойную или сложную косу. Знаменитая большая комета Донати (рис. 2) им'йла двойную косу, а комета 1861 г.—сложную (рис. 3).

До открытія зрительныхъ трубъ, ВЪ XVII стольтія, были извъстны только большія кометы, видимыя просто глазомъ, а всв подобныя кометы, за весьма малыми исключеніями, одарены косами. Древніе всего бол'ве обращали вниманіе на косы кометь, и по ихъ виду раздёляли всё кометы на отдёльные типы. Некоторымъ типамъ приписывалось особенное вліяніе на земную жизнь. Въ числъ двънадцати типовъ или видовъ различныхъ кометъ, описанныхъ Плиніемъ, упоминается о дискообразныхъ, овальныхъ, стреловидныхъ, копьевидныхъ, на подобіе горящихъ лампъ, дротиковъ и проч.; во многихъ случаяхъ въ кометахъ какъ бы усматривались человъческія лица и головы животныхъ. Наибольшее вліяніе, по мнінію древнихъ, иміни дротиковидныя кометы.

Китайцы, которые съ самыхъ отдаленныхъ временъ заносили въ свои лѣтописи появленіе каждой кометы, давали косамъ кометъ довольно некрасивое названіе метлы. Китайцы имѣли понятіе только о кометахъ съ косами. Пингре, изучившій китайскую кометографію, приводить слѣдующее миѣніе китайскихъ ученыхъ о кометахъ безъ косы: «Если у нихъ нѣтъ косы, то, каковы бы ни были ихъ движенія, имъ давали просто названіе звѣзды, новой звѣзды или же

звъзды-гостьи, посъщающей провинціи. Вообще онъ находятся въ переднихъ комнатахъ небесныхъ дворцовъ и, будучи невидимыми, ожидаютъ тамъ приказанія выступить. Получивъ таковое, онъ становятся видимыми и отправляются въ путь. Если же во время странствованія подобная звъзда пріобрътала косу, то говорили, что она становилась коме-




Рис. 3. Сложная коса кометы 1861 г.

тою». Прибавимъ къ этому, что китайцы имѣли своеобразное понятіе о небесныхъ пространствахъ. По ихъ мнѣнію, «небо было государство, состоящее изъ королевствъ и провинцій. Созвѣздіями были провинцій, въ которыхъ правителями были планеты; затѣмъ звѣзды были министрами, а кометы—гонцами. Планеты отъ времени до времени отправляли гонцовъ-кометъ для посѣщенія отдѣльныхъ провинцій

и для возстановленія въ нихъ норядка; но все, что случалось тамъ наверху, было или причиною, или предсказаніемъ того, что должно было произойти внизу, на Землъ».

Современные астрономы различають въ кометь голову и косу (хвость). Въ головъ различають ядро—центральную свътлую точку, окруженную менъе яркимь веществомь. Не всъ кометы имъють ръзко выраженное ядро; въ иныхъ замъчается только слабое, не вполнъ отчетливое сгущение свъта въ срединъ головы; всего чаще это бываеть у телескопическихъ кометь, невидимыхъ просто глазомъ; у большихъ же кометь ядро всегда ясно выдъляется.

Коса или вполнѣ, или отчасти охватываетъ голову кометы и всегда направлена въ сторону, противоположную Солнцу.

Видъ кометныхъ косъ, ихъ образованіе и развитіе составятъ предметъ отдёльной главы; здёсь же мы приведемъ размёры косъ нёкоторыхъ большихъ кометъ. Читатель увидить, что за громадные придатки составляютъ косы кометъ.

По отношенію къ ихъ размърамъ необходимо различать видимыя и истинныя величины.

Видимая величина косы кометы, какъ и всякаго предмета вообще, измъряется угломъ, подъ которымъ усматривается предметъ. Величина угла опредъляется числомъ градусовъ, въ немъ заключающихся; при этомъ принимается, что прямой уголъ содержитъ 90 градусовъ. Предметы, усматриваемые подъ однимъ и тъмъ же угломъ, или, какъ обыкновенно говорятъ, имъюще одну и ту же угловую величину, но нахо-

дящіеся на различныхъ разстояніяхъ, имѣютъ различную величину, зависящую прямо отъ этого разстоянія. Такъ, напримъръ, если двъ горы усматриваются подъ угломъ въ 12° и притомъ дальняя гора въ два раза дальше, чъмъ ближайшая, то первая въ два раза выше второй. Зная же, какъ высока ближайшая къ намъ гора, мы можемъ разсчитать, какъ высока и вторая.

Въ примънени къ косамъ кометъ задача усложняется еще тъмъ, что коса можетъ лежать не перпендикулярно къ лучу зрънія, а подъ болъе или менъе острымъ угломъ, величину котораго одними наблюденіями нельзя опредълить. Опредълить этотъ уголъ можно только въ томъ случаъ, если извъстна орбита кометы, т. е. тотъ путь, по которому она движется.

Истинные размъры косъ кометь выражаются въ километрахъ. Въ слъдующей таблицъ приводятся размъры косъ нъкоторыхъ большихъ кометь.

				Видимая величина косы въ градусахъ.		Истинная величина косы.		
Комета		1618	II		$104^{\circ}$		80 000 000	килом.
	<b>»</b>	1680			90		240 000 000	) »
	<b>»</b>	1744			<sup>-</sup> 24		30 000 000	) »
	<b>»</b>	1769			97		64 000 000	) » _
	<b>»</b>	1811	I		25		176 000 000	) »
	<b>»</b>	1843	Ι.		65	7	320 000 000	) »
	<b>»</b>	1858	VI		64		88 000 000	) » ·
٠,٠	>>	1860	III		15		35 000 000	) , »
	>> ⋅	1861	II		118		68 000 000	) »

Необходимо еще замѣтить, что видимая величина косы зависить отъ многихъ причинъ, напримъръ, отъ чистоты неба, отъ его освъщенія, отъ зоркости наблюдателя, отъ силы трубы и проч. Для жителей съверныхъ широтъ кометы, появляющіяся літомъ, вовсе невидимы, или же имъють весьма слабую косу; тъ же кометы, но на югъ, видны съ прекрасною большою косою. Мы приведемъ слъдующій, не лишенный интереса, фактъ; въ Парижъ комета 1759 года была видна почти безъ косы; съ большимъ трудомъ можно было замътить ея слъды въ два или три градуса, между тымь какь вы Монпелье отчетливо видыли красивую косу въ 25 градусовъ. То же самое было и съ другими кометами. Напримъръ, комета 1881 года въ лътніе мъсяцы была едва видна въ Петербургъ, въ Твери же она была хорошо видна и имъла небольшую косу, а на югв Россіи она ярко сіяла надъ небосклономъ и обладала большою отчетливою косою. Комета Даніеля 1907 г. прошла совершенно незам'вченною на съверъ; на югъ же она блистала, и многіе любители астрономін наблюдали ее.

Изъ приведенной на стр. 9 таблицы можно видъть, что размъръ косы бываетъ иногда больше средняго разстоянія отъ Земли до Солнца, равнаго 149 мил. килом. Своими громадными размърами косы кометъ превосходятъ всъ свътила Солнечной системы; онъ даже превосходятъ само Солнце. И несмотря на такую чудовищную величину, коса не отпадаетъ отъ кометы, а всегда идетъ неразрывно вмъстъ съ пею, повинуясъ въковъчнымъ законамъ природы. Во многихъ случаяхъ и голова кометы достигаетъ весьма значитель-

ныхъ размёровъ. Мы приведемъ нёсколько примёровъ, по которымъ читатель можетъ судить, какихъ размёровъ кометы.

Комет	ы.		ръ головы меты.
1847	V	28 80	0 килом
1847	I	40 80	)0 »
1849	II	81 60	)0 »
1843	I	152 00	)0 »
1846	III Брорзена	208 00	)0 »
1770	Лекселя	326 00	)0 °»
1846	I	389 00	)0 »
1780	L	430 00	)0 »
1828	Энке, 28 окт.	520 00	)0 »
1835	Галлея	570 00	)0 »
1811	I	- 180000	)0 »

Размѣры головы кометы не могуть быть измѣрены съ такою же точностью, какъ размѣры планеть; очертанія кометы не такъ отчетливы, какъ планеты, и вѣреятно, мы не видимь наружныхъ краевъ головы кометы, такъ какъ блескъ головы по направленію къ краямъ постепенно уменьшается, и контуръ свѣтила представляется неяснымъ; вслѣдствіе этого приведенные размѣры, несомнѣнно, меньше дѣйствительныхъ.

Крупные размъры кометь могуть дать намъ ключь къ уясненю ихъ природы. Мы вернемся къ этому вопросу, по здъсь замътимъ, что плотность кометнато вещества должна быть очень малая, иначе

кометы при своихъ громадныхъ объемахъ обладали бы настолько большими массами, что передъ ними само Солнце казалось бы крошкою, и всѣ планеты стали бы обращаться вокругъ кометы, а не Солнца. Ничего подобнаго однако не бываетъ, а потему мы утверждаемъ, что плотностъ кометнаго вещества весьма малая, и вообще строеніе кометы должно быть совершенно особенное, отличное отъ того, что мы знаемъ по отпошенію къ планетамъ, спутникамъ и звѣздамъ.




Рис. 4. Телескопическая комета Энке.

#### 2. Кеплеръ и его законы движенія планетъ.

Я увъренъ, что немногимъ читателямъ настоящей книги привелось наблюдать большую блестящую комету; кому удалось наблюдать и слъдить за кометою изо дня въ день, тоть могь замътить ея быстрыя перемъщенія по небесному своду. То же самое замъчается и у слабыхъ телескопическихъ кометь. Видимыя движенія ихъ очень сложны и своеобразны; кометы перемъщаются по небесному своду значительно быстръе, чъмъ планеты. Если планетамъ дали названіе блуждающихъ звъздъ, то кометамъ слъдовало бы датьболъе характерное названіе. При изученіи движенія кометь мы будемъ сравнивать ихъ съ движеніемъ планетъ.

Познать истинное движеніе планеть было не легко. Черезъ двадцать стольтій посль построенія въ Александріи знаменитой Птоломеевой системы міра удалось только генію великаго Коперника уяснить видимыя движенія планеть, и еще позднье—Кеплеру—открыть законы ихъ истиннаго движенія. Разгадать же истинныя движенія кометь было несравненно труднье: постичь ихъ не могли ни Коперникъ, ни

Кеплеръ, такъ они казались запутанными. Кеплеръ полагалъ, что всѣ кометы приближаются къ Солнцу по прямой линіи и затѣмъ такимъ же точно образомъ удаляются отъ него.

Кеплеръ, изучая движение планетъ, открылъ слъдующие три закона, носящие его имя.

- 1. Всѣ планеты движутся по эллипсамъ, въ одномъ изъ фокусовъ котораго находится Солнце. Плоскость эллипса проходитъ черезъ центръ Солнца.
- 2. Площади, описываемыя радіусомъ-векторомъ иланеты, пропорціональны временамъ.
- 3. Квадраты временъ полныхъ обращеній планетъ вокругъ Солнца пропорціональны кубамъ ихъ среднихъ разстояній отъ него или кубамъ большихъ полуосей ихъ орбитъ.

Законы Кеплера имѣли большое значеніе для развитія всѣхъ физическихъ наукъ; ихъ открытіе обезпечило открытіе цѣлаго ряда другихъ явленій и законовъ природы. Со времени Кеплера начался расцвѣтъ наукъ, не прекращающійся и до настоящаго времени.

Іоаннъ Кеплеръ родился въ Магштадтъ возлъ Вейла, въ Вюртенбергъ, 27 декабря 1571 года—спустя 28 лътъ послъ смерти Коперпика. Наука обязана ему открытіемъ только-что перечисленныхъ законовъ движеніл планетъ, принимаемыхъ всъмн учеными за великіе законы природы; но не одни эти законы унаслъдовали отъ него астрономы и естествоиспытатели; онъ указалъ намъ на аналитическій методъ изученія неизвъстныхъ явленій,—методъ, широко примъняемый во всъхъ современныхъ наблюдательныхъ наукахъ.



Рис. 5. Іоаннъ Кеплеръ (1571-1630).

Родители Кеплера были бѣдные, разорившіеся дворяне и жили въ вѣчныхъ между собою раздорахъ, что, конечно, неблагопріятно отзывалось на подрастающемъ Кеплерѣ. Будучи слабаго здоровья, онъ не могъ помогать отцу въ его хозяйствѣ, и это обстоятельство

спасло Кеплера отъ житейскаго гнета и дало ему возможность проявить свой геній и всю силу своего ума. Родители рѣшили, что онъ пригоденъ только для церковной службы, и 13 лѣтъ его отдали въ Мольбронскую протестантскую семинарію; его охотно приняли, такъ какъ въ то время уже просвѣщеніе считалось необходимою задачею государства, въ особенности въ протестантскихъ провинціяхъ Германіи. Ректоръ Мольбронскаго университета говорилъ: «свѣтъ управляется головою, а не рукою; необходимо, слѣдовательно, имѣть образованныхъ людей, а подобные плоды не растутъ на деревьяхъ» 1). Эта знаменательная мысльбыла высказана 300 лѣтъ назадъ, когда въ Россіи еще не было ни одного университета.

Послѣ окончанія ученія въ Тюбингенской семинаріи онъ получиль прекрасную и похвальную аттестацію въ элоквенціи и въ способностяхъ, но не признанъ достойнымъ для занятія должности священнослужителя. Онъ былъ приглашенъ профессоромъ математики въ нормальную школу въ Грецѣ, въ Штиріи. Съ этого времени начинается его плодотворная научная дѣятельность.

Первое научное сочинение Кеплера, озаглавленное «Mysterium Cosmographicum», обратило внимание ученыхъ; въ немъ уже высказывается мысль о третьемъ законъ движения планеть, опредъляющемъ зависимость между періодами обращения планеть вокругъ Солнца и ихъ разстояниями отъ него.

Въ этомъ сочинении Кеплеръ восхищается астроно-

<sup>1)</sup> I. Bertrand. «Les fondateurs de l'Astronomie». Paris, p. 117.

міей. «Счастливъ, — говорить онъ, — кто можеть изучать небо; творенія Бога для него выше всего, и ихъ изученіе доставить ему самое чистое счастье».

Послъ смерти эрцгерцога Карла, относившагося весьма либерально къ протестантамъ, сынъ его Фердинандъ сталъ искоренять «протестантскую ересь» и изгонять всъхъ протестантовъ. Сначала Кеплера оставляли въ поков, но затъмъ и на него посыпались гоненія, и Кеплеръ впаль въ бъдность. Въ это время въ Прагъ императорскимъ астрономомъ былъ знаменитый Тихонъ Браге, который и призвалъ къ себъ Кеплера. Хотя ему объщали выдавать приличное жалованье, но вслёдствіе разстроенныхъ финансовъ Кеплеръ, не получая жалованья, иногда по цълымъ годамъ терпълъ страшную, невообразимую нужду. Последняя усиливалась еще и отъ того, что онъ быль обремененъ большою семьею. Съ удивительнымъ смиреніемъ Кеплеръ покорялся судьбъ и углублялся въ свои астрономическія изслідованія, переживая иногда полныя счастья минуты жизни. Благородный Тихонъ Браге выручаль иногда Кеплера изъ бъдственнаго положенія.

Послъ смерти Тихона Браге Кеплеру достался титулъ императорскаго астронома, а вмъстъ съ нимъ и всъ наблюденія Тихона Браге, а эти наблюденія составляли самое драгоцьное наслъдіе для Кеплера. Какъ и Тихонъ Браге, Кеплеръ пользовался вниманіемъ императора Рудольфа и могъ всецьло предаваться наукъ. За это время онъ открываеть свои великіе законы движенія планеть. Со смертью Рудольфа условія измънились: обсерваторія въ Регенсбургъ с. п. главеналъ.





была заброшена, Кеплеръ остался безъ средствъ и опять сталъ терпъть сильную нужду. Но законы уже были открыты, книга написана и стала достояніемъ науки.

Въпятой книгѣ его «Гармоники» (Harmonices mundi, libri quinque) изложенъ третій законъ, который достался Кеплеру всего труднее и надъ которымъ всего дольше ему пришлось работать. Книга заканчивается слъдующими словами, ярко рисующими личность великаго астронома: «Восемь мъсяцевъ прошло съ тъхъ поръ, какъ я замътилъ первое мерцаніе свъта, три мѣсяца-съ тѣхъ поръ, какъ занялась заря, и только нъсколько дней съ тъхъ поръ, какъ взошло надо мною ясное солнце, самое яркое, какимъ я когда-либо любовался. Ничто не удерживаетъ меня. Я увлеченъ священнымъ восторгомъ! Я восторжествую надъ человъчествомъ честнымъ сознаніемъ, что похитилъ золотые сосуды египтянъ съ цълью воздвигнуть скинію для Бога живаго далеко за предвлами Египта. Если ты простишь мить-я возрадуюсь; если прогитвишься-я вынесу это. Кости брошены; книга написана. Прочтуть ли ее теперь или прочтеть ее потомство, -мнъ все равно. Она можеть ждать себъ читателя цълое столътіе, ибо и Господь шесть тысячь лътъ ждаль наблюдателя».

Бѣдность, въ которой жилъ Кеплеръ, —говоритъ Д. Брюстеръ въ жизнеописании Ньютона, —составляетъ разительную противоположность съ тѣми заслугами, которыя онъ оказалъ наукѣ. Пепсія, которою онъ существовалъ, всегда выдавалась послѣ продолжительныхъ проволочекъ, и хотя три государя, царствованія которыхъ украшалъ Кеплеръ, постоянно

приказывали своимъ министрамъ какъ можно аккуратнъе выплачивать причитавшіяся ему деньги, однако же неисполненіе этихъ приказаній было источникомъ ностоянныхъ огорченій для Кеплера. Когда онъ удалился въ Силезію, чтобы провести тамъ остатокъ своихъ дней, денежныя дѣла его еще болѣе запутались. Нужда, наконецъ, принудила его лично хлопотать о недоплаченныхъ ему суммахъ, и потому въ 1630 г., почти на шестидесятомъ году своей жизни, онъ поѣхалъ въ Регенсбургъ; но вслѣдствіе истощенія отъ продолжительнаго путешествія верхомъ на лошади, получилъ лихорадку, которая и прекратила дни его 1).

Вернемся къ разсмотрѣнію законовъ Кеплера. Намъ необходимо ихъ разсмотрѣть, такъ какъ законы Ньютона являются обобщеніями законовъ Кеплера, а кометы, какъ показали наблюденія, движутся по законамъ Ньютона.

Начнемъ съ перваго закона.

Всѣ планеты движутся по эллипсамъ, въ фокусѣ которыхъ находится Солнце. Эллипсы—это плоскія замкнутыя линіп, похожія на овалы; у нихъ есть центръ, дѣлящій пополамъ всѣ линіп, проходящія черезъ него и называемыя діаметрами; у круга всѣ діаметры равны между собою, у эллипса же—различной длины; наибольшій изъ нихъ называется большою осью, а наименьшій—малою. Видъ эллипса опредѣляется величиною эксцентриситета, т.-е. отношеніемъ

<sup>1) «</sup>Небесныя свътила» О. М. Митчеля, переводъ съ англійскаго Андрея Мина. Москва. 1868, стр. 368.

длины линіи между фокусами къ большой оси; чѣмъ больше это отношеніе, тѣмъ болѣе вытянуть эллипсъ и наоборотъ—чѣмъ оно меньше, тѣмъ болѣе эллипсъ приближается къ кругу, эксцентриситеть котораго равень нулю. Фокусы—это двѣ точки, лежащія внутри эллипса на большой оси; онѣ отличаются слѣдующимъ замѣчательнымъ свойствомъ; для каждой точки одного и того же эллипса сумма ея разстояній отъ обоихъ фокусовъ есть величина постоянная. Напримѣръ, если разстояніе какой-нибудь точки М эллипса (рис. 6) отъ




Рис. 6. Эллипсъ и его свойства.

одного фокуса равно 5 сантим., а отъ другого—3, такъ что сумма ея разстояній отъ фокусовъ равна 8 сантим., то сумма разстояній всякой другой точки эллипса отъ обоихъ фокусовъ будетъ равняться 8 сантим.

Къ изложеннымъ свой-

ствамъ прибавимъ еще, что элдипсы суть плоскія линіи, т.-е. онъ всъми своими точками совмъщаются съ плоскостью; фокусы и центръ лежатъ въ той же плоскости. Такъ какъ планеты движутся по элдипсамъ, въ одномъ изъ фокусовъ которыхъ лежитъ Солнце,—мы заключаемъ, что ихъ движеніе происходитъ въ плоскостяхъ, проходящихъ черезъ пентръ Солнца.

Первый законъ Кеплера о движеніи планеть по эллипсамъ является весьма важнымъ и основнымъ; онъ имъетъ не только научное, но и практическое значеніе. Если нъкоторая планета, а въ томъ числъ и Земля.

обращается вокругъ Солнца въ данной плоскости, описывая эллипсъ, то, въ предълахъ незначительныхъ періодическихъ уклоненій, называемыхъ возмущеніями, она въчно будеть въ ней обращаться. Этотъ законъ наблюдается нами ежедневно на многихъ земныхъ явленіяхъ. Напримъръ, круглый дискъ, приведенный во вращательное движеніе въ вертикальной плоскости и брошенный по нъкоторому направленію, продолжаетъ катиться (вращаясь) въ той же вертикальной плоскости и въчно вращался бы въ ней, если бы не встръчаль на своемъ пути тренія и сопротивленія.

Второй законъ имъетъ еще болъе общее значение; онъ изложенъ Кеплеромъ следующимъ образомъ; площади, описываемыя радіусомъ-векторомъ планеты, пропорціональны временамъ. Радіусомъ-векторомъ называется разстояніе отъ планеты до Солнца. Если первый законъ опредъляеть видъ линій, по которымъ движутся планеты, то второй-какимъ образомъ совершается ихъ движеніе вокругъ Солнца. Сущность закона пояснимъ на примъръ; представимъ себъ, что все пространство отъ Солнца до пути Земли обтянуто сукномъ; разсмотримъ положение Земли въ два послъдовательныхъ воскресенья и разръжемъ сукно по направленію отъ Земли до Солнца въ то и другое воскресенье; мы получимъ площадь, которую радіусь-векторъ Земли опишеть въ течение недели. Второй законъ Кеплера состоить въ томъ, что гдѣ бы мы ни выръзали подобную площадь, описанную радіусомъ-векторомъ Земли въ одну недълю, ея величина всегда будетъ одна и та же, т.-е. число квадратныхъ единицъ, въ ней заключающихся, будеть всегда одно и то же <sup>1</sup>). Законъ этотъ справедливъ для всёхъ планетъ и указываетъ намъ, что каждая планета движется тёмъ медлените, чъмъ дальше она отстоитъ отъ Солнца.

На рис. 7 изображены равновеликія илощади, описанныя радіусомъ-векторомъ въ равныя времена. Когда иланета вблизи Солнца, радіусъ-векторъ быстро




Рис. 7. Второй законъ Кеплера.

мъняетъ свое положеніе, а когда она далеко отъ Солнца, онъ медленно измъняетъ свое положеніе; въ первомъ случать получается площадь съ большимъ угломъ растворенія при Солнцъ, а во

второмъ—съ малымъ угломъ; въ первомъ случав планета движется быстро, а во второмъ—медленно.

На основаніи второго закона Кеплера мы утверждаемь, что площадь, описанная радіусомъ-векторомъ планеты въ двое сутокъ, въ два раза больше, чѣмъ описанная въ однъ сутки; въ трое сутокъ въ три раза больше и т. д. Съ другой стороны, если Земля совершаетъ полное обращеніе вокругъ Солнца въ одинъ годъ, заключающій въ себъ 365,256 дней, то въ такое

<sup>1)</sup> Очень хорошее изложение законовъ Кеплера читатель найдетъ въ сочинении адмирала С. И. Зеленато «Лекции популярной астрономи», С.-Петербургъ, 1844 г., и въ соч. Митчеля: «Небесныя свътила» въ переводъ Мина, Москва, 1868 г.

же время она совершить и всѣ будущія обращенія, какъ бы далеко они ни отстояли отъ настоящаго. Наконецъ, тотъ же законъ представляеть возможность вычислить положеніе планеты для любого прошлаго или будущаго момента. Второй законъ Кеплера дозволяеть намъ заглянуть въ далекое прошлое планеть и въ ихъ отдаленное будущее.

Не легко дались Кеплеру его законы. Многіе годы онъ трудился надъ доказательствомъ ихъ справедливости; особенно ему пришлось много трудиться надъ третьимъ закономъ, опредъляющимъ зависимость между средними разстояніями планетъ отъ Солнца и временемъ ихъ обращенія вокругъ него. Послѣ многихъ испытаній, онъ пришелъ въ 1618 году къ открытію третьяго закона, изложеннаго имъ въ слѣдующихъ словахъ: «квадраты временъ полныхъ обращеній планетъ вокругъ Солнца пропорціональны кубамъ ихъ среднихъ разстояній отъ него».

Среднимъ разстояніемъ планеты отъ Солнца называется большая полуось описываемаго планетою эллипса. Кеплеръ тогда только объявилъ объ открытіи третьяго закона движенія планеть, когда онъ провърилъ его для всёхъ планетъ. Напримъръ, Юпитеръ отстоитъ въ 5,203 раза дальше отъ Солнца, чъмъ Земля, и совершаетъ свое полное обращеніе въ 4332,59 сутокъ тогда какъ Земля—въ 365,26 сутокъ. По третьему закону мы должны имъть;

 $(5,203)^3:1^3=(4332,59)^2:(365,26)^2$ 

Сдѣлавъ вычисленіе, мы убѣждаемся, что первая часть отношенія тождественно равна второй и обѣ равны 140,8 <sup>1</sup>).

Съ помощью третьяго закона Кеплера является возможность измърять разстоянія между небесными свътилами, если періоды обращенія свътиль намъ извъстны, а это имъеть большое значеніе, такъ какъ времена обращеній наблюдаются съ большою точностью, тогда какъ разстоянія не могуть быть непосредственно измъряемы. Если, напримъръ, мы знаемъ, что нъкоторое свътило совершаеть полное обращеніе свое вокругъ Солнца въ 82,93 года, то среднее его разстояніе отъ Солнца или большая полуось описываемаго эллипса опредълится по третьему закону Кеплера слъдующимъ образомъ;

$$a^3:1^3=(82,93)^2:1^2$$

откуда

$$a = \sqrt[3]{(82,93)^2} = 19,0$$

Такимъ образомъ съ помощью третьяго закона Кеплера мы узнали, что разсматриваемая точка, описывающая орбиту въ 82,93 года, движется по эллипсу, большая полуось котораго въ 19 разъ больше средняго разстоянія отъ Земли до Солнца.

<sup>1)</sup> Вычисленія подобнаго рода всего проще и удобн'я производить съ помощью логариемических таблицъ. Я позволю себ'я рекомендовать изданныя мною «Таблицы логариемовъ съ пятью десятичными знаками». С.-Петербургъ, книжный магазинъ Новаго Времени (Невскій, 40).

## 3. Ньютонъ и законъ всемірнаго тяготѣнія.

Начертавъ законы движенія планетъ, Кеплеръ не могъ уяснить себъ движеніе кометъ; оно осталось для него загадкой. Ръшеніе вопроса выпало на долю величайтаго генія всъхъ временъ и народовъ—безсмертнаго Ньютона.

Ньютонъ родился 25 декабря 1642 году въ маленькой деревенькъ Вульсториъ, въ Линкольншайръ. Рождественскому мальчику, родившемуся слабенькимъ, дали имя Исаака; онъ былъ очень слабъ, и мать не думала, что онъ выживетъ; но благодаря уходу и заботамъ своей бабушки мальчикъ поправился здоровьемъ, кръпъ и развивался физически, а затъмъ подарилъ свъту свои міровые законы природы. Ньютонъ получилъ высшее образованіе въ Кембриджскомъ университетъ и тамъ же былъ по окончаніи курса профессоромъ математики. Ньютонъ—гордость и слава Кембриджскаго университета; этотъ университетъ имъетъ своего представителя въ парламентъ; Ньютонъ, конечно, былъ избранъ представителемъ университета.

Открытіе законовъ тяготънія явилось плодомъ многольтнихъ научныхъ изысканій, а не случайнаго на-

блюденія надъ паденіемъ яблока, какъ полагають нѣкоторые историки. Въ теченіе 16 лѣтъ рукопись его, названная «Philosophiae naturalis Principia mathematica», не отдавалась въ печать только потому, что провѣрка закона не давала такого согласія, которое въ глазахъ Ньютона могло считаться за достаточно точное. Онъ рѣшилъ обнародовать свои «Principia» послѣ того, какъ новое измѣреніе радіуса Земли, произведенное французскимъ академикомъ Пикаромъ, указывало на удовлетворительное согласіе между наблюденіями и теоріей Ньютона; это было въ іюнѣ 1682 года.

Законъ тяготенія состоить въ следующемь:

Всѣ матеріальныя частицы взаимно тяготѣютъ съ силою, прямо пропорціональною ихъ массамъ и обратно пропорціональною квадрату отдѣляющаго ихъразстоянія.

На основаніи этого закона тіло, имінощее массувь два раза большую, чімь другое, притягиваеть къ себів тіла въ два раза сильніве, если, конечно, разстояніе между тілами въ обоихъ случаяхъ одно и то же. При изміненіи же разстоянія сила тяготінія между тілами изміняется, и притомъ, если разстояніе увеличивается, наприміръ, въ 2 раза, то тяготініе уменьшается въ 4 раза (2²); если разстояніе увеличивается въ 3 раза, то тяготініе уменьшается въ 9 разъ (3²); при уменьшеніи же разстоянія тяготініе увеличивается, какъ квадрать уменьшающагося разстоянія.

Затъмъ изъ законовъ механики, составляющихъ основу современной науки, Ньютонъ далъ намъ слъдующее:




Рис. 8. Исаакъ Ньютонъ (1642-1727).

- 1. Если нѣкоторое тѣло находится въ покоѣ, и на него не дѣйствуютъ никакія внѣшнія силы, то оно вѣчно будетъ находиться въ покоѣ.
- 2. Если тъло движется съ нъкоторою скоростью и въ нъкоторомъ направлении, и на него не дъйствуютъ никакія внъшнія силы, то оно будетъ въчно двигаться прямолинейно и съ равномърною скоростью.

Въ первомъ случав нътъ никакихъ основаній, чтобы тъло вышло изъ состоянія покоя, а во второмъ,—чтобы оно измѣнило скорость своего движенія или направленіе; поэтому первое тъло останется въ покоѣ, а второе будетъ двигаться равномѣрно и прямолинейно.

Помимо закона тяготънія, Ньютономъ сдъланъ цълый рядъ открытій въ физикъ и астрономіи, и онъ по праву считается основателемъ современныхъ физикоматематическихъ наукъ.

Разсмотримъ здёсь изследованія Ньютона по отношенію къ движенію кометь.

Ньютонъ не опредъляль изъ наблюденій видъ той линіи, по которой совершается движеніе кометы; если бы онъ поступилъ такимъ образомъ, то онъ шелъ бы по тому же пути, по которому шли его предшественники, и едва ли бы ръшилъ задачу. Онъ избралъ другой путь: онъ доказалъ, что подъ дъйствіемъ открытаго имъ закона тяготънія матеріальныя точки (или тъла) могутъ двигаться по всъмъ линіямъ коническаго съченія, т.-е. по эллипсамъ, по кругамъ, по прямой линіи, по параболъ и, наконецъ, по гиперболъ.

Слова «линін коническаго съченія» звучать какъто страшно, напоминая о сухой математикъ, и я увърень, что многіе изъ читателей сложать книгу на

этомъ мѣстѣ и далѣе читать ее не будуть; въ дѣйствительности же эти линіи вовсе не страшны; онѣ принадлежатъ къ самой занимательной части геометріи; онѣ составляють поэзію математики, и я прошу, выражансь стариннымъ русскимъ слогомъ, Богу милаго читателя дочитать до конца настоящую главу.

Всмотритесь въ нарисованный здѣсь конусъ съ круговымъ основаніемъ (рис. 9). Вершина конуса находится въ точкѣ A; конусъ двуполый и образовался вращеніемъ прямой линіи около вершины A и скользящей по кругу  $\Gamma K$ .

Проведите мысленно плоскость параллельно основанію п слѣдовательно перпендикулярно къ оси конуса; вы замѣтите, что въ сѣченіи получится кругь. Исключеніе будеть только въ томъ случаѣ, когда плоскость пройдеть черезъ вершину конуса A.




Рис. 9. Коническія сѣченія.

Если вы разсъчете конусъ плоскостью, не перпендикулярною къ его оси и не параллельною ей, и не параллельною производящей AK, то въ съчении получится эллипсъ EE. Если поставите плоскость съчения параллельно производящей AK, то получится парабола линія съ безконечными, никогда и нигдъ не сходящимпся вътвями  $\Pi\Pi$ . Матеріальная точка или свътило, двигаясь по параболъ, никогда обратно не вернется; оно уйдеть въ безконечныя пространства вселенной. Подобное свътило, обогнувъ Солнце, будетъ въчно удаляться отъ него и по прошествіи милліона или милліоновъ лътъ можетъ приблизиться къ одной изъ звъздъ вселенной и, описавъ вокругъ нея другую параболу, удалиться отъ нея такъ же точно, какъ оно удалилось отъ Солнца. Затъмъ воображаемое нами свътило можетъ дойти до второй звъзды, и продълать такое же путешествіе вокругъ третьей звъзды и т. д. и




Рис. 10. Гипербола.

можеть въ концѣ-концовъ снова вернуться къ нашему Солнцу. Подобныя странствованія свѣтилъ являются пока воображаех мыми, такъ какъ провѣрить ихъ нѣтъ возможности.

Вернемся къ нарисованному конусу. Разсъчемъ его плоскостью, параллельною оси конуса; въ

съчени мы получимъ кривую линію, состоящую изъ двухъ вътвей ГГ и ГГ. Если нарисовать ихъ на плоскости, то получатся двъ линіи, изображенныя на рис. 10.

Объ вътви, какъ и въ случаъ параболы, безконечныя и нигдъ не сходятся. Разсматриваемая кривая линія называется гиперболою. Комета, двигаясь по подобной кривой и удалившись отъ Солнца,

никогда къ нему не вернется; она, какъ и въ случать движенія по параболть, будеть временною гостью Солнечной системы, и можетъ странствовать во вселенной подобно той воображаемой кометь, о которой изложено на предыдущей страницть.

Наконецъ, если мы разсъчемъ конусъ плоскостью, проходящею черезъ ось его, то въ съчени получимъ двъ прямыя линіи. Предположимъ, что комета движется по прямой линіи къ Солнцу; она неминуемо упадетъ на Солнце, столкнется съ нимъ и перестанетъ существовать, какъ отдъльное самостоятельное свътило.

Итакъ, пересъкая конусъ плоскостями, различнымъ образомъ расположенными, мы получаемъ различныя линіи: кругъ, эллипсъ, параболу, гиперболу и прямую линію. Можно, кромъ того, получить и точку, если пересъчь конусъ плоскостью, проходящею только черезъ вершину A, но мы ее исключаемъ, такъ какъ въ предълахъ точки не можетъ быть движенія; насъ же занимаетъ вопросъ о движеніи кометъ въ пространствъ.

Если движеніе тягот вощихъ т влъ можеть происходить по пяти различнымъ линіямъ, именно по прямой линіи, по кругу, по эллипсу, по парабол в п по гипербол в, то спрашивается, отъ какой причины происходить то или другое движеніе. На этотъ вопросъ наука даетъ вполн в опред вленный отв втъ: движеніе по той или по другой линіи зависить всец вло отъ начальной скорости и ея направленія. Комета, бывшая въ относительномъ поков, падаетъ по прямой линіи на Солнце; если же она им вла н в которую начальную скорость, то движеніе можетъ происходить по одной

изъ четырехъ перечисленныхъ нами кривыхъ линій; при малыхъ начальныхъ скоростяхъ движеніе происходить по эллипсу, при большихь-по гиперболь; въ двухъ частныхъ случаяхъ-по кругу и по параболъ. Четыре кривыя линіи коническаго сфченія характеризуются эксцентриситетомъ: у круга онъ равенъ нулю, у эллипса меньше единицы, у параболы-единица, а у гиперболы больше единицы. Всякой начальной скорости соотвътствуеть особый эксцентриситеть. Какъ начальныхъ скоростей можетъ быть безконечное множество, такъ и значеній эксцентриситета безконечное множество. Изъ всевозможныхъ начальныхъ скоростей только одной соотвътствуетъ движение по кругу и однойдвижение по параболъ. Признавъ всъ начальныя скорости равновозможными, мы должны придти къ заключенію, что движеніе по кругу и по парабол'в, которымъ соотвътствуютъ вполнъ опредъленныя начальныя скорости, являются весьма мало въроятными. Вслёдствіе этого наиболе вероятнымь является движеніе по эллипсу или по гиперболь. Сльдуеть, однако, замътить, что большинство кометь движется по эллипсамъ съ большимъ эксцентриситетомъ, т.-е. близкимъ къ единицъ, вслъдствіе чего эллипсы являются весьма вытянутыми и приближающимися къ параболъ.

Таково слъдствіе закона тяготънія Ньютона; хотя кометы могуть двигаться по параболамъ и по гиперболамъ, но всего въроятнъе, что онъ движутся по весьма вытянутымъ эллипсамъ. Какъ ни строго было заключеніе Ньютона съ математической и философской точекъ зрънія, но весьма важно было провърить его непосредственными наблюденіями.

Съ величайшимъ нетеривніемъ выжидаль онъ понвленія кометы, которая могла бы подтвердить его предположеніе.

Къ счастью, нетерпъніе Ньютона скоро удовлетворилось. Въ 1680 году появилась одна изъ самыхъ замъчательныхъ кометъ, которую когда-либо удавалось видъть. Она была наблюдаема берлинскимъ астрономомъ Готфридомъ Кирхомъ утромъ 14-го ноября 1680 года въ Кобургъ. Коса этой блестящей кометы охватывала дугу въ 80 градусовъ. Ньютонъ самъ вычислиль ея орбиту и убъдился, что она двигалась по весьма вытянутому эллипсу, далеко выходящему за предълы Солнечной системы 1); онъ приняль орбиту за нараболу. Ньютонъ убъдился также, что комета обогнула Солнце такъ близко отъ его поверхности, что едва не коснулась ея: комета отстояла всего на четверть солнечного радіуса; но она не задъла за Солнце, она обогнула его и удалилась въ глубину небеснаго пространства, двигаясь по вычисленной Ньютономъ параболъ; Ньютонъ же производилъ вычисленія, основываясь на закон' всемірнаго тягот внія.

Такимъ образомъ, благодаря изслѣдованіямъ Ньютона, удалось познать истинныя движенія кометь въ небесномъ пространствѣ.

Черезъ два года послъ этой кометы появилась другая, тоже большая; она была открыта Галлеемъ; орбита была вычислена имъ же вмъстъ съ Ньютономъ.

<sup>1)</sup> Въ то время предъломъ Солнечной системы считалась орбита Сатурна. Уранъ былъ открытъ въ концъ 18-го, а Нептунъ въ серединъ 19-го столътія.

U. П. ГЛАЗЕНАПЪ.

Способъ Ньютона далъ возможность скоро и просто опредълять элементы кометы изъ наблюденій; и Галлей, другь Ньютона, примъниль этотъ способъ ко всъмъ кометамъ, появлявшимся до него, и составилъ такимъ образомъ первый каталогъ орбитъ наблюденныхъ кометъ.

Ньютонъ умеръ 20-го марта 1727 года на 86-мъ году жизни; погребенъ въ Лондонъ въ Вестминстерскомъ аббатствъ. Въ печальной церемоніи перенесенія праха великаго математика участвовали многіе ученые, а шнуры у гроба держали: лордъ-канцлеръ, герцогъ Роксбургъ, герцогъ Монтрозъ и графы: Пемброкъ, Суссексъ и Меклесфильдъ 1).

<sup>1)</sup> Oeuvres de François Arago. Notices biographiques. T. II, p. 389,

## 4. Элементы кометныхъ орбитъ.

Кометы бывають видимы только вблизи Солнца на весьма малой части своей орбиты; если же онъ удалятся отъ насъ на разстояние въ два раза больше, чъмъ разстояніе Солнца отъ Земли, то мы ихъ вообще не видимъ, -- до того слабъетъ ихъ блескъ. Наблюдая же кометы на небольшой части ихъ орбиты, мы съ большимъ трудомъ можемъ заключить не только о размърахъ всей орбиты, но даже и объ ея родъ. При весьма большихъ и вытянутыхъ эллипсахъ достаточно сравнительно небольшой ошибки въ наблюденіяхъ, чтобы орбита казалась намъ или параболической, или эллиптической, или гиперболической. Разница же въ орбитахъ громадная. На двухъ чертежахъ 11 и 12 изображено сліяніе орбить въ перигеліи; на первомъ изъ нихъ изображены орбиты всёхъ родовъ; онё сливаются въ перигеліи P; на второмъ же, бол подробномъ, изображено семь орбить, слившихся у перигелія. Средняя орбита-парабола; три внутреннихъ-эллинсы, а три вившнихъ -- гиперболы различныхъ эксцентриситетовъ. Въ перигеліи Р всѣ орбиты сливаются между собою. Наблюдая, напримъръ, комету вблизи перигелія P на небольшомъ протяженій, мы рѣшительно не въ состояній опредѣлить, движется ли комета по нараболѣ, по эллипсу или гиперболѣ; рѣшить этоть вопросъ можно только въ томъ случаѣ, если наблюденія охватывають большую дугу за предѣлами ихъ видимаго сліянія.




Рис. 11. Сліяніе орбить.

Орбиты, описываемыя небесными свътилами вообще, а въ частности кометами, опредъляются особыми величинами, называемыми элементами. Съ помощью элементовъ можно опредълить для всякаго даннаго времени положение кометы на небъ. Мы перечислимъ эти элементы:

1) Положение плоскости орбиты кометы въ пространствъ, относимое къ нъкоторой постоянной пло-

скости; за постоянную плоскость обыкновенно принимается плоскость эклиптики. Вспомнимъ, что плоскость эклиптики проходить черезъ центръ Солнца, что черезъ тотъ же центръ проходить и плоскость кометной орбиты. Слъдовательно, объ плоскости пересъкаются по прямой линіи, которая должна пройти

черезъ общую точку объихъ плоскостей-черезъ центръ Соляца. Прежде всего необходимо знать положеніелиніи пересъченія этой объихъ плоскостей. Затъмъ необходимо знать уголъ, подъ которымъ наклонена плоскость орбиты къ плоскости эклиптики. Положеніе линіи пересвченія опредъляется угломъ относительно точки весенняго равноденствія: **ЭТОТЪ Т**СОЛУ считается отъ 0° до 360° въ ту же сторону, какъ и долготы. Линія пересфченія объихъ плоскостей встръчаетъ небесную сферу въ




Рис. 12. Сліявіе орбить въ перигеліи.

двухъ діаметрально противоположныхъ точкахъ, пазываемыхъ узлами, а самая линія пересъченія называется линіею узловъ. Тотъ узелъ, въ которомъ комета переходитъ изъ южнаго полушарія въ съверное, называется восходящимъ узломъ, а противоположный—нисходящимъ. Уголъ, которымъ опредъляется положеніе восхо-

дящаго узла относительно точки весенняго равноденствія, называется долготою восходящаго узла и обозначается знакомъ  $\mathfrak{S}$ ; наклонность же орбиты обозначается буквою i; уголь i измѣряется оть  $0^{\circ}$  до  $180^{\circ}$ .

- 2) Какъ скоро извъстно положеніе плоскости орбиты, необходимо знать, какимъ образомъ расположена въ ней сама орбита. Она можетъ лежать различнымъ образомъ: ея вершина можетъ быть направлена въ ту или другую сторону. Необходимо поэтому опредълить, какимъ образомъ лежитъ ось параболы или эллипса; для этого выбираютъ ту часть оси, въ которой лежитъ вершина, называемая перигеліемъ, т.-е. ближайшая къ Солнцу точка. Всего проще положеніе перигелія опредъляется угломъ, составляемымъ осью орбиты съ линіею узловъ; этотъ элементъ, называемый аргументомъ перигелія, обозначается греческою буквою ω.
- 3) Необходимо опредѣлить размѣры орбиты. Размѣры эллипса опредѣляются величиною большой и малой осей (2а и 2b) или большой оси и эксцентриситета е. Для параболы, имѣющей безконечные размѣры этихъ величинъ, изложенное опредѣленіе недостаточно: для параболы необходимо знать разстояніе ея вершины отъ Солнца или разстояніе перигелія, которое обозначается буквою q; кромѣ того, у нея эксцентриситетъ равенъ единицѣ. Разстояніе перигелія можетъ быть дано также и для эллиптической орбиты вмѣсто большой полуоси, потому что три названныя величины связаны между собою вполнѣ опредѣленнымъ уравненіемъ:

$$a = \frac{q}{1-e}$$

Величина q выражается въ частяхъ средняго разстоянія отъ Земли до Солнца, а такъ какъ въ этомъ разстояніи заключается  $149^1/2$  милл. километровъ, то легко выразить q въ километрахъ. Если, напримъръ, у разсматриваемой кометы q=0.725, то это означаеть, что вершина орбиты лежить въ разстояніи

$$0,725 \times 149^{1/2}$$
 мил. кил. = 108 мил. кил.

отъ Солица.

4) Описанными элементами вполнѣ опредѣляются какъ положеніе орбиты въ пространствѣ, такъ и ея размѣры; но для опредѣленія положенія кометы на орбитѣ, а слѣдовательно и въ пространствѣ, необходимо еще знать, въ какой моменть комета находилась въ какой-нибудь извѣстной точкѣ на орбитѣ, напримѣръ, въ какое время она прошла черезъ перигелій. Зная это, мы можемъ, на основаніи второго закона Кеплера, опредѣлить положеніе кометы и во всякій другой моментъ. Время прохожденія черезъ перигелій обозначается буквою T.

Что касается до времени обращенія кометы вокругь Солнца, то оно могло бы быть опредѣлено по третьему закону Кеплера (стр. 14), если извѣстна большая полуось орбиты а. Дѣйствительно, если а извѣстно п если оно выражено въ среднемъ разстояніи отъ Земли до Солнца, принимаемомъ за единицу, то искомое время U обращенія вокругъ Солнца, выражепное въ годахъ, опредѣлится слѣдующимъ образомъ:

$$U^2\!:\!1^2\!=\!a^3\!:\!1^{3\,1})$$
 откуда  $U^2\!=\!a^3$  и  $U\!=\!+\sqrt{a^{3\,-2}}).$ 

Представимъ себъ, напримъръ, что данная комета движется по эллипсу, большая полуось котораго равна 61,5; время ея обращенія вокругъ Солнца опредълится изъ равенства

$$U = \sqrt{(61,5)^3} = 482,3$$
 года.

Подобное опредъление весьма просто и не требуеть особенно сложныхъ вычисленій; они очень упрощаются, если пользоваться логариемическими таблицами "). Комета, для которой произведено вычисленіе, возвращалась бы къ Солнцу черезъ каждые 482,3 года. Однако, при всей простотъ вычиастрономы редко къ нему прибегають; сленія, причина заключается въ томъ, что значение большой полуоси орбиты непосредственно изъ наблюденій никогда не получается; изъ нихъ опредъляется, какъ мы знаемъ (стр. 38), значение наименьшаго разстояния оть Солнца (разстояніе перигелія q) и эксцентриси-

<sup>1)</sup> Слѣдовало бы написать  $U^2(M+m'):1^2(M+m)\equiv a^3:1^3,$  но масса кометы m' и Земли m такъ малы сравнительно съ массой Со леца, что отношеніе M+m':M+m принимается за единицу

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Передъ корнемъ поставденъ одинъ знакъ +, такъ какъ опредъляется абсолютное значене времени обращенія U, и отрицательное его значеніе не имъ́етъ смысла.

<sup>3)</sup> См. С. Глазенапъ. «Таблицы догариемовъ съ пятью десятичными знаками». Стеоротипное наданіе. С.-Петербургъ, кн. маг. «Новаго Времени».

тета e, съ которыми большая полуось связапа сл'ядующимъ уравненіемъ:

$$a = \frac{q}{1 - e}$$

Замътимъ, что какъ бы старательно ни были произведены наблюденія, они всегда сопровождаются нъкоторыми ощибками, и слъдовательно значенія величинъ q и e, выведенныя изъ наблюденій, содержать некоторую неточность. Сами по себе эти ошибки не существенны, но ихъ вліяніе на опредъляемое значеніе большой полуоси весьма значительно; особенно велико вліяніе неточности въ эксцентриситетъ если его значение близко къ единицъ; въ послъднемъ случа $^*$ ь величина 1-e, входящая въ знаменатель предыдущаго выраженія, очень малая, и тогда а принимаетъ весьма большое значеніе. При такихъ условіяхъ малъйшая ошибка въ опредъленіи эксцентриситета значительно измѣняетъ величину большой полуоси а н въ некоторыхъ случаяхъ можетъ превратить ее въ безконечно-большую. Для нагляднаго представленія о вліяніи ошибки въ экспентриситет'я на большую полуось, а вмъстъ съ тъмъ и на періодъ обращенія вокругь Солнца, мы приведемь нісколько примъровъ. Мы выберемъ нъсколько эксцентриситетовъ и предположимъ, что у разсматриваемыхъ кометь одно и то же разстояніе перигелія q и для простоты примемъ его равнымъ единицъ. Затъмъ вычислимь по извъстнымь намь формуламь значение большой полуоси и время обращенія кометы вокругь Солипа.

ТАБЛИЦА

Вліянія эксцентриситета на большую ось и на время обращенія кометы вокругъ Солнца.

Эксцентриси- ситетъ е.		Разстояніе перигелія <i>q</i> .	Большая полуось а.	Время обра- щенія <i>U</i> .
	0.900	1	10	32
	0.950	1	20	89
	0.980	1	50	<b>354</b>
	0.990	. 1	100	1 000
	0.995	1	200	2 828
	0.997	1	.333	6 086
	0.998	1	500	11 181
	0.999	~ 1	1 000	31 623
	1.000	1	безконе	. кынг

По числамъ двухъ послъднихъ столбцовъ этой таблицы видно, какъ быстро увеличивается большая полуось орбиты и время обращенія кометы вокругъ Солнца въ зависимости отъ увеличенія эксцентриситета; если эксцентриситетъ превращается въ единицу, то большая ось и періодъ обращенія кометы вокругъ Солнца становятся безконечно большими; тогда эллипсъ превращается въ параболу.

Если комета движется по параболѣ—по несмыкающейся орбитѣ, то она никогда къ намъ не вернется, или, какъ говорять астрономы, вернется черезъ безконечное число лѣтъ; то же самое и въ томъ случаѣ, если комета движется по гиперболѣ; но если она движется по эллипсу, то она вернется къ намъ, описавъ около Солнца такую же орбиту, какъ и въ первый разъ, и постоянно будетъ возвращаться черезъ правильные промежутки времени, которые вполиъ зависятъ отъ размъровъ орбиты. Въ дъйствительности комета не описываетъ постоянно одинъ и тотъ же эллипсъ, какъ предписываютъ законы Кеплера, потому что комета тяготъетъ не только къ Солнцу, но и къ планетамъ, что и вызываетъ уклоненіе отъ постояннаго эллипса.

Итакъ, въ одномъ случав комета вернется къ Солнцу черезъ *извъстное* число лѣтъ, а въ двухъ другихъ—черезъ *безконечное* число лѣтъ,

Для точнаго предсказанія вторичнаго ноявленія кометы необходимо весьма точно знать видъ и размъры эллинса, которые опредъляются большою осью и эксцентриситетомъ; но мы только-что обратили вниманіе на то, что эти величины всегда опредъляются съ нѣкоторою неточностью, и если эксцентриситеть большой, то самая незначительная ошибка можеть повести къ получению параболы вмъсто эллипса. Напримъръ, если эксцентриситеть, опредъленный изъ наблюденій, имфеть значеніе 0,998 и его ощибка можеть быть ± 0,001, то действительный эксцентриситетъ, очевидно, заключается между предълами 0,997 и 0,999. Сама по себъ эта ошибка имъетъ ничтожное значеніе, но ея вліяніе на періодъ обращенія кометы вокругъ Солица—неимовърно большое. Дъйствительно, по числамъ предыдущей таблицы мы выписываемъ слъдующіе періоды обращенія, соотв'єтствующіе приведеннымъ значеніямъ эксцентриситетовъ:

Эксцентриси- теть.	Періодъ обра- щенія.
0,997	6 086 лѣтъ.
0,998	11 181 »
0,999	31 623 »

Если бы астрономы задались цёлью предсказывать ноявленіе разсматриваемой кометы, то въ первомъ случав пришлось бы ожидать ея вторичнаго появленія черезъ 6 086 лётъ, во второмъ—черезъ 11 181, а въ третьемъ—черезъ 31 623 года. Можно ли назвать это предсказаніемъ, и имъетъ ли оно какое-нибудь значеніе?—Конечно, нътъ.

Для меньшихъ эксцентриситетовъ ошибки въ періодѣ обращенія будуть меньше, и при хорошихъ наблюденіяхъ предвычисленіе вторичнаго появленія кометы можетъ быть произведено съ достаточною точностью. При большихъ эксцентриситетахъ, указывающихъ на періодъ обращенія кометы вокругъ Солнца въ нѣсколько сотъ лѣтъ, астрономы и не задаются цѣлью предсказать вторичное ея появленіе; подобное предсказаніе вообще не имѣло бы никакого научнаго значенія и было бы равносильно предсказанію появленія новой, до тѣхъ поръ не паблюденной кометы, что совершенно невозможно; между тѣмъ при неожиданномъ появленіи большой кометы иногда раздаются упреки по адресу астрономовъ.

«Что за наука, — прибавляють иногда, — когда нельзя предсказать появленія такихъ свътиль, какъ большія кометы съ огромными хвостами». Въ 1843 году неожиданно появилась большая комета, п

упрекъ подобнаго рода быль брошенъ астрономамъ того времени. Знаменитый астрономъ и физикъ Араго, считавшій своимъ долгомъ разсбевать всякія суевбрія, написалъ по этому поводу статью, напечатанную въ «Ежегодникъ Бюро Долготъ» («Annuaire du Bureau des Longitudes») за 1844 годъ, изъ которой мы приводимъ слъдующія строки: «Позволительно ли осмысленно надъяться, чтобы когда-нибудь мы были въ состояніи предсказать появленіе кометь, перем'вщавшихся въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ небеснаго пространства и которыхъ вследствіе этого никто не видъль; вліяніе которых на свътила нашей Солнечной системы меньше всякой замётной ведичины, какъ вслъдствіе ихъ незначительной массы, такъ и вслъдствіе ихъ громаднаго оть насъ удаленія. Светило замъчается, или когда оно становится видимымъ, или же когда наблюдается его вліяніе на другія видимыя свътила; но того свътила, котораго никогда не видъли, и вліяніе котораго нигдъ не проявлялось, для насъ какъ бы не существуеть. Предсказание появления вполнъ неизвъстной кометы принадлежало бы къ области волшебства, но не науки. Астрологія—и та не имъла претензіи на подобныя предсказанія даже во время ея наибольшаго значенія».

Итакъ, астрономы отстранили отъ себя всякое желаніе заниматься невозможнымъ, т.-е. предсказаніемъ появленія кометъ, наблюденныхъ только одинъ разъ, и орбита которыхъ не могла быть опредълена съ достаточною точностью; они предполагаютъ, что новая комета, появившаяся въ первый разъ, движется по параболѣ; они тщательно наблюдаютъ ее и по воз-

можности точнъе опредъляють элементы ея орбиты. Затъмъ комета и ея элементы заносятся въ кометный каталогъ, гдъ онъ расположены двоякимъ образомъ: во-первыхъ, по годамъ, и, во-вторыхъ, по наклонностямъ ихъ орбитъ.

Теперь представьте себѣ, что, занося въ каталогъ элементы наблюденной кометы, мы убѣждаемся, что они вполнѣ сходны съ элементами прежде наблюденной кометы. Мы заключаемъ, что новая комета та же самая, которая раньше наблюдалась; она появляется второй разъ, и очевидно движется не по параболѣ, а по эллипсу: она періодическая.

Читатель можеть задать вопрось: «да развѣ новая комета не можеть быть совсѣмъ другая и тѣмъ не менѣе двигаться по той же орбитѣ?»

Конечно, подобное движение возможно, но вообще оно мало въроятно. Въ самомъ дълъ, двъ кометы, появившіяся въ различное время, могуть двигаться по одинаковымъ орбитамъ только въ томъ случать, если онъ вступили въ предълы солнечнаго притяженія съ одною и тою же скоростью и по одному и тому же направленію. В вроятно ли это? Изъ безконечнаго числа случаевъ, отъ которыхъ зависитъ начальное направленіе и скорость двухъ независимыхъ другь отъ друга кометь, только одинь соотв втствуеть тому, когда об в кометы будуть двигаться по одной и той же орбитв. Можно сказать, что разсматриваемое событіе настолько же въроятно, какъ и слъдующее. Представьте себъ, что въ общирной пустынъ, почва которой состоитъ изъ мельчайшихъ кремнеземныхъ песчинокъ, заключается только одна алмазная. Вы находитесь въ этой пустынъ

и берете первую попавшуюся песчинку. Спрашивается, велика ли въроятность, что именно взятая вами песчинка будеть алмазная. Очевидно, что въроятность будеть весьма мала; наобороть, можно утверждать съ большою въроятностью, граничащею съ достовърностью, что взятая вами песчинка не алмазная. То же самое и для двухъ кометь, появившихся въ различное время, но движущихся по одной и той же орбить: онъ не могуть быть различными кометами; онъ—одна и та же комета въ двухъ ея появленіяхъ.

Хотя въроятность, чтобы двъ кометы случайно двигались по одной и той же орбитъ, весьма мала, но при большомъ числъ появляющихся кометъ можно всетаки наблюдать подобный случай. Дъйствительно, извъстны случаи, когда двъ и болъе кометы двигались одна вслъдъ за другою по одной и той же орбитъ. По отношеню къ подобнымъ кометамъ можно утверждать, что не случай руководить ихъ движеніями по одной и той же орбитъ, а нъкоторая физическая причина; эти кометы, какъ мы ниже увидимъ, образовались изъ одного и того же космическаго вещества и движутся съ тою же скоростью, съ которою двигалось первичное вещество; онъ образують такъ называемыя «семьи кометь»; мы подробно разсмотримъ вопросъ о нихъ въ особой главъ.

Комета, появившаяся второй разъ, называется періодическою. Періодомъ ея обращенія называется промежутокъ времени между двумя послѣдовательными прохожденіями кометы черезъ перигелій. Когда продолжительность періода хорошо опредѣлена, не трудно опредѣлить и размѣры эллипса: стоить только вос-

пользоваться третьимъ закономъ Кеплера (стр. 14). Для такой кометы можно весьма точно предсказать ея новое появленіе; она заносится въ списокъ свътилъ Солнечной системы, и каждое ея появленіе предвычисляется съ большою тщательностью.

Въ нъкоторыхъ случаяхъ возможно опредълить эксцентриситетъ орбиты и изъ перваго ея появленія, но это опредъленіе только въ ръдкихъ случаяхъ бываетъ точнымъ, и потому предсказаніе ея вторичнаго появленія будетъ всегда подвержено нъкоторымъ ошибкамъ.

## 5. Маркизъ де-Лапласъ и докторъ Ольберсъ.

Въ предыдущей главъ читатель ознакомился съ элементами кометныхъ орбитъ; въ настоящей же онъ узнаетъ въ общихъ чертахъ, какимъ образомъ опредъляются эти элементы изъ наблюденій.

Мы напомнимъ, что знаніе значеній шести элементовъ необходимо и достаточно для опредъленія движенія кометы и для вычисленія ея положенія въ небесномъ пространствъ для какого угодно временипрошлаго или будущаго. Начальная математика учить насъ, что для опредъленія шести неизвъстныхъ необходимо шесть независимыхъ уравненій. Разсматрпваемый нами случай не представляеть исключенія, и для ръшенія нашей задачи также необходимо шесть уравненій. Въ эти уравненія входять, кром'в шести неизвъстныхъ, шесть данныхъ, доставляемыхъ наблюденіями надъ открытою кометою, и коэффиціенты, выражающе связь между наблюденными величинами и искомыми элементами; связующие коэффиціенты зависять также отъ времени и мъста наблюденія. Съ математической точки эрвнія задача, какъ видить читатель, никакихъ затрудненій не представляеть. Необходимо имъть шесть наблюденныхъ величинъ, составить изъ нихъ уравненія и ръшить послъднія. Но практическое ръшеніе вопроса представляетъ большія затрудненія; они впервые были преодольны Ньютономъ, затъмъ Лапласъ предложилъ особое ръшеніе и наконецъ Ольберсъ далъ очень изяшное ръшеніе задачи.

Въ мартовскомъ собраніи Русскаго Астрономическаго Общества 1910 г. (18 марта) профессоръ Морской Академіи А. Н. Крыловъ сообщилъ о своемъ разборъ способа И. Ньютона для опредъленія параболическихъ орбитъ кометъ. Профессоръ Крыловъ показалъ, что Ньютонъ далъ болъе простой способъ, чъмъ обыкновенно принято его считать. Докладъ его, имъющій важное значеніе, будетъ, въроятно, напечатанъ въ «Извъстіяхъ Русскаго Астрономическаго Общества».

Петръ Симонъ Лапласъ родился 28-го 1749 г. въ Бомонъ, въ департаментъ Кальвадосъ (Веаиmont en Auge, Dép. Calvados). Одаренный богатыми способностями, онъ особенно любиль изучать математику. Первые его научные труды были напечатаны въ мемуарахъ Туринской Академін наукъ; на эти труды обратили вниманіе, и Лапласу предложили м'єсто преподавателя математики въ военномъ училищъ его родного города, а вскоръ затъмъ мъсто экзаменатора въ Королевскомъ артиллерійскомъ корнуст въ Парижь. Замьчательныя изсльдованія въ области астробыли разсмотрвны Парижскою Академіею наукъ и доставили ему въ 1773 году кресло академика. Въ это время Лапласу было всего 24 года. Во время французской революціи онъ быль, вмість съ



Рис. 13. Маркизъ Пьеръ-Симонъ де-Лапласъ (1749—1827).

Лагранжемъ, членомъ комиссіи мъръ и въсовъ и профессоромъ Нормальной школы. Въ 1799 г., во время консульства Наполеона, онъ былъ министромъ внутреннихъ дёлъ, затёмъ членомъ и канцлеромъ сената ло 1803 года, когда онъ вернулся къ чисто научной дъятельности. Наполеонъ I возвелъ его въ графское достоинство, а Людовикъ XVIII даровалъ ему званіе пэра и маркиза. Вообще онъ достигь высшихъ почестей въ своемъ отечествъ. Астрономические труды маркиза де-Лапласа являются прямымъ продолженіемъ и развитіемъ знаменитыхъ «Principia» Ньютона. Задача о двухъ тълахъ или эллиптическое движение небесныхъ свътилъ, задача о трехъ тълахъ или возмущенное движение, фигура небесныхъ свътилъ, прецессія и нутація, приливы и отливы океановъ, рефракція, теорія спутниковъ планеть и т. д.—все это составило предметь замічательных изслідованій Лапласа, изданныхъ на государственный счеть подъ названіемь: «Небесная механика». Лаплась издаль также общедоступное сочинение «Изложение системы міра», переведенное, между прочимь, и на русскій языкъ; въ немъ самымъ изящнымъ литературнымъ языкомъ излагается вся небесная механика безъ всякихъ математическихъ формулъ. Небулярная гипотеза Лапласа пользуется большою популярностью; хотя она не удовлетворяеть всемь новейшимь открытіямъ, но она все-таки считается одною изъ наиболъе разработанныхъ.

Лапласъ, владъвшій въ совершенствъ математическимъ анализомъ, обратилъ вниманіе на опредъленіе элементовъ кометныхъ орбитъ; онъ изложилъ аналитическій способъ, дававшій возможность опредѣлить изъ наблюденій всѣ элементы кометной орбиты. Способъ Лапласа, изящный въ теоретическомъ отноше-



\_ Рис. 14. Генрикъ-Вильгельмъ Ольберсъ (1758—1840).

ніи, представляль много практическихь затрудненій и вызываль многочисленныя и сложныя вычисленія. Вслѣдствіе этого всѣ астрономы, которымь приходилось опредѣлять элементы кометныхь орбить, тяго-

тплись имъ и выражали желаніе имъть болье простой и болье совершенный способъ. Ръшеніе этой задачи удалось выполнить Ольберсу.

Генрихъ-Вильгельмъ-Матвъй Ольберсъ родился 11-го октября 1758 г. въ містечкі Арбергень, возлів Бремена; отецъ его былъ священникъ. Въ юности самостоятельно, безъ помощи учителя, изучилъ математику и астрономію. Занимаясь съ увлеченіемъ астрономіей, онъ наблюдаль въ 1777 г. солнечное затменіе, а въ 1779 г. -- комету и обработалъ свои наблюденія. Поступивъ въ Гетингенскій университеть на медиппнскій факультеть, онь сь успѣхомь прошель курсь наукъ, и въ 1780 г. защитилъ докторскую диссертацію о движеній глаза; его изследованія и до настоящаго времени имъють значение. Осенью 1781 года онъ возвратился въ Бременъ, гдф и основался какъ практическій врачь и не покидаль медицинской дізятельности до конца своей жизни; онъ пользовался славою, уваженіемъ и любовью среди своихъ кліентовь, что ясно высказалось въ 1830 г., когда ему, окруженному почетомъ, посчастливилось отпраздновать свой 50-льтній докторскій юбилей. Черезь десять лъть (2-го марта 1840 г.) онъ умеръ. Такова скромная жизнь этого труженика; она не окружена ореоломъ блеска и славы, какъ жизпь маркиза де-Лапласа: его имя не произносилось въ парадныхъ гостиныхъ пышныхъ вечеровъ Парижа, нттъ; при жизни его знали только его падіенты и некоторые спеціалисты: въ настоящее же время каждый студентъ-математикъ знаетъ имя Ольберса, всякій любитель астрономіи хорошо знаеть объ его заслугахъ, не говоря о спеціалистахъ-астрономахъ, высоко оцънивающихъ его работы.

Славу свою, какъ астрономъ, Ольберсъ пріобрѣлъ своими изслѣдованіями о кометныхъ орбитахъ; онъ далъ весьма простой и изящный способъ опредѣлять орбиты кометь по тремъ наблюденіямъ. Это тотъ же самый вопросъ, которымъ запимались Ньютонъ и Лапласъ, но Ольберсъ рѣшилъ задачу несравненно проще; онъ изложилъ ее въ сочиненіи «Abhandlung ueber die leichteste und bequemste Methode die Bahn eines Cometen zu berechnen» (Weimar, 1797). Способъ Ольберса и до настоящаго времени служитъ предметомъ постояннаго изученія и улучшенія.

Кометный міръ ссобенно запималь Ольберса; ему удалось открыть шесть кометь; одна изъ нихъ періодическая и названа его именемъ. Для наблюденія кометь Ольберсъ построилъ и ввель во всеобщее употребленіе кольцевой микрометръ, имѣвшій широкое распространеніе въ 19-мъ столѣтіи.

Пользуясь авторитетомъ среди астрономовъ, Ольберсъ основалъ общество для разысканія предполагаемой планеты или планеть между Марсомъ и Юпитеромъ. Хотя первую планету открылъ Піацци въ Палермо,—астрономъ, не вошедшій въ число членовъ названнаго астрономическаго общества, но и Ольберсу посчастливилось открыть двъ малыя планеты, названныя имъ Палладой и Вестой.

Обладая общительнымъ характеромъ, онъ дѣлился своими познаніями съ любителями астрономіи и покровительствовалъ молодежи, но въ особенную себѣ за-

слугу онъ ставилъ то, что ему удалось открыть, вывести въ люди и подарить наукъ знаменитаго Бесселя.

Ольберсь можеть служить идеаломь всёмь любителямь-астрономамь; глубина его изслёдованій поставила его на высоту, недосягаемую даже многимъ



Рис. 15. Медаль, выбитая въ память 50-лътняго юбилея доктора медицины Г. В. Ольберса.

спеціалистамъ-астрономамъ; среди послъднихъ его имя является авторитетнымъ во многихъ вопросахъ.

Почитатели и друзья Ольберса, желая увъковъчить его заслуги, выбили въ память о немъ медаль, изображение которой мы здъсь приводимъ.

## 6. Періодическія кометы.

Первая періодическая комета открыта Галлеемъ въ 1682 году; по своей новизнѣ открытіе возбудило живѣйшее любопытство всего ученаго міра; оно указало на существованіе новыхъ свѣтилъ солнечной системы, отличающихся отъ планетъ и ихъ спутниковъ. Смѣлые умы высказывали предположеніе, что кромѣ кометы Галлея существуютъ еще и другія періодическія кометы, но мы ничего о нихъ не знаемъ только потому, что онѣ слишкомъ слабы и невидимы въ телескопы. И дѣйствительно, съ развитіемъ техники въ наготовленіи астрономическихъ стеколъ стали открывать періодическія кометы, и въ настоящее время мы знаемъ 19 кометъ, наблюденныхъ не менѣе двухъ разъ при своемъ возвращеніи къ Солнцу; изъ нихъ комета Біела раздробилась на части и стала невидимою.

Исторія періодическихъ кометь весьма занимательна; статистическія же данныя о нихъ представляють матеріаль какъ для изученія строенія вселенной, такъ и для построенія гипотезы мірозданія. Каждое открытіе въ области періодическихъ кометь вносить нъчто новое въ науку и придаеть прочность нашимъ познаніямъ о вселенной. Мы увърены, что чтеніе настоящей главы доставить уважаемому читателю нъсколько хорошо проведенныхъ минутъ и возбудить въ немъ не мало возвышенныхъ вопросовъ.

Въ слѣдующей таблицѣ мы приводимъ списокъ періодическихъ кометъ, а затѣмъ сообщаемъ свѣдѣнія о нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Эдмундъ Галлей родился 8 ноября 1656 года въ Гагерстонъ, близъ Лондона; его отецъ былъ зажиточный мыловаръ. Одаренный блестящими способностями, Галлей 17-лътнимъ юношей поступаетъ въ Оксфордскій университетъ, гдъ изучаетъ, кромъ классическихъ языковъ, математику и астрономію. Черезъ три года, когда ему было всего 20 лътъ, онъ печатаетъ въ «Philosophical Transactions» мемуаръ, въ которомъ излагаетъ теорію движенія планетъ. Съ этого года начинается плодотворная научная дъятельность Галлея.

Въ 1676 году англійское правительство предпринимаеть экспедицію въ южное полушаріе для составленія каталога южныхъ звѣздъ. Положеніе южныхъ звѣздъ не было извѣстно въ то время, а между тѣмъ для морской державы необходимо было имѣть хорошій каталогъ южныхъ звѣздъ, иначе судоходство въ южномъ полушаріи не могло считаться обезпеченнымъ; поэтому составленіе каталога южныхъ звѣздъ явилось вопросомъ первостепенной важности и неотложнымъ 1).

<sup>1)</sup> Замътимъ здъсь, что издаваемый въ Берлинъ астрономическій календарь «Berliner astronomiches Jahrbuch» содержалъ до развитія Германіей колоніальной политики очень мало южныхъ звъздъ; но когда Германія заняла на юго-западъ Африки общирпую область, то сейчасъ же въ «Eerliner Jahrbuch» появились положенія южныхъ звъздъ.

							-	_			-								
	36	39	24	56	0	35	40	47	ಚ	43	22	15	48	4	38	50	က	34	13
.4	150	12	53	io	17	တ	13	10	က	15	12	25		9	10			44	29
న	27,	0	28	12	13	51	37	36	23	25	46	50	44	4	28	20	9	32	11 1
2	334°	121	101	530	104	24	246	22	35 65	146	245	506	331	18	308	569	254	84	23
	35	45	23	48	20	57	31	16	4	26	40	_	48					53	43
F	159°	306	116	43	274	348	20	241	œ	319	109		345	7	45	116	93	149	168
D	3,299	5,279	5,456	5,678	5,828			6,538		6,686	6,693	6,823		1,101	1,390	3,667	21,56	72,65	26,08
																1			
9	0,84	0,54	0,810	0,63	0,71	0,51	0,67	0,40	0,72	0,626	0,752	0,55	0,411	0,47	0,56	0,822	0,955	0,931	0,962
Б	0,339	1,388	0,589	1,152	0,923	1,669	1,110	2,091	0,969	1,327	628,0	1,595	2,128	1,959	1,650	1,020	0,776	1,199	0,687
	11,7	10,4	24,1	80	21,2	13,7	оя 1.	4,0	16,7	8,8	25,6	2,5	28,1	5,4	7-	5,5	25,7	8.5	16,5
T	STHB.	Нояб.	февр.	OKT.	Янв,	Февр. 13,7	Ноября 1.	OKT.	Февр.	IOH.	Янв. 25,6 Янв. 27,5	Мая	Апр.	Дек.	INH.	Мая	SHB.	OKT.	Мая
	1905.	1904.					1909.	1898.	1900.	1897.	1866. 1866.	1905,	1899.	1903.	1903.	1899.	1884.	1887.	1910.
				1		រិង					•			•					
A.	:	•		Ta	:	Свифга	•		i	٠.	:	i.		•			٠	Брукса	i
E E	:	•		Свифта				•	:	:	:			:	•	:	YECE	Bpy	
E E		•	arš		•	E	-	•	•	•					•	•	.Bp.	ر پي	•
0	:	ля	зена	7	еке	ИКО	ине	38	юя	ed.		фа	жсв	ca		ъ.	ام	epc	БЭ
X	Энке.	Темпля	Брорзена	ТемпЛ.	Виннеке	Де-ВикоЕ.	Перрине	Темпля	финлея	Д'Аррэ	Бівла $\{rac{1}{11}\}$	Вольфа	Хольмса	Брукса	Файя	Тетля	ПонсъБрукса	Ольберса—	Галлея.
بو	-	C/S	က	4	ಬ	9	۲-	∞ ∞	6	10	11	12	13	14	5	16	13	18	19

Успъхъ предпринятой экспедиціи могъ быть обезпеченъ только при условіи, если въ ней будуть участвовать выдающієся и энергичные астрономы. Англійское адмиралтейство выбрало королевскаго астронома Флемстида, Гевелія изъ Данцига,—извъстнаго автора каталога съверныхъ звъздъ,—и молодого Эдмунда Галлея.

При выборъ мъста экспедиціи остановились на островъ Св. Елены въ Атлантическомъ океанъ. Экспедиція была не изъ легкихъ. Не говоря о трудномъ переходъ океаномъ, испытанномъ астрономами, слъдуетъ замътить, что климать о-ва Св. Елены быль совершенно не подходящимъ для астрономическихъ цълей: постоянные туманы въ значительной степени мъщали производству наблюденій. Однако, настойчивость и трудолюбіе трехъ астрономовъ, принявшихъ на себя отвътственную задачу, преодолъли всъ препоны, и всв члены экспедиціи. по окончаніи наблюденій, вернулись обратно въ Англію. Наблюденія этой замъчательной экспедиціи обработаны Галлеемъ и имъ же изданы подъ заглавіемъ «Catalogus stellarum australium. London, 1679». Быстротою составленія каталога, а также обнародованіемъ результатовъ Галлей обратилъ на себя вниманіе ученаго міра, и высокая коллегія Королевскаго Общества (Royal Society) избрала его своимъ членомъ.

Въ настоящее время едва ли мы произведемъ астрономическія опредѣленія положенія звѣздъ безъ телескопа; не то было во времена Галлея. Телескопъ былъ изобрѣтенъ въ 1610 году и при Галлеѣ былъ еще новинкою въ наукѣ; не всѣ еще успѣли съ нимъ

освоиться; къ тому же техника въ изготовлении телескоповъ не стояла на должной высотъ. Гевелій въ Данцигъ наблюдаль звъзды для составленія своего каталога простыми діоптрами, не пользуясь астрономическими стеклами; его каталогъ былъ последнимъ въ дотелескопическомъ періодъ. Между Гевеліемъ и Гукомъ завязался споръ о значении телескопа, какъ измърительнаго прибора. Гевелій утверждаль, что его наблюденія, произведенныя просто глазомъ, съ помощью діоптръ, не уступають въ точности произведеннымъ съ помощью телескопа. Для решенія этого спора быль избрань Галлей, молодой астрономь, имъвшій всего 21 годъ отъ роду; это было до отъёзда экспедиціи на о-въ Св. Елены. Выборъ Галлея указываеть, насколько онь пользовался уваженіемъ въ ученомъ міръ, и какое почетное положеніе занималъ онъ въ своемъ отечествъ.

Хотя Гевелію и удалось доказать справедливость своего утвержденія, но наука и техника дѣлали свое дѣло; телескопы совершенствовались, изыскивались новые, болѣе точные способы наблюденій, и въ наше время уже никто не будеть утверждать, что просто глазомъ можно точнѣе наблюдать, чѣмъ въ телескопъ. Въ наши дни даже стрѣляють изъ орудій, пользуясь телескопическими прицѣлами для наводки орудій на цѣль, и развѣ только орудія, попавшія африканскимъ дикарямъ, лишены этого могущественнаго средства современной оптики.

Въ 1703 году Галлей избирается профессоромъ математики Оксфордскаго университета, а въ 1720 г., послъ смерти Флемстида, назначается директоромъ

Гринвичской обсерваторіи и получаеть присвоенное этой должности звание «королевскаго астронома». Занявъ этотъ высокій пость, Галлей до конца своихъ дней оправдывалъ свое назначение; среди своихъ сотрудниковъ онъ былъ первымъ и при томъ выдающимся, неутомимымъ и авторитетнымъ труженикомъ. Галлей предпринялъ важный и общирный трудъ составление карты земного магнетизма, и для этой цёли ему пришлось совершить путешествіе къ берегамъ Южной Африки и Америки. Эта экспедиція была болъе трудная и отвътственная, чъмъ на островъ Св. Елены, потому что Галлей быль не только начальникомъ экспедиціи, но и командиромъ корабля. По возвращении онъ удостоился особой похвалы отъ лордовъ адмиралтейства за блестящій видъ команды, изъ которой никто не умеръ во время путеществія. Затімь онь печатаеть свой способь опредъленія разстоянія отъ Земли до Солнца по наблюденію прохожденія Венеры черезъ дискъ Солнца. Первая мысль объ этомъ способъ у него зародилась еще на островъ Св. Елены, когда онъ наблюдалъ прохожденіе Меркурія черезъ дискъ Солнца, но множество текущихъ работъ и экспедиціи не дали ему возможности углубиться въ данный вопросъ и изложить его. Затъмъ онъ указываеть на собственное движение звъздъ и тъмъ самымъ вноситъ въ науку совершенно новое возэрѣніе на звѣзды вообще и въ частности на Солнце; всего же болъе его занимаютъ кометы.

Въ наше время законы движенія кометъ хорошо извъстны и преподаются въ средней школъ; мы знаемъ, что кометы движутся по вытянутымъ эллипсамъ,

въ фокусъ которыхъ находится Солнце; мы знаемъ, что въ большинствъ случаевъ эллипсы настолько вытянуты, что отличить ихъ отъ параболъ нътъ возможности. Если бы можно было видъть всю орбиту кометы, то сразу можно ръшить, какой видь она имъеть: эллинсъ, нараболу или гиперболу: но мы видимъ только малую часть орбиты, именно ту, которая находится около Солнца. Вблизи же Солнца всъ орбиты эллипсъ, парабола и гипербола-сливаются между собою, и мы принимаемъ, что кометы движутся по параболамъ только потому, что для численныхъ расчетовъ это проще. Во время Галлея ничего этого не знали. Хотя Ньютонъ и доказалъ, что небесныя свътила, подъ вліяніемъ тяготенія къ Солнцу, могуть описывать кромъ эллипсовъ и параболы, однако выводъ этотъ не былъ провъренъ по отношению къ параболамъ; движение кометъ не было изучено. Но само небо пришло на помощь астрономамъ въ данномъ вопросѣ; въ 1680 году появилась блестящая комета, положение которой было тщательно опредвлено астрономами и, между прочимъ, Галлеемъ. Самъ Галлей вычислиль орбиту по способу, предложенному Ньютономъ, и показалъ, что движение кометы происходить по параболь. Черезь два года появилась другая блестящая комета; она открыта 15 августа 1682 г. Галлеемъ, бывшимъ въ то время ассистентомъ Флемстида. Галлей вычислиль ея орбиту и убъдился, что комета періодически возвращается къ Солнцу; это было новое замечательное открытіе, такъ какъ до Галлея ничего не знали о періодическихъ кометахъ. Исторію кометы Галлея читатель найдеть на слъдующихъ страницахъ.

Галлей извъстень также, какъ составитель первой таблицы смертности. Онъ построилъ ее для своего прихода, положивъ въ основаніе число смертныхъ случаевъ различнаго возраста, и указалъ на возможность основанія общества взаимнаго страхованія жизни; этимъ дъломъ занимаются въ настоящее время сотни акціонерныхъ и взаимныхъ обществъ; десятки тысячъ людей находятъ заработокъ въ управленіи дълами обществъ, а многіе милліоны лицъ обезпечивають свои семьи страхованіемъ жизни.

Научныя работы Галлея сблизили его съ Ньютономъ; дружба эта имѣла огромное вліяніе на обоихъ, въ особенности на Ньютона. Галлей первый оцѣнилъ великія творенія Ньютона въ области механики и астрономін; благодаря настойчивости Галлея и на его же средства Ньютонъ приступилъ къ печатанію своихъ классическихъ «Philosophiae naturalis Principia mathematica», Londini. 1687.

Ньютонъ около 16 лѣтъ откладывалъ печатаніе своего безсмертнаго творенія «Principia», потому что вычисленное тяготѣніе Луны къ Землѣ не согласовалось съ дѣйствительностью. Несогласіе вызывалось неточнымъ опредѣленіемъ размѣровъ земного шара. Когда же, однажды, въ засѣданіи Королевскаго Общества докладывалось о новыхъ опредѣленіяхъ радіуса Земли, произведенныхъ экспедицією Парижской академіи наукъ, подъ начальствомъ Пикара, и Ньютонъ узналъ о болѣе точномъ значеніи радіуса Земли,—значеніи, доставлявшемъ согласіе его теоріи съ наблюденіями, онъ покинулъ залъ засѣданія и отправился домой съ цѣлью провѣрить вновь всѣ

вычисленія, но, предвидя согласіе, такъ заволновался, что не могъ закончить вычисленія. Віографъ Ньютона говорить, что вычисленія окончиль другъ Ньютона; этотъ другъ былъ Эдмундъ Галлей, любивщій великаго творца современной астрономіи, механики и физики.

Эдмундъ Галлей умеръ въ Гринвичѣ, занимая пость директора Гринвичской обсерваторіи, въ 1742 году, окруженный всеобщимъ уваженіемъ и почетомъ.

## Комета Энке.

Усердный искатель кометь Понсъ открыль небольшую комету 26 ноября 1818 г. Какъ скоро были вы-




Рис. 16. Комета Энке.

числены элементы ея орбиты и сравнены съ тѣми, которые занесены въ кометный каталогь, оказалось, что та же самая комета была имъ открыта и наблюдаема с. п. глазенапъ.

въ 1805 году. Дальнъйшія изслъдованія привели къ заключенію, что она была открыта и наблюдаема еще раньше въ 1795 г. Каролиною Гершель, сестрою знаменитаго В. Гершеля. Затъмъ берлинскій астрономъ Энке произвелъ обратныя вычисленія и доказалъ, что два наблюденія, произведенныя Мешеномъ надъ



Рис. 17. Каролина Гершель (1750—1848).

какою - то кометою въ 1786 году, относятся къ кометъ Энке; такимъ образомъ въ 1818 году наблюдалось 'четвертое появленіе кометы, названной въ честь Энке, приложившаго много труда и времени на изученіе движенія этой кометы.

Энке первый вычислиль эллиптическіе элементы кометы его имени и опредълиль періодь обращенія вокругь Солица въ 31/3 года.

Ближайшее появление кометы ожидалось въ 1822 г.; Энке вычислилъ ея видимое положение на небъ, и комета дъйствительно была открыта на предвычисленномъ мъстъ англійскими астрономами въ Австраліи.

Изучая движеніе кометы, Энке замѣтилъ особенное, въ высшей степени любопытное явленіе, заключающееся въ постепенномъ уменьшеніи періода ея обращенія вокругь Солнца, чего въ сущности не должно

быть; уменьшеніе это видно въ данныхъ слѣдующей таблицы. Первыя три числа таблицы вычислены Энке, а остальныя, начиная съ 1819 года, г. Маткевичемъ въ Пулковъ по элементамъ, опредъленнымъ директоромъ Пулковской обсерваторіи О. А. Баклундомъ, любезно разрѣшившимъ мнѣ помъстить ихъвъ настоящей книгъ.



Puc.	18. Іоанна	-Фъани	ь Эь	ике (	179	91-	;	186	35).
- 7.		- F <b>,</b>							Періодъ
									обращенія
									въ двяхъ.
Съ 1786 до	1795 (3	обрац	ц.)					•	. 1212,63
» 1795 —	- 1805 (3	>>	)						. 1212,50
» 1805 —	- 1819 (4	>>	)						. 1212,02
									5*

																	Періодъ обращенія въ дняхъ.
,	Съ	1819		1822							٠						1212,71
	<b>»</b>	1822		1825					•1								1211,31
	>>	1825	_	1829			٠,										1211,47
	<b>»</b>	1829	_	1832			·										1210,24
	>>	1832	_	1835													1209,38
	>>	1835	—	1838													1210,65
	>>	1838	—	1842													1210,01
	<b>»</b>	1842	_	1845													1215,58
	<b>»</b>	1845		1848													1203,48
	<b>»</b>	1848	-	1852	٠												1205,63
	>>	1852	_	1855													$1203,\!32$
	<b>»</b>	1855	_	1858													$1205,\!33$
	>>	1858		1862													1206,88
	*	1862	_	1865						•,							$1206,\!68$
	>>	1865	_	1868											•		1205,69
	*	1868	—	1871													1200,20
	>>	1871		1875	٠												1201,18
	<b>»</b>	1875	_	1878	•												1200,18
	*	1878	_	1881			•		•								1208,12
	*	1881		1885													1208,34
	>>	1885	_	1888													1208,33
	<b>»</b>	1888		1891													1206,96
	*	1891		1895									١.				1205,83
	>	1895		1898													1207,09
	>	1898		1901		•							٠,				1206,62
	Э	1901		1905				٠									1214,42
	>>	1905		1908			-						•				1205,01
	Q	9 77.070	πτοτ	TOTTION	m	01	т.	<b>X</b> :-		***	~ =	 ٠.		/	 _:	-52	

За исключеніемъ отдъльныхъ колебаній, происходящихъ отъ возмущеній въ движеніи кометы, замъ-

чается постепенное уменьшение періода обращенія кометы вокругъ Солнца.

Какая причина вызываеть уменьшение періода, а вмѣстѣ съ тѣмъ и уменьшение размѣровъ эллипса? Явление весьма занимательное и единственное въ своемъ родѣ; изучениемъ его занимались многие астрономы: Энке, фонъ-Астенъ и въ послѣднее время О. А. Баклундъ, вычислившій возмущения въ движении кометы отъ всѣхъ планетъ, начиная съ 1819 года.

Энке пришелъ къ тому заключенію, что причина уменьшенія періода обращенія кроется въ сопротивленіи движенію кометы среды, наполняющей пространство Солнечной системы. Само собою разум'єтся, что вещество, наполняющее пространство, весьма разр'єженное; оно названо эфиромъ.

Гипотеза о сопротивленіи эеира является тёмъ правдоподобне, что можно найти подтвержденіе существованія нёкоторой вещественной среды и при помощи другихъ астрономическихъ наблюденій. Въ самомъ дёлё, обратимся къ звёздамъ и звёзднымъ пространствамъ: если существуетъ эеиръ, наполняющій вселенную, то, какъ бы разрёженъ онъ ни былъ, мы должны замётить его слёды, потому что онъ будетъ задерживать и поглощать лучи свёта отъ звёздъ, находящихся на громадномъ отъ насъ разстояніи.

Въ небесномъ пространствъ, во вселенной, безконечное число звъздъ. Ограничение числа звъздъ равносильно ограничению пространства, а ограничение пространства невозможно. Вмъстъ съ Кантомъ мы допустимъ, что и то, и другое безгранично, безпредъльно. Слъдовательно, каково бы ни было распредъление звъздъ въ пространствъ, лучъ зрънія всегда встрътить звъзду, куда бы онъ ни быль направленъ, и, слъдовательно, каждая точка небеснаго свода была бы блестящая, сіяющая. Между тъмъ небо темное, черное. Очевидно, что свъть поглощается эвиромъ небеснаго пространства.

Подобныя разсужденія были изложены знаменитымъ врачомъ и астрономомъ Ольберсомъ и разработаны В. и Дж. Гершелемъ, В. Струве и другими. Здѣсь твердой почвы въ умозаключеніяхъ не можетъ быть, такъ какъ они основаны на нѣкоторыхъ вполнѣ произвольныхъ предположеніяхъ. Принявъ, однако, для поглощенія нѣкоторую величину, мы можемъ составить понятіе о предѣлахъ пространства, доступныхъ нашему зрѣнію, нашимъ чувствамъ. Напримѣръ, если принять, что свѣтъ, пройдя разстояніе, равное разстоянію Сиріуса отъ Солнца (который въ милліонъ разъ дальше, чѣмъ Земля отъ Солнца), потеряетъ только  $\frac{1}{800}$  часть своей напряженности, то пройдя

Пройдя же 30,000 разстояній Сиріуса, свъть вовсе не будеть для насъ замътенъ, т. е. вполнъ поглотится средой небеснаго пространства. Воть причина, почему ночное небо не сіяеть въчнымь свътомъ.

Поглощеніе свъта было доказано В. Я. Струве совершенно инымъ путемъ. Допустимъ, что звъзды распредълены во вселенной равномърно, такъ что число

звъздъ вполнъ пропорціонально пространству. Если мы вообразимъ себъ, что послъднее раздълено шаровыми поверхностями на определенныя части, и притомъ такъ, что въ первомъ шарѣ находятся всѣ звѣзды, видимыя просто глазомъ; во второмъ шаръ-всъ звъзды, видимыя съ помощью небольшой трубы, и т. д.; наконецъ последній шаръ содержить всё звёзды, видимыя въ самый сильный телескопъ, то число звъздъ, заключающихся въ каждомъ шарѣ, пропорціонально объемамъ этихъ шаровъ, а объемы этихъ шаровъ пропорціональны кубамъ ихъ радіусовъ. Вследствіе этого, если мы въ нъкоторую трубу видимъ извъстное число звъздъ, то въ другую, болъе сильную трубу, проницательная сила которой въ три раза больше первой, мы должны увидьть въ 27 разъ большее число звъздъ заразъ на одинаковой поверхности неба. Въ дъйствительности этого не бываеть. Чёмъ сильнее труба, тёмъ относительно меньшее число зв'вздъ мы видимъ, т. е. меньше противъ того, что можно было бы ожидать при данной силъ трубы. Подобное уменьшение числа звъздъ можно приписать только тому, что не всъ лучи свъта доходять до нашего глаза, а поглощаются средою небеснаго пространства.

Вопросъ о существовании и сопротивлении эеира небеснаго пространства весьма занимателенъ, но ръшеніе его вовсе не такъ просто, какъ можетъ казаться.
Кромѣ сопротивленія неизвѣстнаго намъ эеира, цѣлый рядъ другихъ причинъ можетъ вліять на правильность движенія кометы Энке. При каждомъ обращеніи вокругъ Солнца комета тяготѣетъ не только къ
Солнцу и къ большимъ планетамъ, но и къ неизвѣст-

нымъ намъ массамъ малыхъ планетъ, кометъ и метеорныхъ потоковъ. Затъмъ сама комета представляетъ свътило съ мало опредъленными очертаніями и безъ ръзко выраженнаго ядра. Наблюденія, произведенным въ различные дни, могутъ относиться къ различнымъ точкамъ, и вычисленное изъ наблюденій движеніе кометы, очевидно, относится не къ центру тяжести свътила, а къ какимъ-то точкамъ. Тяготъніе же къ малымъ планетамъ, кометамъ и метеорнымъ потокамъ можетъ вызватъ замътныя уклоненія въ періодъ обращенія вокругъ Солнца, но эти уклоненія не могутъ быть вычислены, какъ за незнаніемъ массы всъхъ малыхъ планетъ, такъ и вообще за незнаніемъ существованія невидимыхъ метеорныхъ потоковъ.

Первый шагъ къ рѣшенію вопроса о сопротивленіи эвира небеснаго пространства долженъ заключаться въ изученіи, по возможности точномъ, движенія кометы Энке отъ тяготѣнія ко всѣмъ извѣстнымъ свѣтиламъ; эту работу выполнилъ О. А. Баклундъ, заслуга котораго въ данномъ вопросѣ является несомиѣнною; онъ первый поставилъ рѣшеніе задачи на должное научное основаніе. По послѣднимъ его изслѣдованіямъ, комета Энке имѣетъ не шаровидную форму, а совершенно плоскую, какъ тарелка. Затѣмъ блескъ кометы постоянно блекнетъ: въ настоящее время она принадлежитъ къ слабымъ телескопическимъ кометамъ, а въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія могла быть наблюдаема, правда при благопріятныхъ условіяхъ, просто глазомъ.

Если уменьшение блеска кометы Энке будеть продолжаться, то черезъ нъсколько оборотовъ мы ея не



O. Backhin.

Рис. 19. Академикъ О. А. Баклундъ, директоръ Николаевской Главной Астрономической Обсерваторіи въ Пулковъ.

будемъ въ силахъ наблюдать, и тогда ръшение вопроса о сопротивлении междупланетнаго пространства будетъ самою природою отставлено.

#### Темпель и его кометы.

Вильгельмъ Темпель (род. въ 1821 г., умеръ въ 1889 г.) принадлежить къ числу усерднъйшихъ искателей кометь. Литографъ по профессіи, онъ вмъстъ въ тъмъ былъ образцовымъ наблюдателемъ кометъ н туманныхъ пятенъ. По происхожденію В. Темпельнъмецъ; онъ родился въ Нидеръ-Кунерсдорфъ (Nieder-Cunersdorf, Prov. Schlesien), работаль же въ Венеціи. Дивное южное небо увлекло его, и онъ сталь наблюдать небесныя свътила; обладая талантомъ рисовальщика, онъ отличался замъчательно точнымъ воспроизведениемъ свётовыхъ стей туманныхъ иятенъ. Осматривая ихъ, онъ въ 1859 г. открылъ (случайно) комету, единственную въ этомъ году. Комета была довольно яркая и имъла небольшую косу. Элементы орбиты этой кометы были опредълены восемью астрономами, что было весьма лестно выступающему на астрономическое поприще Темплю. Своими прекрасными рисунками туманныхъ пятенъ онъ привлекъ рниманіе астрономовъ; въ 1860 г. ему было предложено мъсто ассистента въ Марсельской обсерваторіи; должность эту онъ занималъ въ теченіе десяти лёть и за это время открыль десять кометь и четыре малыя планеты. Рвеніе его было удивительное и выше всякой похвалы. Не следуеть забывать, что онъ, какъ не

получившій астрономическаго образованія, являлся самоучкой и тъмъ не менъе заняль видное мъсто въ избранной имъ спеціальности. Въ 1870 г., когда возгорълась война между нъмцами и французами, Темпель долженъ быль не только покинуть свой пость ассистента Марсельской обсерваторіи, но, какъ нъмецъ, выбхать изъ предбловъ Франціи; онъ поступиль ассистентомъ въ обсерваторію Брера около Милана; здъсь онъ снова принялся за свое любимое занятіе-наблюденіе туманныхъ пятенъ и разысканіе кометь и до 1874 г. открыль четыре кометы; вмъстъ съ твиъ онъ открылъ много слабыхъ туманныхъ иятенъ. Въ 1875 г. онъ получилъ предложение занять должность адъюнктъ-астронома въ обсерваторіи Арчетри близъ Флоренціи; и здёсь онъ также открылъ комету.


Изъ числа открытыхъ имъ кометъ три оказались періодическими; двѣ, № 2 и № 7, носять его имя, третья же, № 4, открытая имъ, а въ слѣдующемъ появленіи Л. Свифтомъ, называется кометою Темпля—Л. Свифта.

Первая періодическая комета (№ 2 по приведенному выше списку) открыта Темплемъ 3 апрѣля 1867 года въ Марсели. Въ кометномъ каталогѣ она обозначена кометою 1867 II, такъ какъ она была второю въ этомъ году; первая была открыта Стефаномъ въ Марсели жс. Первыя наблюденія указали на эллиптичность орбиты, что и подтвердилось дальнѣйшими наблюденіями. Періодъ былъ опредѣленъ въ 5 лѣтъ. Орбита имѣетъ небольшую наклонность къ плоскости эклиптики и вслѣдствіе этого комета можетъ приблизиться

довольно значительно къ Марсу и Юпитеру, а затѣмъ, подъ вліяніемъ тяготѣнія къ нимъ, уклониться отъ первоначальной орбиты. Д-ръ Зелигеръ, вычисливъ тяготѣніе кометы Темпля къ Юпитеру, указалъ, что прохожденіе кометы черезъ перигелій замедлится на 117 дней, и комета появится въ 1873 году; и дѣйствительно, комета появилась, ее наблюдали, и оказалось, что она прошла черезъ перигелій 9-го мая, всего на три дня раньше предвычисленнаго.

Затъмъ комету наблюдали при слъдующемъ ея появления въ 1879 году и съ тъхъ поръ ея ни разу не видъли. Послъднее прохождение черезъ перигелий ожидалось въ апрълъ 1905 года, судя по вычислениямъ г. Готье, но комета не была разыскана; она, въроятно, подверглась участи нъкоторыхъ періодическихъ кометъ—разложению въ метеорный потокъ. О существовании этого потока едва ли мы когда-нибудь узнаемъ, такъ какъ онъ не пересъкаетъ орбиту Земли, и слъдовательно ни одна изъ его падающихъ звъздъ не заблеститъ въ нашей атмосферъ...

Вторая періодическая комета Темпля открыта имъ 3-го іюля 1873 года въ Брерѣ возлѣ Милана (№ 8 нашего списка); она также отличается короткимъ періодомъ обращенія вокругъ Солнца, именно 6,54 лѣтъ. Какъ и у первой періодической кометы, носящей имя Темпля, наклонность орбиты къ эклиптикѣ незначительная; перигелій орбиты лежитъ за орбитою Марса, и среди всѣхъ періодическихъ кометъ разстояніе перигелія ея орбиты является вторымъ по величинѣ. Послѣ открытія кометы въ 1873 г. она была наблюдаема при трехъ слѣдующихъ появленіяхъ:



Lewis Swift F. R. A. S.

Рис. 20. Левисъ Свифтъ, искатель кометь.

въ 1878, 1899 и 1904 годахъ. Въ 1878 г. первое наблюдение надъ вернувшеюся кометою произведено самимъ Темплемъ, а въ 1899 г.— г. Перрине въ Ликской обсерваторіи.

При появленіи своемъ въ 1904 году, комета была открыта астрономомъ Жавеллемъ въ Ниццѣ; она была слаба, размыта и безъ ядра. Ближайшее появленіе ожидается въ 1911 году; вѣроятно, она будетъ еще слабѣе, и весьма возможно, что ее не удастся разыскать; она можетъ подвергнуться участи первой кометы Темпля.

### Комета Темпля-Л. Свифта.

Въ 1869 году астрономы наблюдали три кометы: первую изъ нихъ открылъ Виннеке въ Карлсруэ, а двъ другія—Темпель въ Марсели. Третья комета была открыта имъ 27 ноября; она была слабая, телескопическая и могла быть наблюдаема только до 31 декабря. Профессоръ Брунсъ въ Лейпцигъ, сравнивъ наблюденія съ элементами пораболической орбиты, убъдился, что комета движется не по параболъ, а по эллипсу; къ сожальнію, ни эксцентриситеть эллипса, ни періодъ обращенія кометы вокругъ Солнца не могли быть выведены съ достаточную точностью изъ небольшого числа наблюденій надъ кометою Темпля, а потому не было возможности предсказать времени ея будущаго появленія. Но комета не пропала для науки; ее наблюдали въ 1880, 1891 и 1908 годахъ.

Извъстный искатель кометь Л. Свифть 1) въ Рочестеръ открыль слабую комету 10 октября. Какъ только опредълили ея орбиту, выяснилось, что ея элементы имъють полное сходство съ элементами кометы Темняя 1869 года; дальнъйшія изысканія надъ ея движеніемъ убъдили астрономовъ, что кометы Л. Свифта (1880 IV) и Темпля (1869 III) — тождественны между собою: это одна и та же комета, наблюденная въ два появленія. Изъ разсмотрънія всъхъ наблюденій быль опредъленъ періодъ обращенія кометы вокругъ Солнца въ 5—6 лътъ, откуда заключили, что промежуточное появленіе кометы, имъвшее мъсто въ 1875 году, не удалось наблюдать.

Появленіе кометы Темпля-Л. Свифта въ 1886 году не могло быть наблюдаемо изъ-за невыгоднаго положенія относительно Солнца. Вообще слъдуеть замътить, что эта комета можеть быть наблюдаема только черезъперіодъ, напримъръ, во всѣ нечетныя появленія, считая появленіе 1869 года за первое; во всѣхъ же четныхъ появленіяхъ комета утопаеть въ лучахъ Солнпа.

Пятая комета 1891 года была комета Темпля-Л. Свифта; ее открылъ 27 сентября Э. Бернердь въ Ликской обсерваторіи на горъ Гамильтона. Комета была очень слаба, такъ что съ большимъ трудомъ могла быть наблюдаема.

<sup>1)</sup> Біографію жестяника-астронома Левиса Свифта читатель найдеть въ моей книгь «Друзьямъ и Любителямъ Астрономіи».

#### Комета Врорзена.

26-го февраля 1846 года астрономъ Брорзенъ открыль въ Килъ телескопическую комету. Первыя же наблюденія обнаружили эллиптичность ея орбиты, а позднъйшія представили возможность определить величину періода ея обращенія вокругъ Солнца; періодъ оказался небольшимъ-всего 5<sup>1</sup>/2 лѣтъ. Элементы орбиты были вычислены Гужономъ и Петерсеномъ. Ближайшее появление было предсказано на ноябрь 1851 года, но вслъдствіе неблагопріятныхъ условій ее не удалось наблюдать; ее наблюдали при слъдующемъ появленій въ 1857 году; затёмъ ее наблюдали при появленіяхъ въ 1868, 1873 и 1879 годахъ. Такимъ образомъ эта комета принадлежитъ къ свътиламъ нашей Солнечной системы, совершая полное обращеніе вокругь Солнца въ 5,46 года. Перигелій кометы лежить въ серединъ между орбитою Земли и Солнцемъ; въ афеліи же она немного переходить за орбиту Юпитера. При возвращении кометы Брорзена къ Солнцу въ 1899 году ее не могли видъть, несмотря на все стараніе, приложенное астрономами: ее не видъли также и въ 1904 году, когда она должна была снова приблизиться къ Солнцу и Землъ. Такимъ образомъ и эта комета должна считаться пропавшей.

#### Комета Виннеке.

Въ небольшомъ городъ Марліа округа Лукка въ съверной Италіп, въ началъ XIX стольтія занимался астрономіей при весьма скромной обстановкъ нъкій

Понсъ (Pons), неутомимый наблюдатель и искатель кометь; ему удалось открыть 37 кометь; всё онё, за исключеніемь одной, носять его имя. Комета, потерявшая имя этого испытателя неба, открыта имъ 12 іюня 1819 года; она была слабая, телескопическая и могла быть наблюдаема только до 19 іюля, когда она исчезла изъ виду астрономовъ, не обладавшихъ въ то время такими чудными и сильными телескопами, какъ современные астрономы.

Орбита кометы Понса была вычислена несколькими астрономами и между прочимъ профессоромъ Энке, доказавшимъ, что параболическая орбита не удовлетворяеть наблюденіямь. Всё наблюденныя положенія кометы Понса могуть быть хорошо размьщены вдоль эллиптической орбиты. Вычисленія Энке подтвердились самымъ блестящимъ образомъ, когда комета была вновь открыта астрономомъ Виннеке въ Бонив въ 1858 году, после того, какъ она со времени своего открытія совершила семь подныхъ оборотовъ вокругъ Солица. Виннеке открылъ комету въ мартъ 1858 г., а послъднее наблюдение произведено 22-го іюня того же года; время обращенія кометы опредівлено въ 5,8 лътъ. Сътъхъ поръ комету наблюдали при ея возвращении къ Солнцу въ 1869, 1886, 1892, 1898 и 1909 годахъ. При своемъ появленіи въ 1892 г. комета была очень слаба, но имъла хорошо выраженное ядро; при слъдующемъ своемъ появлении въ 1898 г. она была значительно слабе, и не было заметно ръзкаго ядра. Въ 1904 г. ее не могли видъть вслъдствіе невыгоднаго для наблюденій положенія кометы относительно Солнца. Ближайшее появление ея ожидалось въ концѣ 1909 года; она дѣйствительно появилась; въ первый разъ ее наблюдали какъ весьма слабое свѣтило 30 декабря въ Алжирѣ въ созвѣздін Южныхъ Рыбъ ( $\alpha = 21^h 54^m$ ,  $\delta = -26^\circ 25'$ ). Слабостью своего блеска она внушаетъ опасеніе, что и она уже разлагается въ метеорный потокъ и болѣе не будетъ видима, какъ обособленное свѣтило.

### Комета де-Вико-Э. Свифта.

Чудное небо Италіи особенно благопріятствуєть астрономическимь наблюденіямь; чистота и прозрачность являются отличительными чертами воздуха Италіи, омываемой моремь съ трехь сторонь. Итальянскіе астрономы съ любовью пользуются драгоцівнымь даромь природы: они доставили наукі многихь замічательных наблюдателей и ученыхь. Въ Италіи изобрітень телескопь и впервые примінень къ наблюденію небесныхь світиль и явленій; въ Сициліи открыта первая малая планета Церера; въ Италіи открыта величайшая комета (1858 г.), и вообще произведено много замічательныхь наблюденій и открытій.

Въ началъ XIX столътія въ небольшой обсерваторіи Римской Коллегіи (Collegio-Romano), принадлежащей Іезуитскому Ордену, открыто много кометь; особенно прославился ихъ разысканіемъ де-Вико. Изъ числа кометъ, носящихъ его имя, одна, открытая 22-го августа 1844 года, привлекла всеобщее вниманіе астрономовъ, какъ наблюдателей, такъ и теоретиковъ, послъднихъ даже скоръе, чъмъ первыхъ. Самъ де-Вико

первый вычислиль элементы открытой имъ кометы, предположивъ, что движение происходить по параболъ, но французский астрономъ Фай, воспользовавшись большимъ числомъ наблюдений, чъмъ де-Вико, сразу



Рис. 21. Эдуардъ Свифтъ.

замѣтилъ, что комета движется по эллиптической орбитѣ, совершая обращеніе вокругъ Солнца въ 1996 дней (5¹/2 лѣтъ); къ тому же самому заключенію пришли астрономы Николан, Хайндъ, Гольдшмидтъ, Брюновъ и Ле-Верье; особенное стараніе къ изученію

движенія кометы приложили Брюновъ и Ле-Верье; ихъ изслѣдованія продолжались болѣе десяти лѣтъ и имѣютъ высокое научное значеніе.

Наблюденія надъ кометою были многочисленныя и точныя; вычисленіе элементовъ орбиты произведено съ возможнымъ стараніемъ, и періодъ, выведенный названными астрономами, могъ считаться настолько точнымъ, что предсказание появления кометы 1850 году, разсматривалось какъ вполнъ безошибочное; была полная увфренность въ томъ, что комету удастся наблюдать: но комету не разыскали. Несмотря на тщательныя вычисленія эфемеридь кометы (видимыхъ ея положеній на небъ для каждаго ея появленія, ея не находили въ теченіе восьми последующихъ появленій; ее причислили къ разряду пропавшихъ. Ле-Верье и Брюновъ взялись за рѣшеніе вопроса, почему ея не видъли въ 1850 г. и почему ее не наблюдали до 1844 года. Правда, комета де-Вико принадлежитъ къ телескопическимъ, но во время ея наибольшей яркости въ сентябръ 1844 года, она была прекрасно видна просто глазомъ. Въ телескопъ она представляла хорошо очерченное ядро съ косою, направленною въ сторону, противоположную Солнцу. Нътъ сомнънія, что ее могли видъть до 1844 года и послъ, а между тъмъ ее не видъли. Ле-Верье высказаль въ 1847 г. слъдующія соображенія:

«Комета 1844 года (де-Вико) могла, какъ и другія кометы, придти къ намъ изъ самыхъ отдаленныхъ областей небеснаго пространства и утвердиться среди планеть подъ могучимъ дъйствіемъ Юпитера. Появленіе ея, безъ сомнънія, произошло много столътій тому

назадъ. Съ тъхъ поръ она часто проходила вблизи Земли; но ее наблюдали только одинъ разъ въ прежнія времена, за 166 лътъ до появленія ея въ 1844 году, именно въ 1678 г. Эта комета будетъ долгое время описывать тотъ же самый вытянутый эллипсъ, который она описываетъ теперь. Но придетъ время, когда она приблизится къ орбитъ Юпитера и притомъ съ противоположной стороны относительно перваго ея появленія, когда она подошла къ Солнечной системъ: тогда ея путь снова измънится. Очень можетъ бытъ, что Юпитеръ вернетъ ее въ тъ же пространства, откуда онъ ее выхватилъ».

Если предположенія Ле-Верье относительно прошлаго кометы де-Вико, подтверждаемыя и Брюновымъ, можно считать за въроятныя, то относительно будущаго они не оправдались.

Въ Центральной станціи для передачи астрономических телеграммъ въ Килъ была получена 21-го ноября 1894 года слъдующая телеграмма:

«Эдуардъ Свифтъ въ Горномъ Эхо въ Калифорніи открылъ очень слабую комету; ноября 20,5 Гринвичскаго средняго времени, прямое восхожденіе 334°36'; полярное разстояніе 103°7'; движеніе медленное къвостоку».

Открывшій комету Эдуардъ Свифть—сынь извѣстнаго жестяника-астронома Левиса Свифта, краткая біографія котораго изложена въ моей книгѣ «Друзьямъ и Любителямъ Астрономіи» (стр. 339).

Какъ только элементы орбиты кометы Э. Свифта были вычислены, нъмецкій астрономъ Берберихъ въ письмъ къ проф. А. Крюгеру, пздателю журнала

«Astronomische Nachrichten», отъ 23-го ноября, обращаетъ вниманіе на большое сходство орбиты новой кометы съ орбитою кометы де-Вико 1844 г. Совершенно независимо къ тому же заключенію пришелъ французскій астрономъ Шульгофъ, о чемъ директоръ Парижской Обсерваторіи Тиссеранъ посылаетъ тому же А. Крюгеру 1-го декабря слъдующую депешу: «Сотейе Swift identique à comète 1844 I de-Vico» (Комета Свифта тождественна съ кометою 1844 I де-Вико).

Шульгофъ въ замѣткѣ о тождествѣ кометъ Свифта и де-Вико, напечатанной въ «Astronomische Nachrichten», т. 137, стр. 38, сообщаетъ результаты вычисленій Ле-Верье надъ движеніемъ кометы де-Вико въ прежнее время до 1844 года. Двигаясь въ плоскости, мало наклоненной къ плоскости эклиптики, комета близко подходила къ Марсу и Юпитеру и подвергалась вліянію тяготѣнія къ нимъ; вслѣдствіе этого элементы орбиты измѣнялись въ широкихъ предѣлахъ. Долгота перигелія постоянно увеличивалась, а долгота узла постоянно уменьшалась. Измѣненіе элементовъ приведено въ слѣдующей таблицѣ:

Время,	Долгота перигелія,	Долгота уз <b>л</b> а.	Наклон- ность,	Среднее суточ- ное движеніе,
	π	$\Omega$	i	μ
1753	315°.6	$306^{\circ}.8$	$2^{\circ}.2$	604".9
1763	$320^{\circ}.4$	$159^{\circ}.9$	$1^{\circ}.4$	611 <b>".3</b>
1775	324°.8	$145^{\circ}.0$	$4^{\circ}.8$	61 <b>4".</b> 3
1787	$329^{\circ}.5$	$141^{\circ}.5$	$6^{\circ}.6$	608".9
1799	$334^{\circ}.4$	$135^{\circ}.3$	$5^{\circ}.9$	606".2
1811	$338^{\circ}.4$	$118^{\circ}.5$	40.0	613".8
1844	$342^{\circ}.5$	$63^{\circ}.8$	$2^{\circ}.9$	649".9

Элементы кометы Свифта въ 1894 г. имѣли слѣдующее значеніе:

1894 345°.3 48°.6 3°.0 612″.1

Сравнивая эти элементы съ элементами предыдущей таблицы, мы приходимъ къ заключенію, что въ тождествъ объихъ кометъ не можетъ быть никакого сомнънія.

«Неожиданное открытіе кометы де-Вико, — говорить Л. Шульгофъ, утерянной въ течение 50 лътъ п разысканной при ея девятомъ возвращени къ Солнцу, представляеть факть громадной важности; онъ проливаеть яркій свёть на таинственныя условія, вследствіе которыхъ такъ много періодическихъ кометъ ускользнуло, повидимому, навсегда отъ взоровъ астрономовъ или послъ первато своего появленія, или же, какъ это было съ кометою Брорзена, послъ нъсколькихъ появленій. Въ 1844 г. комета де-Вико была яркая и въ теченіе нъсколькихъ дней была видима даже просто глазомъ; элементы ея орбиты были опредълены довольно хорошо, и темъ не мене ея не могли видеть при следующихъ возвращенияхъ къ Солнцу, хотя ее тщательно разыскивали, особенно въ 1855 г., когда условія видимости были благопріятны».

Въ чемъ же заключаются эти таинственныя условія? Очень можеть быть, что вслѣдствіе особыхъ причинъ, напримѣръ, дѣйствія солнечныхъ лучей, комета ярко заблеститъ; при этомъ выдѣлится изъ нея безъ остатка тотъ газъ, который легко поддается свѣченію, и затѣмъ комета снова станетъ невидимою. Мгновенныя вспышки блеска наблюдались у кометъ Біела,

Понсъ-Брукса, Саверталя (1888 I), Брукса (1889 V) и др.; выдёленіе изъ ядра газообразнаго вещества для образованія косы наблюдалось у каждой блестящей кометы. Вспышки блеска у кометь бывали часто, и весьма возможно, что одна изъ нихъ была въ 1844 и 1894 гг., а въ промежуточное время комета была невидимою. Увидимъ ли мы ее когда-нибудь, —отвётить на этотъ вопросъ въ данную минуту нельзя.

## Комета Перринэ.

Астрономъ Перринэ въ Ликской обсерваторіи открыль 8 декабря 1896 г. слабую телескопическую комету, которую наблюдали во многихъ мъстахъ; изъ вычисленій оказалось, что комета принадлежить къ періодическимъ съ короткимъ періодомъ въ 6,44 года. Въроятная ошибка въ опредълении періода была очень мала, именно ± 0,02 года, такъ что можно было надъяться увидъть комету при слъдующихъ ея появленіяхъ. Ожидаемое въ 1903 году приближеніе къ Солнцу было весьма неблагопріятно, такъ какъ комета все время оставалась въ лучахъ Солнца, и вслъдствіе этого ее не видъли. Но въ 1909 году комету наблюдали; ее открыль г. Копфъ на фотографической пластинкъ въ Кенигштульской обсерваторіи возлъ Гейдельберга. При дальнъйшемъ своемъ движеніи комета была такъ слаба, что большая часть наблюденій произведена на фотографическихъ пластинкахъ свътосильныхъ телескоповъ въ Кенигштулъ и въ Гринвичъ. Въ настоящее время ея періодъ опредъленъ съ большою точностью. Орбита кометы такъ расположена, что при времени обращенія кометы вокругъ Солнца въ 6<sup>1</sup>/2 лѣтъ она хорошо видна при одномъ появленіи, а при другомъ находится въ лучахъ Солнца; всѣ нечетныя появленія благопріятны для наблюденія, а четныя—нѣтъ.

#### Комета Финлея.

Астрономъ Капской обсерваторіи Финлей открыль слабую комету 26-го сентября 1886 г.; по счету она была седьмая въ этомъ году. Несмотря на слабый блескъ кометы, она была наблюдаема до апръля 1887 года; послъднее наблюдение произведено въ Пулковской обсерваторіи. Вычисленіе орбиты произведено различными астрономами, при чемъ обнаружился ръзко-выраженный эллиптическій характерь ея орбиты съ періодомъ обращенія въ 6,6 лётъ. Наивъроятнёйшая орбита опредёлена Шульгофомъ въ Парижъ. На основании его вычислении можно было ожидать следующее появление кометы въ 1893 году; она дъйствительно появилась и была открыта самимъ Финлеемъ 17-го (4-го) мая въ Капской обсерваторін на мысъ Доброй Надежды. Въ 1900 году ее нельзя было наблюдать изъ-за неблагопріятнаго ея положенія относительно Солица, а въ 1906 году она была снова наблюдаема; ее открылъ астрономъ Копфъ въ Кенигштуль возль Гейдельберга на фотографической пластинкъ. Такимъ образомъ и эта комета стала постояннымъ членомъ Солнечной системы, но спрашивается, на долго ли? Какъ и другія періодическія кометы, она можеть разложиться въ метеорный потокъ, и тогда она не будетъ видима.

## Комета д'Аррэ.

Д'Apps (D'Arrest) принадлежить къ числу астрономовъ нъмецкой школы, отличающихся строгою и изящною обработкою наблюденій. Онъ родился въ Берлинт въ 1822 г. и получилъ прекрасную научную подготовку въ Берлинскомъ университетъ и обсерваторіи подъ руководствомъ знаменитаго Энке. Въ 1848 г. онъ поступаетъ астрономомъ-наблюдателемъ въ Лейпцигскую обсерваторію, а въ 1857 г. въ Копенгагень—на должность астронома новой сооружавшейся тамъ обсерваторіи. Въ его капитальномъ трудъ «Siderum nebulosorum observationes Havnienses», изданномъ въ Копенгагенъ, заключается опись многихъ открытыхъ имъ туманныхъ пятенъ. Безъ этого каталога не можеть обойтись ни одинъ искатель кометь, ни одинъ астрономъ, изучающій туманныя пятна.

Въ Лейпцигѣ, при изучении туманныхъ пятенъ, ему посчастливилось 27-го іюня 1851 г. открыть комету. Д'Аррэ самъ вычислилъ элементы орбиты и убѣдился, что комета движется по эллипсу въ 6¹/2 лѣтъ приблизительно. Дальнѣйшія наблюденія подтвердили его вычисленія, и явилась возможность съ достаточною точностью предсказать ея вторичное появленіе въ 1857 г., когда комету открыли по эфемеридѣ, вычисленной французскимъ академикомъ Виларсо (Yvon Villarceau); она была открыта 5-го декабря Маклиромъ въ Канской обсерваторіи на мысѣ Доброй Надежды. Въ слѣдующемъ своемъ появленіи она не

была паблюдаема изъ-за близости къ Солнцу, но въ 1870 г. ее отлично видъли и наблюдали. Первое наблюденіе произведено 31-го августа Виннеке въ Карлсруэ, а послъднее—20-го декабря Шмидтомъ въ Аеинахъ. Затъмъ комету наблюдали при ея появленіяхъ въ 1877, 1890 и 1897 годахъ; ея періодъ обращенія вокругъ Солнца 6,7 лътъ. Ближайшее появленіе кометы ожидается въ 1910—1911 годахъ.

### Комета Вольфа.

Извъстный своими изслъдованіями въ области небесной фотографіи М. Вольфъ открыль 17-го сентября 1884 г. въ Кенигштулъ, возлъ Гейдельберга, слабую комету, которая увеличивалась въ яркости до конца года и затъмъ могла быть наблюдаема до апръля слъдующаго 1885 года; послъднее наблюдение произведено Юнгомъ 6-го апръля въ Принсетонской обсерваторін въ штатъ Нью-Горка. Съ сентября 1884 до апръля 1885 г. получено около 900 наблюденій надъ кометою, изъ которыхъ удалось вывести точную орбиту, оказавшуюся эллиптическою съ періодомъ обращенія кометы вокругъ Солнца въ 6,77 летъ. Вследствие этого ближайшее появление кометы можно было ожидать въ 1891 году: она дъйствительно появилась и была открыта 1-го мая г. Шпиталеромъ въ Вънъ; это появленіе кометы Вольфа было очень благопріятное для астрономическихъ наблюденій; комета увеличивалась въ своемъ блескъ и въ началъ 1892 года могла быть наблюдаема въ самые маленькие телескопы. Комета была наблюдаема до 31-го марта 1891 года, когда было

произведено послъднее наблюдение тъмъ же Шпатилеромъ въ Вънъ, которымъ она была открыта.

Третье появление кометы Вольфа было въ 1898 г.; ее открыль 16-го іюня астрономъ Ликской обсерваторіи Хессей (Hussey); комета была очень слабая. Затъмъ она должна была появиться въ 1905 году, ее старательно искали, но тщетно. Вернется ли она въ 1912 году—въ настоящее время сказать нельзя. Весьма возможно, что вещество ядра разложилось вдоль орбиты, и кометы мы болъ никогда не увидимъ.

#### Комета Хольмса.

Астрономъ Хольмсъ (Holmes) въ Лондонъ открылъ 6-го ноября 1892 года довольно яркую, хотя и телескопическую, комету около большого туманнаго пятна въ созвъздіи Андромеды. Событіе это было знаменательно для лондонскихъ астрономовъ въ томъ отношеніи, что вследствіе малой прозрачности лондонскаго неба разыскание кометь является тамъ вершенно безцъльнымъ занятіемъ. Независимо отъ Хольмса комета была открыта и другими астрономами, но нъсколькими днями позже, а именно: 8-го ноября Андерсономъ въ Эдинбургъ и 9-го ноября Давидсономъ въ Квинслендъ. Нъсколькими днями раньше, именно 3-го ноября, видёль ее В. А. Пость въ Ньюпортъ въ Соединенныхъ Штатахъ, но не обратилъ на нее должнаго вниманія, полагая, что это извъстное туманное пятно. Мнъ удалось наблюдать эту комету въ Абасъ-Туманъ на Кавказъ. По мъръ удаленія кометы отъ Солнца она расплывалась въ безформенную туманную массу; въ такомъ видъ она оставалась д 16-го января; вдругъ, совершенно неожиданно, ве щество кометы соединилось въ одну точку, имъвшую блескъ звъзды 8-й величины, и образовалась небольшая коса. Сохранивъ подобный видъ въ теченіе нъсколькихъ дней, она затъмъ опять приняла прежній видъ слабой безформенной туманности и совершенно скрылась изъ вида. Многочисленныя наблюденія надъкометою Хольмса обнаружили эллиптическій характеръ ея орбиты съ періодомъ обращенія въ 6,87 лътъ. Вся ея орбита помъщается внутри орбиты Юпитера, и въ настоящее время кажется необъяснимымъ, почему до 1892 года ее не наблюдали.

Вторичное появленіе кометы Хольмса было въ 1899 году; ее открыль астрономъ Перрине въ Ликской обсерваторіи 10-го іюня; комета своею внѣшностью ничего особеннаго не представляла. Послѣдній разъ она была наблюдаема въ 1906 году; ее открыль 28-го августа астрономъ Вольфъ въ Кенигштулѣ возлѣ Гейдельберга на фотографической пластинкѣ. Ближайшее появленіе ожидается въ концѣ 1913 года.

## Бруксъ и его періодическія кометы.

Въ скромномъ американскомъ городкѣ Женевѣ, лежащемъ къ юго-востоку отъ большого торговаго Рочестера, въ штатѣ Нью-Іоркъ, на средства Смита устроена астрономическая обсерваторія для публики; она извѣстна подъ именемъ обсерваторіи Смита (Smyth Observatory, Geneva, N.-Y., U. S. A.). Завѣдываетъ



Yhu & Brooks

Рис. 22. Вильямъ Бруксъ.

обсерваторіей изв'єстный искатель кометь астрономъ Вильямъ Бруксъ.

Въ каждый ясный вечеръ обсерваторія открыта




Рис. 23. В. Бруксъ въ своей обсерваторіи.

для публики, и на обязанности Брукса лежитъ показывать любознательнымъ посътителямъ небесныя свътила, объяснять наблюдаемыя явленія и вообще рас-

остранять астрономическій знанія среди жителей города и посътителей обсерваторін изъ прівзжихъ; это главная задача Смитовской обсерваторіи. Казалось бы, что при такихъ условіяхъ Вруксу не остается ни одной свободной минуты для научныхъ наблюденій; но онъ обладаеть прекраснымь здоровьемь и необыкновенною энергією; ті немпогія минуты, которыя бывають въ его распоряжении между посъщеніями обсерваторін публикою, не пропадають даромь; онь употребляеть ихъ на осмотръ неба. Затъмъ, послъ полуночи, когда обсерваторія закрывается для публики, Бруксъ принимается за наблюденія; любимъйшее его занятіе-исканіе кометь; въ этомъ дълъ онъ достигъ совершенства. Среди здравствующихъ астрономовъ у него только одинъ соперникъ-извъстный жестяникъ Свифтъ, начавшій свои разысканія кометь въ соседнемъ городе Рочестере.

Къ полуночи въ городѣ водворяется тишина, на улицахъ и площадяхъ потухаютъ фонари; наступаетъ мракъ, которымъ такъ дорожатъ астрономы, производящіе наблюденія надъ слабыми свѣтилами съ нѣжными очертаніями. Въ это время всѣ посѣтители уходятъ изъ обсерваторіи, оставляя тамъ одного Брукса; тогда-то именно и начинается его работа. Ни усталость, ни сонъ не одолѣваютъ пылкаго астронома; онъ работаеть всю ночь, и только утренняя заря, при появленіи которой блекнутъ всѣ свѣтила, заставляетъ его прекращать свои любимыя занятія.

Въ распоряжени В. Брукса имъется десятидюймовый рефракторъ; сравнительно съ гигантами-телескопами этотъ инструментъ является весьма скромнымъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ Свверной Америки многія среднія учебныя заведенія снабжены подобными и даже большими рефракторами; тъмъ не менъе въ рукахъ В. Брукса его рефракторъ доставляетъ ему большое удовлетвореніе, а наукъ—много цънныхъ наблюденій и славныхъ открытій.

Разысканіе кометь Бруксь производить слѣдующимь образомь. Выбравь небольшую часть неба и тщательно осмотрѣвь ее, онъ переходить въ извѣстномь порядкѣ къ осмотру другой части неба. Розыски кометь производятся въ безоблачную, ясную и непремѣнно безлунную ночь; если на небѣ красуется луна, то всѣ слабыя свѣтила и туманныя пятна становятся невидимыми, и тогда разысканіе кометь—напрасная трата времени. Наблюдатель долженъ знать положеніе всѣхъ туманныхъ пятенъ въ избранной для осмотра части неба, иначе онъ можеть принять одно нзъ нихъ за комету ¹). Всякое слабое свѣтило внимательно изслѣдуется, и Бруксъ переходить къ осмотру другой части неба только тогда, когда онъ убѣдится, что въ

<sup>1)</sup> Каталоги туманных пятень читатель можеть найти въ слѣдующихъ книгахъ:

<sup>1.</sup> Sir. J. W. Herschel, F. R. S. Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (Philosophical Transactions vol. 1864).

<sup>2.</sup> J. L. E. Dreyer. A supplement to Sir John Herschel's General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars. (Transactions of the R. Irish Academy, 1878).

Кром'т того, необходимо им'ть въ виду туманныя пятна, открытыя посл'т изданія этихъ каталоговъ.

Въ «Звъздномъ Атласъ» Я. Мессера данъ списовъ наиболъе яркихъ туманныхъ пятенъ и звъздныхъ группъ; этотъ списовъ необходимо имъть каждому любителю Астрономіи.

первой нѣть кометы. Работа идеть медленно и со стороны кажется весьма скучной, но стоить только открыть одну комету, чтобы до конца своихъ дней не разставаться съ занятіемъ разысканія кометь. Опыть нѣкоторыхъ искателей кометь показаль, что на открытіе одной кометы требуется въ среднемъ 21 рабочая ночь. Терпѣніе можеть истощиться прежде, чѣмъ наблюдатель откроетъ комету. Тѣмъ не менѣе Бруксь открылъ 25 кометъ. Изъ всѣхъ кометъ Брукса мы разсмотримъ въ настоящей главѣ его періодическія кометы.

### А. Комета Понса-Брукса.

Адъюнкть-астрономъ Марсельской обсерватор!и И. Л. Поисъ 20-го іюля 1812 г. открыль комету; это было въ разгаръ нашей отечественной войны съ французами. Комета была довольно яркая. Независимо отъ Поиса, комета была открыта 31-го іюля русскимъ астрономомъ, академикомъ Вишневскимъ, и черезъ день—французскимъ астрономомъ Буваромъ. Въ то время телеграфъ не былъ изобрътенъ, и всъ три астронома открыли комету совершенно независимо одинъ отъ другого, но по праву первенства она названа въ честъ Поиса. Вишневскій находился въ то время въ Новочеркасскъ, гдъ въ тотъ же вечеръ произвелъ первое наблюденіе надъ большою кометою 1811 года при ея вторичномъ выступленіи изъ солнечныхъ лучей 1). Комета Поиса была наблюдаема до 27-го сен-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Большая вомета 1811 года описана въ моей книгѣ «Друзьямъ и Любителямъ Астрономіи», стр. 298.

тября. Наблюденія надъ нею, собранныя и обработанныя Энке, указывали на эллиптичность орбиты. при чемъ періодъ обращенія кометы вокругь Солнца опредълился въ 70,7 лътъ. Вслъдствіе этого ближайшее ея появление можно было ожидать въ 1882 году. Въ концъ семидесятыхъ годовъ прошлаго столътія французские астрономы Шульгофъ и Боссеръ предприняли обработку наблюденій кометы Понса, присоединивъ къ прежнимъ наблюденіямъ, использованнымъ Энке, необнародованныя въ то время наблюденія Бланпена и Фложерга; изъ совокупности всъхъ наблюденій они вывели для періода обращенія 73,2 года на 21/2 года больше, чемъ Энке. Затемъ Шульгофъ и Боссеръ составили эфемериду для разысканія кометы Понса. Совершенно независимо оть этой эфемериды, и въ другой части неба Бруксъ открылъ комету 1-го сентября 1883 г., которая оказалась, какъ доказано вычисленіями, кометою Понса. Періодъ ея обращенія вокругь Солнца опредёлился въ 71,56 года. Опредъление Энке оказалось ближе къ дъйствительности, чъмъ Шульгофа и Боссера. Комета была яркая, имъла косу въ 8 градусовъ и была видима просто глазомъ съ 20-го ноября 1883 г. по 22-е февраля 1884 года; черезъ перигелій она прошла 25-го января 1884 года.

Ближайшее появление кометы Попса-Брукса, названной такъ въ честь обоихъ астрономовъ, открывшихъ ее при двухъ появленияхъ, ожидается въ 1954 г. Разыскание кометы въ этомъ году будетъ значительно легче, чъмъ въ 1883 г., оно не будетъ носить характера случайнаго открытия. Въ настоящее время не-

ріодъ обращенія кометы хорошо опредёленъ, и положеніе ея можетъ быть предвычислено съ большою точностью.

### Б. Комета Ольберса-Брукса.

Комета Ольберса была открыта имъ 6-го марта 1815 года въ Бременъ 1) и въ этотъ же вечеръ произведено первое опредъление положения кометы относительно сосъднихъ звъздъ; послъднее же наблюдение надъ нею произведено Гаусомъ 25-го августа того же года. Орбита была опредълена многими астрономами а именно: Ольберсомъ, Триснекеромъ, Линденау, Гау сомъ, Николэ (Nicollet), Николаи (Nicolai), Бессе лемъ и Гинцелемъ. Гаусъ первый замътилъ эдлиптич ность орбиты и первый опредѣлилъ ея эксцентриси теть; затъмъ вычисление повторили Николаи, Бессель Николо и Гинцель. Для періода обращенія Николо по лучиль 72,99 года, Николаи—72,56 г., Бессель— 74,05 г., а Гинцель, опредъливъ элементы орбиты изт всёхъ наблюденій, которыми не могли пользоваться названные астрономы, такъ какъ наблюденія былі обнародованы впоследствии, получиль для період: значеніе, заключающееся между 72,33 и 75,68. Прі такой неопредъленности періода трудно было пред сказать точное время вторичнаго появленія кометы

Комета Ольберса по своему періоду похожа на ко мету Галлея (76,1 л.) и Понса-Брукса (71,6 л.). Бли жайшее появленіе кометы Ольберса можно было ожи дать около 1887—1890 годовъ. Комету начали разы

<sup>1)</sup> О жизни Ольберса см. стр. 54.

скивать съ 1886 года по эфемеридъ, составленной Гинцелемъ, но болъе года старанія астрономовъ не увънчались успъхомъ; полагали, что ее придется причислить къ пропавшимъ кометамъ. Вдругъ получается извъстіе, что 24-го августа 1887 года Брунсъ въ Фельисъ открыль комету, орбита которой, какъ выяснилось вычисленіями, тождественна съ орбитою кометы Ольберса. Бруксъ открыль эту комету также случайно, какъ и комету Понса. Открытая Бруксомъ комета названа въ честь обоихъ астрономовъ кометою Ольберса-Брукса. Періодъ обращенія оказался равнымъ 72,56 года. Слѣдующее — третье — появленіе кометы Ольберса-Брукса ожидается около 1960 года; точное предсказаніе возможно при условіи вычисленія возмущеній ея движенія отъ тяготьнія къ Юпитеру, Сатурну и другимъ планетамъ Солнечной системы; во всякомъ случат предсказание будеть точное, безошибочное, развъ что комета, подобно нъкоторымъ другимъ, разложится на части и не будетъ видима.

# В. Комета Брукса 1889 V.

Искатель кометъ В. Бруксъ въ Женевъ открылъ, между прочимъ, комету 6-го іюля 1889 года; по счету она была пятою въ этомъ году, и первая, открытая Бруксомъ. Она была телескопическая и по внъшнему виду ничъмъ не отличалась отъ другихъ кометъ, но вскоръ она заняла первое мъсто среди когда-либо появлявшихся и наблюденныхъ кометъ; ей посвящена

обширная литература 1). Первыя же наблюденія показали, что параболическая орбита не подходить подъ ея движеніе, что комета движется по эллипсу съ довольно короткимъ періодомъ обращенія въ 7 лѣтъ. Дальнѣйшія наблюденія подтвердили этотъ выводъ; изъ многихъ орбить особенною точностью отличалась орбита г. Баушингера, нынѣ директора Страсбургской обсерваторіи. Комету удалось наблюдать въ теченіе 556 дней; это весьма рѣдкій случай. Всего чаще комету наблюдаютъ только въ теченіе одного или двухъ мѣсяцевъ.

Хотя комета была телескопическая, но она имѣла небольшую косу въ 10′. Самое, однако, замѣчательное, что она представляла,—это дробленіе на части, происшедшее почти на глазахъ многихъ астрономовъ. Ядро раздѣлилось на 5 частей, и каждая изъ нихъ имѣла свою небольшую косу.

Дробленіе періодической кометы Брукса было замічено Э. Бернердомъ 1-го августа 1889 года въ Ликской обсерваторіи; онъ нашель, что она состоить изътрехь отдільныхъ кометь въ преділахъ трехъ минуть дуги. Наблюденіе было подтверждено въ слідующую ночь, при чемъ замічено, что число кометь болібе трехъ. Черезъ нісколько дней (6-го августа) комета была наблюдаема въ Вінів, и проф. Вейсъ телеграфироваль: «въ настоящее время комета четверная; отдаленнійшее ядро очень слабое; всів ядра кажутся окруженными світовымъ туманомъ». Въ большой 36-дюй-

<sup>1)</sup> Читатель можеть найти перечисление источниковь, вышедшихъ въ свъть до 1894 г. въ ценной книге Dr. J.G. Galle, открывшаго Нептуна, а именно: Verzeichniss der Elemente der bisher berechneten Cometenbahnen. Leipzig. 1894.

мовый рефракторъ Ликской обсерваторіи Бернердъ зам'єтиль 4-го августа пятое ядро и нарисоваль вс'є ядра кометы; Бернердъ изм'єряль разстояніе между




Рис. 24. Дробленіе кометы 1889 V, по рисунку В. Брукса.

главнымъ ядромъ кометы A и второстепенными В и C и обнаружилъ увеличение разстояния между ними. Вотъ его измърения:

		A-B.	A—C.
Августа	1	64''.14	
>>	2	65 <b>"</b> .73	264".97
>>	3	66".48	263".46
>>	4	68".50	267".55
>>	5	67".88	270".12

Главное ядро уходило впередъ, а второстепенныя какъ болъе удаленныя отъ Солнца, отставали.

Вторичное появленіе кометы Брукса ожидалось въ 1896 году. Положеніе кометы было предвычислено г. Баушингеромъ съ большою точностью. Комету разыскалъ г. Жавель (Javelle) въ Ниццѣ 22-го іюня 1896 года; она была одинокая; было видно только главное ядро; никакихъ особенностей въ своемъ физическомъ строеніи она не представляла, за исключеніемъ того, что была слабѣе, чѣмъ при первомъ появленіи. Черезъ семь лѣть она снова вернулась къ Солнцу и была видима; ее разыскалъ астрономъ Айткенъ въ Ликской обсерваторіи; комета была одинокая и чрезвычайно слабая.

Воть исторія періодической кометы Брукса. При первомъ своемъ появленіи она была сравнительно яркая и раздробилась на пять частей. При второмъ появленіи была видна только одна часть; остальныя исчезли; комета была слабая. При третьемъ ноявленіи комета была чрезвычайно слабая. Судя по этимъ тремъ появленіямъ кометы, можно предположить, что въ 1903 г. наблюдалось послѣднее появленіе кометы Брукса, и больше мы ея не увидимъ. По всей вѣроятности произошло дальнѣйшее дробленіе кометы на части, и все вещество, составлявшее комету, распредѣлилось вдоль ея орбиты.

#### Комета Файя.

Эта комета была открыта молодымъ французскимъ астрономомъ Файемъ (Faye) въ Парижѣ 22-го ноября 1843 года. Произведя нѣсколько наблюденій, онъ опредѣлилъ приближенные элементы, предполагая,

что комета движется по параболической орбитъ. По мъръ того, какъ число наблюденій увеличивалось, элементы орбиты тщательно исправлялись, и Фай замътилъ, что параболическіе элементы вовсе не удовле-



Рис. 25. Фай, членъ Парижской Академін Наукъ (1814—1902).

творяютъ наблюденіямъ; ясно обнаруживается эллиптичность орбиты; для опредъленія эксцентриситета орбиты и періода ея обращенія вокругъ Солнца Фай предполагалъ воспользоваться новъйшими наблюденіями, когда комета опишетъ довольно значительную

дугу по орбитѣ. Пока Фай собирался произвести эти вычисленія, ученикъ знаменитаго Гауса—молодой д-ръ Гольдшмидтъ уже вычислилъ эллиптическую орбиту и опредѣлилъ періодъ обращенія въ 7½ л. Затѣмъ А. Меллеръ, воспользовавшись всѣми наблюденіями надъ кометою Файя, вывелъ наиболѣе точное значеніе элементовъ орбиты и періода обращенія кометы вокругъ Солнца. Періодъ оказался равнымъ 7,4 лѣтъ. Комета называется иногда кометою Фай-Меллера.

Небольшой періодъ обращенія кометы невольно возбудилъ вопросъ, почему комету прежде ни разу не наблюдали. Нѣкоторые высказали предположеніе, что орбита кометы Файя была прежде параболическая, но подъ могущественнымъ вліяніемъ Юпитера превратилась въ эллиптическую; вычисленія Гольдшмидта показали, однако, что подобнаго вліянія Юпитеръ не могь оказать, такъ какъ комета не подходила близко къ Юпитеру. Французскій астрономъ Вальцъ полагаль, что комета Файя есть пропавшая комета Лекселя (см. ниже), но Ле-Верье доказаль, что и этого не могло быть. Оставалось только предположить, что комету Файя раньше не наблюдали только потому, что она слабая и случайно никто не открылъ ее.

Ле-Верье также опредълиль орбиту кометы Файя и, вычисливь тяготъне кометы къ Юпитеру, составиль эфемериду ея для ближайшаго появленія въ 1851 году. Комета дъйствительно вернулась къ Солнцу и была открыта Чалисомъ 28-го ноября 1850 г. въ англійскомъ Кембриджъ. Комета прошла черезъ перигелій 2-го апръля—на одинъ день позже пред-

сказаннаго Ле-Верье. Въ данномъ случав мы имвемъ первое точное предсказание вторичнаго появления періодической кометы. Читатель знаеть, что мальйшая ошибка въ значеніи элементовъ влечеть за собою большую ошибку въ предсказанномъ времени прохожденія кометы черезь перигелій. Для кометы Файя условія сложились весьма благопріятно, во-первыхъ, потому, что наблюденія при первомъ ея появленіи въ 1843 г. охватывали довольно большую дугу орбиты, во-вторыхъ, эксцентриситетъ оказался небольшимъсамый малый изъ всёхъ извёстныхъ намъ эксцентриситетовъ кометныхъ орбитъ, и, въ-третьихъ, усовершенствованные измърительные приборы, придълываемые къ телескопамъ, достигли значительнаго совершенства и представили возможность произвести весьма точныя наблюденія надъ кометою Файя.

Со времени открытія кометы Файемъ, она была наблюдаема при каждомъ своемъ появленіи, а именно: въ 1851, 1858, 1866, 1873, 1881, 1888 и въ 1895 гг. Что же касается появленія ея въ 1903 году, то вслъдствіе неудобнаго положенія относительно Солица она не была видна.

#### Комета Тетля.

Разсматриваемая періодическая комета открыта 4 января 1858 г. астрономомъ Гораціемъ Тетлемъ въ американскомъ Кембриджѣ, въ Соединенныхъ Штатахъ; она была первою кометою въ этомъ году (1858 I). Параболическіе элементы, опредѣленные тотчасъ послѣ первыхъ наблюденій, оказались тождественными съ элементами кометы 1790 II, открытой Мешеномъ и на-

блюденной знаменитымъ астрономомъ Месье. Это совпаденіе дало новодъ предположить, что комета движется не по параболъ, а по эллипсу. Тщательный разборъ всёхъ наблюденій кометы, произведенный директоромъ Лейпцигской Обсерваторіи К. Брунсомъ, подтвердилъ сдъланное предположение; Брунсъ доказалъ что между 1790 и 1858 годами комета совершила пять полныхъ оборотовъ вокругъ Солица, при чемъ она возвращалась къ нему въ 1803, 1817, 1830 и 1844 годахъ. Періодъ ея обращенія равенъ 13,67 лѣтъ. Опредѣливъ, такимъ образомъ, періодичность кометы, можно было предсказать ея ближайшее появление въ 1871 г., когда дъйствительно ее и открылъ астрономъ Борелли; первое наблюдение произведено 12 октября. Послъ этого комета Тетля дважды возвращалась къ Солнцу: въ 1885 и 1899 г. Въ 1885 г. ее открыли Перротенъ и Шарлуа въ Ниццъ (8 авг.), а въ 1899 г. Вольфъ въ Кенигштулъ возл'в Гейдельберга (5 марта). Ближайшее появление ожидается въ 1914 году.

#### Комета Галлея.

Эта комета открыта въ Англіи неутомимымъ труженикомъ астрономомъ Галлеемъ 15 августа 1682 года; она быстро увеличивалась въ своемъ блескъ, развернула роскошную косу; но также быстро поблекла и исчезла она была наблюдаема всего въ теченіе 26 дней, а именно съ 25 августа по 19 сентября.

Въ исторіи астрономіи комета Галлея играєть видную роль; она первая комета, для которой установлена періодичность; на ней астрономы убълились, что кометы




Рис. 26. Эдмундъ Галлей (1656—1742)

двигаются не только по параболамъ, какъ прежде предполагали, но и по эллипсамъ.

Галлей, еще до открытія разсматриваемой кометы, составиль каталогь кометь, появившихся и наблюденныхь до него; этоть трудь быль первый въ своемь родѣ. Въ каталогѣ кометь заключается не только списокъ когда-либо появившихся кометь, но и указаніе на всѣ обстоятельства ихъ движенія, т. е. элементы ихъ орбить, о которыхъ изложено въ главѣ 5-й.

Когда Галлей опредълилъ элементы орбиты кометы 1682 г., онъ замътилъ, что въ составленномъ имъ кометномъ каталогъ значатся двъ кометы, элементы которыхъ сходны съ элементами открытой имъ кометы, а именно; кометы 1531 и 1607 года. Первая была наблюдаема Апіаномъ и замъчательна въ томъ отношеніи, что для нея въ первый разъ доказали, что коса направлена отъ Солнца, а не къ нему; вторая комета была наблюдаема Лонгомонтаномъ и великимъ Кеплеромъ. Мы приводимъ здъсь элементы всъхъ трехъ кометъ по опредъленію Галлея:

Кометы.	1531 r.	1607 r.	1682 r.
Долгота восходящаго узла	$49^{\circ}$	$50^{\circ}$	51°
Наклонность	$162^{\circ}$	$163^{\circ}$	$162^{\circ}$
Долгота перигелія	$302^{\circ}$	$302^{\circ}$	303°
Разстояніе перигелія	0,567	0,587	0,583

Сравнивая между собою эти элементы, Галлей могь сказать:

Я вполить склоненть допустить, что комета 1531 г., наблюденная Апіаномъ, та же, что и 1607 г., опи-

санная Кеплеромъ и Лонгомонтаномъ, и наконецъ та же самая, которую я открыль и тщательно наблюдаль въ 1682 году. Элементы всъхъ трехъ появленій одни и тъ же, и если замъчается въ чемъ-нибудь разница, то только въ періодъ обращенія, что не удивительно, такъ какъ она можеть быть приписана различнымъ физическимъ причинамъ. Допуская возможность измъненій въ період вобращенія, мн в кажется, что комета, мною открытая, была наблюдаема и въ 1456 году; ее видъли лътомъ; она двигалась въ обратномъ направленіи и прошла между Землею и Солнцемъ приблизительно такимъ же образомъ, какъ и въ послъдній разъ. И хотя въ этотъ разъ мы не имфемъ точныхъ наблюденій, но я полагаю, что, сравнивая путь и время обращенія, можно не сомнъваться въ томъ, что комета 1682 года та же самая, которая являлась въ 1531 и 1607 годахъ. Вслъдствіе этого я могу предсказать съ достаточною точностью ея ближайшее появленіе въ 1758 году; если это предсказаніе осуществится, и комета д'яйствительно появится, то, по моему мниню, не должно болже оставаться ни малъйшаго сомнънія въ томъ, что и другія кометы могуть вторично появиться такимъ же обра-ЗОМЪ».

Позднъе, когда Галлей въ 1749 году напечаталъ свои «Астрономическія таблицы»,—за девять лѣть до предсказаннаго появленія кометы,—онъ опредѣленнѣе высказался относительно появленія кометы: «Таково согласіе элементовъ трехъ кометь, согласіе, которое было бы весьма странно, если бы это были три различныя кометы, или если бы это не было возвращеніе одной и той же кометы съ эллиптической орбитой, проходящей

воздѣ Солнца и Земли; если, слѣдовательно, согласно нашему предсказанію, она появится около 1758 года, то потомство вспомнить, что этимъ открытіемъ оно обязано англичанину». Комета дѣйствительно появилась, и потомство не забыло заслугъ великаго труженика; первая періодическая комета, обладающая значительнымъ блескомъ, названа именемъ астронома Галлея, открывшаго, наблюдавшаго и предсказавшаго появленіе кометы.

Коснувшись вопроса о предсказаніи появленія кометы, мы обратимъ вниманіе читателя на встрѣчающіяся при этомъ затрудненія. Дѣло въ томъ, что періодъ обращенія кометы вокругъ Солица не является постояннымъ, какъ это видно изъ слѣдующаго:

отъ 1531 до 1607 періодъ равенъ 27811 днямъ » 1607 » 1682 » » 27352 »

Періодъ обращенія подвержень значительнымъ колебаніямъ отъ одного до другого появленія кометы. Эти колебанія всецѣло зависятъ отъ взаимодѣйствія между планетами Солнечной системы и кометою, и потому для точнаго предсказанія будущаго появленія кометы необходимо вычислить вліяніе планетъ на движеніе кометы. Вычисленія подобнаго рода принадлежатъ къ труднѣйшимъ въ астрономіи; ихъ выполнили французскій математикъ Клеро и французскій астрономъ де-Лаландъ. Эта вторая часть исторіи Галлеевой кометы несравненно занимательнѣе первой.

По мѣрѣ того, какъ приближалось время возвращенія кометы, предсказанное Галлеемъ, астрономы принялись за ея разысканіе, но время появленія не было

точно опредълено. Мы знаемъ, что одинъ періодъ равняется 27811 днямъ, а другой-27352; разница въ 459 дней. Спрашивается: какова будеть продолжительность періода между третьимь и четвертымь появленіемъ. Будеть ли она уменьшаться, или же, наобороть, увеличиваться. Клеро вычисляеть вліяніе, которое оказывають Юпитерь и Сатурнъ на комету во время ея 75-лѣтняго странствованія. Работа эта, помимо теоретическихъ затрудненій, требуеть громаднаго механическаго труда-численныхъ выкладокъ. Времени оставалось немного, и потому Клеро обратился къ содъйствію знаменитаго астронома де-Лаланда, обладавшаго большою опытностью вычисленій; кром'є того, приняла участіе въ этой громадной работ Гортензія Лепоть женщина, всецвло преданная наукв. Благодаря искреннему участію всёхъ трехъ ученыхъ, работа была окончена въ ноябръ 1758 г., и Клеро могь уже къ этому времени представить Парижской Академіи Наукъ мемуаръ о движеніи кометы Галлея и объ ея предстоящемъ появленіи. Въ мемуар' Клеро мы находимъ следующія строки:

«Комета, которую ожидають болье года, сдълалась предметомь болье живого интереса, чьмь обыкновенно обнаруживается публикою къ астрономическимъ вопросамъ. Истинные любители науки желають возвращенія кометы, такъ какъ отъ этого послъдуеть блестящее подтвержденіе гипотезы, о которой свидьтельствують почти всъ явленія. Но многіе, напротивь, усмъхаются, видя астрономовь, погруженныхъ въ неизвъстность и безпокойство, и надъются, что комета вовсе не вернется къ Солнцу и что открытія какъ са-

мого Ньютона, такъ и его послъдователей, станутъ наравнъ съ гипотезами, взледъянными одною фантазіею.

«Я намѣреваюсь здѣсь показать, что это запозданіе не только не уничтожаеть гипотезу всемірнаго тяготѣнія, но является необходимымъ его слѣдствіемъ; мало того, запозданіе должно быть еще больше, и я вычисляю его предѣлы».

Произведя вычисленія, Клеро нашель, что комета пройдеть черезь перигелій на 618 дней позже, чёмь слёдовало ожидать: 100 дней въ опозданіи произошли отъ тягот внія къ Сатурну, а 518-къ Юпитеру; вслідствіе этого прохождение черезъ перигелій опредълялось на середину апръля 1759 года. Но Клеро, какъ человъкъ въ высшей степени осторожный и дорожившій наукой. прибавилъ, что это предсказание можетъ быть ошибочно до одного мъсяца, отъ того, что элементы еще не определены съ достаточною точностью. Во всякомъ случав, причина опозданія появленія кометы была объяснена, и оставалось только открыть комету, чтобы прямыми наблюденіями уб'єдиться въ правильности расчетовъ Клеро и, следовательно, въ достоверности закона всемірнаго тяготвнія, на которомь покоились всв эти расчеты.

Комету разыскивали во многихъ странахъ Европы, но посчастливилось открыть ее одному крестьянину по имени Паличъ, жившему въ окрестностяхъ Дрездена; это было въ рождественскую ночь 1758 г. Астрономы, узнавъ объ этомъ открытіи, стали наблюдать комету Галлея, которая прошла черезъ перигелій 19 марта 1759 года, на 32 дня раньше времени, предсказаннаго Клеро. Такое торжество науки произвело



Рис. 27. В. Я. Струве, профессоръ Юрьевскаго университета, основатель Пулковской Обсерваторіи (1793—1864).

глубокое впечатление среди общества, и вполне понятенъ восторгъ де-Лаланда, принимавшаго весьма дъятельное участие въ вычислении тяготъния кометы къ Сатурну и Юпитеру. «Въ нынъщнемъ году.—говорить де-Лаландъ, —свъть имъетъ передъ глазами весьма важное явленіе, которое когда-либо представлялось астрономамъ; будучи единственнымъ до настоящаго времени, оно разсъиваетъ наши сомнънія, а наши гипотезы дълаеть достовърными». Далъе онъ говорить: «Клеро испрашиваль мёсяць вь пользу теоріи; этоть месяць действительно оказался, и комета ноявилась въ своемъ перигеліи послів промежутка времени, который на 586 дней больше последняго прохожденія и на 32 дня меньше предсказаннаго времени; но что означають тридцать два дня сравнительно съ періодомъ въ 75 лѣтъ, двухсотую часть котораго удалось только наблюдать и притомъ довольно грубо; остальныя же 199 частей находятся внъ предъловъ видимости. Что значать тридцать два дня для тяготънія ко всёмъ остальнымъ свётиламъ Солнечной системы, не принятаго во вниманіе вычислніемъ, ко встмъ кометамъ, положение и масса которыхъ намъ неизвъстны, для сопротивленія эфирнаго вещества, наполняющаго небесныя пространства и не могущаго быть воспринятымъ, и для всъхъ величинъ, которыми неизбъжно пришлось пренебречь въ численныхъ выкладкахъ. Разница въ 586 дней между послъдовательными обращеніями этой кометы, -- разница, произведениая возмущающими силами Юпитера и Сатурна, —является наиболъе поразительнымъ доказательствомъ справедливости великаго закона тяготвнія, давая ему мвсто среди основныхъ законовъ природы, относительно которыхъ въ настоящее время можно сомнъваться такъ же мало, какъ и относительно существованія тъхъ свътиль, которыми вызывается это вліяніе».

Слъдующее затъмъ появление кометы Галлея было въ 1835 году. Періодъ ея обращенія вокругъ Солнца равнялся приблизительно 76 годамъ, и въ теченіе этого времени теоретическая астрономія сдълала столь видные усиъхи, что предсказаніе могло быть произведено съ точностью до трехъ дней, слъдовательно въ десять разъ точнъе, чъмъ при первомъ предсказаніи.

Комету увидълъ Дюмушель 5-го августа 1835 года на прекрасномъ безоблачномъ небъ въчнаго Рима.

Комета прошла черезъ перигелій 16 ноября 1835 гога,—всего на три дня позже времени, предсказаннаго Понтекуланомъ.

О появленіи кометы Галлея въ 1835 году мы имъемъ превосходную монографію В. Я. Струве (Notice sur la comète de Halley en 1835 par W. Struve, Membre de l'Académie).

«Вы меня спросите, —докладывалъ В. Струве Академіи наукъ, —какія главнѣйшія слѣдствія добыты наукой изъ этого появденія кометы Галлея. —Позвольте мнѣ, м. гг., отвѣтить вамъ откровенно, что я еще ихъ не знаю. Несомнѣнно, что опредѣленіе движенія кометы Галлея по ея орбитѣ, сравненное съ результатами вычисленій прежнихъ движеній кометы, укажеть намъ какъ на совокупность возмущеній, испытанныхъ кометою во время полнаго ея обращенія вокругь Солнца, такъ и на сопротивленіе эвира, существованіе котораго несомнѣнно доказано движеніями ко-

меты Энке. Если существуеть еще планета за предълами Урана, невидимая для жителей Земли, то наша комета можеть указать на ея существованіе по ея вліянію на движеніе кометы. И если наблюденія надъ кометою Галлея въ прежнія ея появленія были слишкомъ несовершенны, чтобы опредълить достаточно точныя точки сравненія, то при настоящемъ своемъ появленіи она была наблюдаема съ такою точностью, которая несомнѣнно принесеть наукѣ плоды при будущихъ ея появленіяхъ.

«Что касается до ея строенія, то наблюденія показали, что коса кометы образуется изъ ядра химическимъ процессомъ, подобнымъ взрывамъ, или быть можетъ электрическимъ процессомъ, подобнымъ тому, который наблюдается въ сѣверныхъ сіяніяхъ. Повидимому, нѣтъ сомнѣнія, что этотъ процессъ, вмѣстѣ съ вліяніемъ солнечныхъ лучей и въ соединеніи съ движеніями кометы по орбитѣ, вызываетъ главныя условія образованія какъ головы, такъ и косы кометы.

«Я прибавляю еще одно замъчаніе, относящееся до ядра кометы. Наблюденное 17-го сентября закрытіе звъзды было почти центральное, такъ какъ наименьшее разстояніе между ядромъ кометы и звъздою было всего двъ секунды; тъмъ не менъе все время звъзда (слабая) была видна, и ея свътъ, пройдя черезъ самыя плотныя части кометы, нисколько не уменьшился. Вмъстъ съ тъмъ видимый путь звъзды за кометою, который я вывелъ изъ 42 микрометрическихъ измъреній, произведенныхъ въ теченіе двухъ часовъ, не обнаружилъ никакого отклоненія луча зрънія, вызваннаго преломленіемъ свъта звъзды при прохожде-

ніи черезъ все тёло кометы, въ самыхъ толстыхъ его частяхъ, изъ чего слёдуеть почти несомнённо, что у кометы или вовсе нётъ твердаго ядра, или оно такъ ничтожно мало, что можеть быть никогда не будетъ измёрено. Наблюденія надъ кометами Энке и Біела; произведенныя тёмъ же рефракторомъ (Юрьевской обсерваторіи), привели къ подобному же заключенію относительно ихъ ядра».

Дал'я В. Струве прибавляеть: «Повидимому, самыя блестящія кометы суть ті, которыя возвращаются къ Солнцу черезъ огромные промежутки времени, или ті, которыя отъ времени до времени появляются совершенно неожиданно».

Въ каждой приведенной строкъ этой замъчательной монографіи Струве высказываются гипотезы, которыя впоследстви оправдались. Онъ предполагалъ, что, если за предълами Урана существуетъ еще планета, то она можеть быть открыта по тяготънію кометы Галлея къ этой неизвъстной планетъ. Планета дъйствительно была открыта въ 1846 году, но не путемъ опредъленія ея вліянія на движеніе кометы Галлея, а на движение самого Урана; слъдовательно, методъ остался тотъ же самый, только посредствующее свътило было другое. Нептунъ, - неизвъстная въ то время планета, --открыть д-ромь Галле въ Берлинъ десять лъть послъ того, какъ комета Галлея ушла за предълы видимости. Затъмъ В. Струве предполагалъ, что образование косы кометы могло происходить путемъ нъкотораго химическаго или электрическаго процесса въ соединении съ вліяніемъ солнечныхъ лучей и движенія кометы. Позднъйшими изслованіями

Бесселя, Бредихина и П. Н. Лебедева подтверждена справедливость этого предположенія. Далъе В. Струве непосредственными измъреніями показаль, что комета не можетъ предомлять свъта, идущаго отъ звъздъ къ глазу наблюдателя вследствие особенностей своего строенія; въ настоящее время мы знаемъ, что кометы состоять изъ собранія громаднаго числа твердыхъ тълецъ, независимыхъ одно отъ другого и взаимно не соприкасающихся; при подобномъ строеніи кометы лучъ свъта, проходящій черезь нее, не можеть преломляться, что и было наблюдаемо В. Струве. Наконецъ. В. Струве обращаеть внимание на яркость кометь и ставить ее въ зависимость отъ продолжительности обра-- щенія кометы вокругь Солнца. Явленіе, подм'яченное Струве, подтверждено впоследстви прямыми наблюденіями. Съ одной стороны, мы знаемъ, что блескъ періодическихъ кометь уменьшается, и у нікоторыхъ кометь, какъ напримъръ у кометы Біела, вовсе исчезъ: а съдругой стороны, мы знаемъ, что иногда кометы дробятся на части по мъръ приближенія къ Солнцу; такимъ образомъ является причина, уменьшающая ихъ блескъ, а потому очевидно, что значительный блескъ можеть быть только у кометь, которыя появляются въ первый разъ въ предълахъ Солнечной системы.

Послѣ 1835 года ближайшее появленіе кометы Галлея было въ 1910 году; она прошла черезъ перигелій 19-го апрѣля, но была открыта задолго до этого, а именно 11-го сентября 1909 г. г. Вольфомъ въ Кенигштулѣ, возлѣ Гейдельберга. Комета была открыта на фотографической пластинкѣ, а въ первый разъ могла быть наблюдаема съ помощью телескопа въ

ноябръ 1909 г. Въ общемъ появление кометы въ 1910 г. было неблагопріятно для наблюденій; комета во время своей наибольшей яркости оставалась въ солнечныхъ лучахъ.

Изученіе движенія кометы Галлея дало возможность опредёлить ея прежнія появленія; изслёдованія этого рода произведены англичанами Хайндомъ, Кромелиномъ и Коуелемъ, французами Ложье и Пингре и нёмцемъ Буркгардомъ; имъ удалось установить появленія кометы Галлея въ слёдующіе годы:

Въ	11	году	до	Ρ.	Xp.	Въ	989	году	по	Ρ.	Xp.
<b>»</b>	66	>>	по	P.	Хp.	<b>»</b>	1066	>>	<b>»</b>	>>	<b>»</b>
<b>»</b>	141	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	1145	*	<b>»</b>	<b>»</b>	>>
>>	218	>>	<b>»</b>	>>	>>	>>	1222	>>	»	<b>»</b>	>>
>>	295	>>	<b>»</b>	>>	»	<b>»</b>	1301	>>	>>	>>	<b>»</b>
>>	373	>>	<b>»</b>	>>	<b>»</b>	>>	1378	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>
<b>»</b>	451	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	1456	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	>>
≫	5 <b>3</b> 0	>>	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	1531	<b>»</b>	<b>»</b>	Ņ .	>>
>>	608	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	1607	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
>>	684	>>	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	1682	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>
<b>»</b>	760	<b>»</b>	>>	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	1759	<b>»</b>	<b>»</b>	×	>>
>>	837	>>	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	1835	>>	>>	<b>»</b>	<b>»</b>
>>	912	>>	<b>»</b>	<b>»</b>	>>	>>	1910	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>	<b>»</b>

Прежнія появленія кометы Галлея, въ особенности имѣвшія мѣсто въ началѣ нашего лѣтоисчисленія, не могуть быть разсматриваемы какъ вполнѣ достовѣрныя. Дѣло въ томъ, что по указаніямъ вычисленій въ 11 году до Р. Хр. комета Галлея должна была появиться; затѣмъ въ лѣтописяхъ находится указаніе на появленіе большой кометы, но вслѣдствіе отсут-

ствія точныхъ наблюденій нѣтъ возможности установить тождество появившейся въ древности кометы съ кометою Галлея. Тѣмъ не мевѣе съ большою вѣроятностью можно утверждать, что появившаяся комета была именно комета Галлея; едва ли случайно появилась другая большая комета въ то время, когда именно комета Галлея должна была появиться; вѣдь большія кометы появляются весьма рѣдко.

Въ послъднее появление свое комета Галлея не обладала тъмъ блескомъ, который былъ у нея при прежнихъ появленияхъ. Въ послъднее появление наибольшая яркость кометы, которая наступила 20-го мая по новому стилю, не превзошла блеска звъзды первой величины; судя же по описаниямъ прежнихъ появлений, блескъ былъ больше.

Неблагопріятное для наблюденій положеніе кометы,—она расположена противъ Солнца,—лишило многихъ, въ особенности на сѣверѣ, возможности наблюдать комету просто глазомъ, и появленіе ея осталось незамѣченнымъ для народа 1).

<sup>1)</sup> Во время печатанія настоящей книги вышла въ свѣтъ «Исторія кометы Галлея» Н. М. Субботиной; книгу эту я особенно рекомендую читателямъ. С. Г.

# 7. Пропавшія кометы.

Изъ числа періодическихъ кометъ нѣкоторыя пропали; ихъ исчезновеніе зависѣло, въ однихъ случаяхъ, отъ вида орбиты, вдоль которой происходило движеніе, въ другихъ же—отъ строенія кометы. Оба случая представляютъ высокій научный интересъ. Мы разсмотримъ здѣсь два случая: первый, относящійся къ кометѣ Лекселя, имѣлъ причиною измѣненіе вида орбиты, второй же, относящійся къ кометѣ Біела, имѣлъ причиною строеніе кометы.

## Комета Лекселя.

Комета, названная въ честь петербургскаго академика Лекселя (1740 — 1784), занимаетъ видное мъсто въ наукъ. Вопросъ о движении этой кометы явился пробнымъ камнемъ для астрономовъ и математиковъ, имъ занимались выдающіеся умы двухъ истекшихъ стольтій—Лексель, Пингре, Ламбертъ, Лапласъ, Клаузенъ, Ле-Верье и др.

Мы выписываемъ слъдующія строки изъ мемуара Ле-Верье о кометъ Лекселя:

«Въ ночь съ 14 на 15 іюня 1770 года Месье замѣтиль въ созвѣздіи Стрѣльца небольшую туманность, которую нельзя было видѣть просто глазомь: это была приближающаяся комета. Новое свѣтило 17 іюня представлялось окруженнымъ атмосферою, діаметръ которой равнялся приблизительно 5′ 23″. Въ серединѣ замѣчалось ядро: свѣть его былъ одинаковъ со свѣтомъ звѣздъ; Месье опредѣлилъ его діаметръ въ 22 секунды.

«Между тъмъ комета быстро приближалась къ Землъ; уже 21 іюня она была видима просто глазомъ, а три дня спустя она сіяла, какъ звъзда второй величины. Діаметръ туманности, бывшій въ это время въ 27′, достигъ въ ночь съ 1 на 2 іюня 2° 23′. Но въ то время, какъ видимый діаметръ туманности возрасталъ такимъ образомъ, слъдуя законамъ оптики, т. е. въ обратномъ отношеніи квадрата разстоянія свътила отъ Земли, діаметръ ядра оставался, напротивъ, неизмънющимся.

«Начиная съ 4 іюня, комета исчезла въ солнечныхъ лучахъ и временно перестала быть видимою. Основываясь на наблюденіяхъ Месье, Пингре опредълилъ элементы параболической орбиты, по которымъ можно было узнать, что комета снова будетъ видима въ августъ; и дъйствительно, 4 августа Месье могъ ее уже наблюдать. Съ этихъ поръ онъ наблюдалъ ее почти безъ перерыва до начала октября, когда комета, постоянно удаляясь отъ Солнца и Земли, стала невидимою вслъдствіе слабости своего блеска.

«До прохожденія черезъ перигелій у кометы не было зам'ятно никакой косы, но съ 20 августа до 1 сен-

тября комета обладала довольно слабою косою, длиною приблизительно въ одинъ градусъ.

«Параболические элементы, данные Пингре, согласовались съ первыми наблюденіями, но они очень расходились съ посл'єдними. Другіе элементы, вычисленные Слопомъ, де-Каденбергомъ, Ламбертомъ, Проспереномъ и Виддеромъ, не представляли большой точности. Весьма возможно, что расхожденіе наблюденій съ вычисленіями происходило отъ того, что не обращали вниманія на возможное изм'єненіе орбиты отъ тягот'єнія къ Земл'є въ іюн'є м'єсяц'є. Просперенъ, однако, просто полагалъ, что орбита кометы могла быть эллиптическая; но онъ высказалъ только свое предположеніе и не пров'єрилъ его.

«Наконецъ Лексель убѣдился, что комета движется по эллипсу, который она описываеть въ 5,585 лѣтъ (нѣсколько болѣе 5¹/2 лѣтъ), и, отбрасывая, вмѣстѣ съ Діонисомъ дю-Сежуромъ, предположеніе о томъ, что возмущающее дѣйствіе Земли могло сильно измѣнить эту орбиту, онъ доказалъ, 1) что эллиптическая орбита съ періодомъ обращенія въ пять съ половиною лѣтъ удовлетворяла всѣмъ наблюденіямъ кометы; 2) что нельзя было допустить обращенія меньше 5¹/2 лѣтъ; съ другой стороны, нельзя было допустить, чтобы періодъ обращенія былъ больше 5¹/2 лѣтъ, напримѣръ, шесть лѣтъ, не вводя значительнаго разногласія между теоріей и наблюденіями.

«Но, говорить Месье, если продолжительность обращенія этой кометы есть только пять съ половиною літь, то почему же ее наблюдали только одинъ разъ?» Это было довольно сильнымъ возраженіемъ противъ изслідованій Лекселя.

Лексель отвъчаль на это: «Такъ какъ разстояніе афелія кометы отъ Солнца почти равно разстоянію Юпитера отъ этого свътила, то отсюда возникаетъ предположение, что движение этой кометы было когда-то измѣнено вліяніемъ Юпитера, такъ что она могла описывать орбиту совствить иную, чтить теперь. Посредствомъ вычисленія можно найти, что комета была въ соединении съ Юпитеромъ (т. е. находилась въ наименьшемъ отъ него разстоянии) 27 мая 1767 года, и что ихъ взаимное разстояние было меньше 1/580 разстоянія кометы отъ Солнца; откуда, принимая во вниманіе массы Солнца и Юпитера, -- можно заключить, что вліяніе Юпитера было довольно сильное для того, чтобы измѣнить замѣтнымъ образомъ движеніе кометы. Лексель указываль еще, что вторичное сближеніе кометы съ Юпитеромъ могло быть 23 августа 1779 года, и что это обстоятельство можеть помъщать появленію кометы въ своемъ перигеліи въ 1781 году, что имъло бы мъсто безъ возмущающаго вліянія Юпитера. И дъйствительно, астрономы тщетно ожидали возвращенія этой кометы въ 1781 и 1782 годахъ».

Приведя эти соображенія Ле-Верье и Лекселя, мы замѣтимь, что комету Лекселя болѣе не видѣли не только въ прошломъ, но и въ нынѣшнемъ столѣтіи. Судьба ея представляетъ высокій интересъ для астрономовъ, и многіе изъ нихъ снова принялись за рѣшеніе вопроса.

Оставимъ на время вопросъ о движеніи кометы Лекселя и разсмотримъ, какое можеть быть вообще вліяніе планеть на движеніе кометь.

Мы знаемъ, что если одно свътило движется вокругь другого подъ дъйствіемъ взаимнаго тяготьнія, то оно описываетъ кругъ, или эллинсъ, или параболу, или же гиперболу, при чемъ самое движение совершается по законамъ Кеплера. Но какъ скоро является, кром' этихъ двухъ св тиль, третье, къ которому они тяготъють, и которое само къ нимъ тяготъеть, то каждое изъ свътилъ будетъ болъе или менъе уклоняться отъ эллипса 1). Уклоненія эти называются возмущеніями движенія, а самое движеніе-возмущеннымъ. Опредъление возмущений-одинъ изъ самыхъ важныхъ, но, вмъстъ съ тъмъ, и самыхъ трудныхъ вопросовъ астрономіи и математики. Необходимо замътить, что этотъ вопросъ въ общемъ видъ не имъетъ ръшенія; въ нъкоторыхъ же частныхъ случаяхъ имъетъ приближенное ръшение.

Задача эта извъстна подъ именемъ задачи о трехъ тълахъ. Вначалъ она примънялась къ Лунъ, которая тяготъеть къ Землъ и Солнцу, и подвержена, вслъдствіе этого, сложному движенію, такъ что задача о движеніи Луны была въ то же время и задачей о трехъ тълахъ. Но въ настоящее время вопросъ обобщенъ, и подъ именемъ этой задачи понимается вопросъ о движеніи какого бы то ни было числа тълъ, движущихся подъ дъйствіемъ взанмнаго тяготънія.

Мы зам'втили сейчась, что задача о трехъ тълахъ не им'ветъ р'вшенія въ общемъ случать, а лишь въ частныхъ случаяхъ. Общимъ случаемъ называется тотъ,

<sup>1)</sup> Для простоты, разсмотримъ только движение по эллипсу.

въ которомъ массы трехъ тёлъ могутъ быть какія угодно, такъ же точно, какъ и ихъ взаимныя разстоянія, и въ этомъ видъ мы не знаемъ, какого рода будетъ движеніе. Но, если, напримірь, среди трехь тіль одно обладаеть несравненно большею массою, чтмъ два другія, то вопрось можеть быть рішень, если не строго, то по приближенію. Подобный случай имъетъ мъсто въ нашей Солнечной системъ, гдъ массы планетъ сравнительно съ массою Солнца представляу ются величинами очень малыми, такъ что отъ взаимодъйствія двухъ планеть и Солнца движеніе каждой планеты лишь весьма мало отличается отъ того, которое было бы, если бы существовала только одна планета и Солппе, т. е. отъ движенія по законамъ Кеплера. Для всёхъ планеть нашей Солнечной системы мы имѣемъ одну преобладающую силу въ Солнцѣ, а передъ нею силы остальныхъ планеть суть величины весьма малыя. Вследствіе такого порядка вещей, уклоненія планеть отъ движенія по законамъ Кеплера весьма ничтожны и могуть быть легко вычисляемы.

Но съ кометами могутъ быть и другіе случаи. Какъ извъстно, кометы не расположены въ пространствъ такъ систематично, какъ большія планеты, орбиты которыхъ взаимно не пересъкаются: кометы движутся по вытянутымъ эллипсамъ, вслъдствіе чего онъ могутъ подойти весьма близко къ какой нибудь планетъ и сильно тяготъть къ ней. Хотя масса планеты, даже самой большой—Юпитера, весьма мала сравнительно съ солнечною массою, но сила притяженія, оказываемаго Юпитеромъ на приблизившуюся комету, можетъ быть такого же порядка и даже больше, чъмъ сила

солнечнаго притяженія. Не слѣдуеть забывать, что сила тяготѣнія прямо пропорціональна массѣ и обратно пропорціональна квадрату разстоянія, т. е. чѣмъ меньше разстояніе, тѣмъ больше сила, и притомъ, силы увеличиваются, какъ уменьшаются квадраты разстояній. Очевидно, что при нѣкоторомъ разстояніи отъ планеты сила можетъ быть очень велика, и гораздо больше силы тяготѣнія къ Солнцу.

Комета можеть попасть въ такія условія, что какая нибудь планета будеть притягивать ее болье, чымь Солнце; тогда произойдеть измыненіе въ движеніи кометы; это измыненіе можеть быть весьма значительное, такь что элементы движенія одной и той же кометы при двухь ея послыдовательныхь появленіяхь могуть быть неузнаваемы. Мало того, можеть имыть мысто и такой случай, что орбита кометы, будучи вначалы параболическою, превращается въ элиштическую или обратно, періодическая комета, приблизившись къ одной изъ планеть, сильно уклонится оть первоначальнаго движенія и превратится въ параболическую, т. е. уйдеть оть насъ навсегда въ безконечныя звыздныя пространства.

Нѣчто подобное, по всей вѣроятности, случилось и съ кометою Лекселя. Подойдя довольно близко къ Юпитеру, она попала въ сферу его вліянія и превратилась въ періодическую комету, т. е. стала двигаться по эллипсу; когда же затѣмъ, обойдя вокругъ Солнца, комета снова приблизилась къ Юпитеру, онъ опять ее сильно притянулъ къ себѣ, уклонилъ ее отъ эллиптическаго движенія, и орбита снова превратилась въ параболическую.

Чтобы уб'вдиться, д'вйствительно ли случилось н'вчто подобное съ разсматриваемою кометою, знаменитый астрономъ Лексель взялся за численное опредъление ея возмущений. Вотъ что онъ самъ говорить по поводу этихъ вычислений:

«Начиная съ 28 мая 1779 года, комета съ быстротою стремится къ Юпитеру по орбитѣ, уже возмущенной. Эта орбита была гипербола,—орбита съ безконечными вътвями,—такъ что невозможно, чтобы комета превратилась въ спутника Юпитера, какъ нѣкоторые предполагали».

Относительно того мивнія, будто комета упала на Юпитеръ, Ле-Верье замвчаеть, что это возможно, но мало ввроятно. Двигансь по безконечной ввтви гиперболы, комета, конечно, никогда къ намъ болве не вернется: это пропавшая, исчезнувшая комета».

### Комета Вісла.

Это самая занимательная изъ всёхъ періодическихъ кометь; она была открыта любителемъ астрономіи австрійскимъ маіоромъ В. Біела въ Іозефштадтѣ (Богемія) 27 февраля 1826 г.; комета была телескопическая. Черезъ десять дней, независимо отъ Біелы, комета открыта французскимъ астрономомъ Гамбаромъ (Gambart) въ Марсели. Оба астронома опредёлили орбиту кометы и замѣтили, что она имѣетъ сходство съ орбитами кометъ 1806 I и 1772 г. Объ этихъ двухъ кометахъ намъ извѣстно слѣдующее.

Комета 1772 г. была открыта Монтаньемъ 8 марта и наблюдаема только четыре раза Месье, а комета

1806 I, открытая Понсомъ въ январѣ, была наблюдаема до 6 декабря. Хотя наблюденія того времени не отличались большою точностью, въ особенности наблюденія надъ кометою 1772 г., тѣмъ не менѣе сходство элементовъ трехъ орбитъ настолько велико, что можно съувѣренностью сказать, что всѣ три появленія принадлежать одной и той же кометѣ. Мы приводимъ вычисленныя значенія элементовъ орбитъ:

Кометы.	1772	1806 I	1826 I
Прохождение черезъ перигелій.	18 фев.	1 янв.	18 марта
Долгота восходящаго узла	257°.2	250°.5	247°.9
Долгота перигелія	$108^{\circ}.6$	109°.4	104°.3
Наклонность	17°.0	· 16°.5	14°.7
Разстояніе перигелія	0.99	0.91	0.96

Между двумя первыми появленіями комета совершила 3 оборота вокругъ Солнца, а между двумя послъдними—5 оборотовъ. Величина оборота опредълилась слъдующимъ образомъ:

между 1772 и 1806 одинъ оборотъ = 6 л. 273 дня

\* 1806 и 1826 » = 6 л. 269 »

или въ среднемъ 6<sup>3</sup>/4 лътъ. На основании этихъ вычисленій и принимая въ расчетъ тяготъніе кометы къ Юпитеру, баронъ Дамуазо предсказалъ ближайщее прохожденіе кометы черезъ перигелій на 27 ноября 1832 г. Комета, дъйствительно, появилась и была наблюдаема многими астрономами; она прошла черезъ перигелій днемъ раньше противъ вычисленнаго времени, совершивъ полное обращеніе вокругъ Солнца въ 6 лътъ и 255 дней,—на 14 дней меньше, чъмъ въ предыдущіе обороты. Уменьшеніе періода произошло отъ тяготънія къ Юпитеру. Своимъ внѣшнимъ видомъ

комста Бісла ничего особеннаго не представляла: обыкновенная телескопическая комета съ небольшою косою.

Появленіе кометы въ 1839 году не могло быть наблюдаемо вслъдствіе видимой близости ея къ Солнцу. Появленіе 1846 г. было весьма благопріятное для наблюденія съ съвернаго полушарія. Первое наблюде-




Рис. 28. Двойная комета Біела.

ніе было произведено въ РимЪ, а черезъ два дня въ Берлинъ. Вліяніе чистоты и прозрачности южнаго неба сказалось здѣсь самымъ очевиднымъ образомъ: несмотря на хорошіе телескопы Берлинской обсерваторіи, несмотря на стараніе нѣмецкихъ астрономовъ открыть комету, въ Берлинъ ее наблюдали всетаки позже. чъмъ въ Римъ. Въ первые дни послъ открытія кометы Біела она ничего особеннаго не представляла, но черезъ мъсяцъ она оказалась двойною:

рядомъ съ основною кометою двигалась слабая спутница. Явленіе было необычайное по своей новизнѣ; 14 лѣтъ спустя французскій астрономъ Ліз въ Ріо де Жанейро открылъ и наблюдалъ двойную комету (1860 I); въ послѣдніе годы XIX столѣтія наблюдали еще нѣсколько случаевъ дробленія кометъ, но въ 1846 году явленіе было совершенно новое. Затѣмъ комета Ліз была открыта двойною, а комета Біела была наблю-

даема при пъсколькихъ появленіяхъ какъ одинокое свътило. Безъ сомнънія, дробленіе кометы на двъ части произошло между 1832 и 1846 годами. Явленіе поразило астрономовъ, и съ ихъ стороны было приложено все стараніе для тщательнаго и всесторонняго наблюденія кометъ-близнецовъ. Оба ядра, соединенныя слабою свътовою полоскою, имъли по небольшой косъ; послъднія казались параллельными одна другой и были направлены въ сторону противоположную Солнцу.

По наблюденнымъ положеніямъ кометь были опредёлены ихъ орбиты, были также вычислены возмущенія въ движеніи кометь отъ тяготёнія ихъ къ большимъ планетамъ и предвычислено положеніе кометь для слёдующаго появленія въ 1852 году. Об'є кометы д'єйствительно появились и были тщательно наблюдаемы. Кометы прошли черезъ перигелій 24 сентября, совершивъ свое обращеніе въ меньшій срокъ, чѣмъ въ прежнее время. Д'єйствительные періоды обращенія равнялись:

ВЪ	1772	по	1805	r.	6	Л.	<b>27</b> 3	дн
>>	1805	>>	1826	<b>»</b>	6	<b>»</b>	269	>>
>>	1826	>>	1832	>>	6	>>	255	>>
> -	1832	<b>»</b>	1846	>>	6	>>	220	*
>>	1846	>>	1852	>>	6	>>	226	

Разстояніе между близнецами было значительно больше, чёмъ въ 1846 году, но оно обнаруживало неріодическое изм'вненіе: наибольшимъ въ обоихъ появленіяхъ оно было во время прохожденія черезъ перигелій

Изученіе пальнѣйшаго движенія кометь и предвычисленія ихъ положенія въ следующія появленія въ 1859 и 1866 годахъ представляло чрезвычайныя затрудненія; главное изъ нихъ заключалось въ невозможности установить тождества между кометами. Видимый блескъ ихъ не могъ служить основаниемъ для этой цъли, потому что онъ періодически измънялся. Вмѣстѣ съ тѣмъ возникало множество вопросовъ, а между тъмъ отвътъ на нихъ можно было получить только посл'в носкольких обращений кометь-близпеповъ. Имбють ли кометы какое-нибуль вліяніе одна на другую, не обращаются ли онв вокругь общаго центра тяжести, описывающаго первоначальную орбиту кометы Біела, и еще много другихъ вопросовъ. Естественно, поэтому, съ какимъ нетерпъніемъ ожидалось слъдующее появление кометь въ 1859 году; но въ этомъ году видимое ихъ положение относительно Солнца было весьма невыгодно, такъ что ихъ нельзя было наблюдать: онт были днемъ на небт, пришлось ждать слтдующаго появленія въ 1866 году. Точное предсказаніе появленія кометы за два періода вообще д'вло довольно трудное, а въ данномъ случат вычисленія усложнялись еще тъмъ, что не удалось отождествить близнецовь кометы Біела при ихъ двухъ прежнихъ появленіяхъ. Пришлось вести всё расчеты для двухъ предположеній о соотв'єтствій близнецовь при первомь и второмъ появленіяхъ. За всёмъ тёмъ пришлось принять во внимание тяготение кометь къ большимъ планетамъ. Подобная работа требуетъ много труда и усердія; за нее взялся профессоръ б. Деритскаго (Юрьевскаго) университета знаменитый Клаузенъ. Опредъ-

ливъ въроятнъйшіе элементы орбить объихъ кометь изъ всёхъ наблюденій, Клаузенъ вычислиль на каждый день видимыя положенія кометы при ея появленін въ 1866 году, или, какъ говорятъ астрономы, далъ эфемериду кометь Біела; по ней астрономы разыскивали кометы, но тщетно: онъ не были видимы; онъ пропали, и никто не могъ сказать, что съ ними сталось и куда онъ дъвались. Высказывали предположение, что въ вычисленіе Клаузена вкралась ошибка, и эфемерида была невърна; вслъдствие этого разыскивали кометы не на томъ мъстъ, гдъ онъ въ дъйствительности находились. Клачзенъ пересмотрълъ свои вычисленія, но ошибки не оказалось; всв вычисленія върны, и всв обстоятельства приняты во вниманіе. Причина исчезновенія не могла быть выяснена. Произошло ли оно отъ взаимнаго дыйствія обыкть кометь или оть случайных причинь, ниввшихъ вліяніе на движеніе кометь, -- это оставалось въ то время тайной. Волей-неволей пришлось ждать появленія кометь въ 1872 году. Снова была вычислена эфемерида объихъ кометь; снова астрономы вооружились всъми оптическими средствами, бывшими въ ихъ распоряжении въ то время, чтобы разыскать скрывшуюся двойную комету; но она не была разыскана. Вмъсто ожидаемыхъ кометъ Віела, астрономы наблюдали весьма ръдкое явленіе-необычайное количество падающихъ звъздъ; это было 27 ноября по новому стилю. Спрашивается, однако, имфеть ли это явленіе связь съ кометою Біела? не является ли оно совершенно самостоятельнымъ?

Прежде всего замѣтимъ, что орбита кометы Біела пересъкаеть земную орбиту въ той точкъ, гдъ Земля

ежетодно бываеть 27 ноября по новому стилю. Если, поэтому, при нѣкоторомъ обращени кометы вокругъ Солнца, она придеть въ описанную точку пересѣченія 27 ноября, то тамъ будеть и Земля, и тогда произойдеть встрѣча двухъ свѣтилъ. Не только самое столкновеніе, но одна мысль о возможности столкновенія наводила страхъ на людей. Я считаю своимъ долгомъ разсѣять этотъ страхъ и, забѣжавъ впередъ, сообщить читателю, что подобное столкновеніе было именно въ 1872 году; оно новторилось въ 1885 году; но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ никакой катастрофы не произошло, и потому можно безъ страха спокойно обсуждать явленіе звѣзднаго дождя 27 ноября 1872 года.

Вычисленія, произведенныя Клаузеномъ и пѣкоторыми другими астрономами, выяснили большую вѣроятность встрѣчи кометы Віелы съ Землею 27 ноября 1872 года. Въ моментъ встрѣчи комета должна лежать въ созвѣздіи Андромеды въ точкѣ, опредѣляемой слѣдующимъ прямымъ восхожденіемъ (а) и склоненіемъ (б):

 $\alpha = 23^{\circ}.3$   $\delta = +43^{\circ}.3$ .

Итакъ, съ одной стороны, встръча ожидалась именно 27 ноября, съ другой же—какъ разъ въ этотъ день произошель звъздный ливень. Подобное совпаденіе, конечно, можетъ быть случайнымъ, но наблюденіе 27 ноября 1872 г., произведенное астрономами, не покинувшими своего поста, вполнъ разсъяло сомнъніе въ случайности совпаденія двухъ астрономическихъ явленій.

Кометы, какъ мы ниже увидимъ 1), имъютъ свое-

<sup>1)</sup> См. главу о строенін кометъ.

образное строеніе; он'й не состоять ии изъ силошного твердаго, ни жидкаго, ни газообразнаго вещества; он'й состоять изъ собранія большого числа твердыхъ тілець, незначительныхъ вообще по объему и масс'й; эти крошечныя тіла не соприкасаются между собою, а находятся на нікоторомъ разстояніи другь отъ друга. Подобныхъ тілець, называемыхъ также космическою пылью, великое множество въ небесномъ пространств'я; вс'й они движутся вокругъ Солнца, какъ независимыя світила, повинуясь міровымъ законамъ тяготінія Ньютона. Кометы, слідовательно, представляють обособленныя собранія множества небольшихъ тілецъ.

Каждая космическая частица можетъ встретиться съ Землею; при этомъ она влетаетъ въ земную атмосферу съ большою скоростью, доходящею до 72 килом. въ одну секунду; сопротивление воздуха, встречаемое частицею, такъ велико, что въ короткій промежутокъ времени, не превосходящій доли секунды, она накаливается и ярко свътится; мы видимъ тогда падающую звъзду. При встръчь съ кометою, состоящею изъ множества частицъ, мы видимъ большое число падающихъ звёздъ. Какъ разъ 27-го ноября 1872 г. вмъсто кометы мы наблюдали звъздный дождь. Зная изъ только что изложеннаго, что при встрече сь кометою мы должны видъть звъздный дождь, мы безъ особыхъ колебаній утверждаемъ, что наблюденный 27-го ноября 1872 г. звъздный дождь имъетъ тъсную связь съ кометою Біела. Предположеніе это вполнъ подтвердилось прямыми астрономическими наблюденіями.

Многіе астрономы, наблюдавшіе зв'єздный дождь 27-го ноября 1872 г., нанесли на зв'єздную карту видимые пути, описанные падающими зв'єздами. Оказалось, что вс'є падающія зв'єзды этого вечера, за малыми исключеніями, двигались по линіямъ, исходящимъ изъ одной и той же точки. Читатель знаетъ, что эта точка называется радіантомъ даннаго метеорнаго потока. Когда было опред'єлено положеніе радіанта потока падающихъ зв'єздъ 27-го ноября 1872 г., то оказалось, что оно совпадаетъ съ приведенною выше точкою, въ которой находилась бы комета Біела въ моментъ встр'єчи съ Землею, а именно:

ноложеніе радіанта 
$$\alpha = 23^{\circ}.3$$
  $\delta = +43^{\circ}.3$  » кометы  $\alpha = 23^{\circ}.3$   $\delta = +43^{\circ}.3$ 

Мы встретились съ падающими звездами, движущимися по тому же самому пути, по которому двиталась бы комета, если бы она существовала какъ обособленное светило. Очевидно, изъ кометы образовался потокъ падающихъ звездъ. Такимъ образомъ связъмежду звезднымъ дождемъ 27 ноября 1872 г. п кометою Біела является вполив достоверною. Судьба этой пропавшей кометы выяснилась; мы знаемъ, что никогда боле не увидимъ ея; мы будемъ только отъ времени до времени встречаться съ метеорнымъ потокомъ падающихъ звездъ, образовавшимся изъ кометы Біела.

Выше мы видѣли, что періодъ обращенія кометы Біела вокругъ Солнца постепенно уменьшается, приближаясь къ 6<sup>1</sup>/2 годамъ. Два полныхъ оборота мало отличаются отъ 13 лѣтъ. Черезъ 13 лѣтъ послѣ 1872 г., именно 27 ноября 1885 г. Земля опять должна встрѣ-

титься съ «Біелидами», составлявшими прежде комету Біела. И дъйствительно, мы встрътились съ ними и наблюдали блестящее явленіе: звъзды падали въ несмътномъ количествъ. Въ Петербургъ вечеръ былъ ясный, небо безлунное, и явленіе было величественное. Въ пятичасовой промежутокъ было сосчитано 40,844 падающихъ звъздъ. Радіантъ Біелидъ 1885 г. былъ тотъ же самый, что и 1872 г., именно:

Въ 1872 г. 
$$\alpha = 23^{\circ}.3$$
  $\delta = +43^{\circ}.3$   
Въ 1885 г.  $\alpha = 23^{\circ}.5$   $\delta = +43^{\circ}.3$ 

Очевидно, въ оба года мы встретились съ теми же Біелидами.

Слъдующая встръча Земли съ Біелидами могла состояться въ 1898 году, но въ этомъ году не было такого же изобилія падающихъ звъздъ, какъ въ 1872 и 1885 г. Причина отсутствія большого числа Біелидъ заключается въ томъ, что два періода ихъ обращенія вокругъ Солнца нъсколько больше 13 лътъ; вслъдствіе этого, когда въ 1898 году Земля 27 ноября прошла точку взаимнаго пересъченія орбитъ, въ ней еще не было Біелидъ, а когда онъ пришли въ нее, Земли уже тамъ не было: встръчи съ наиболъе плотною частью потока не произошло.

Ближайшее сближеніе Земли съ Біелидами ожидается 27 ноября 1911 или 1912 года, но встръчи не будеть, и мы не увидимъ такихъ красивыхъ звъздныхъ дождей, какъ въ 1872 и 1885 годахъ.

Нѣкоторыя другія свѣдѣнія о кометѣ Біела наложены мною въ книгѣ «Друзьямъ и Любителямъ Астрономін», и я не считаю возможнымъ повторять здѣсь о нихъ.

# 8. Періодическія кометы, появлявшіяся только одинъ разъ.

Прочитавъ предыдущую главу, читатель могъ замътить, что нъкоторыя кометы, какъ, напр., комета Біела, съ теченіемъ времени уменьшались въ блескъ и затъмъ исчезали; то же самое можетъ произойти и со всъми періодическими кометами; очевидно, слъдовательно, настанеть время, когда всё нынё извёстныя періодическія кометы исчезнуть и не будуть видны даже въ самые сильные телескопы; тогда одно изъ ихъ появленій будеть «посл'єднимь», и затымь комета болъе не будетъ видна. Такъ какъ кометъ въ небъ великое множество, или, какъ говоритъ Кеплеръ, «сколько рыбъ въ океанъ», то можно допустить, что нъкоторыя періодическія кометы могли быть открыты какъ разъ во время своего последняго появленія; предыдущія же ихъ появленія не были наблюдаемы, съ одной стороны, вслъдствие слабости ихъ свъта, съ другой жевслъдствие того, что въ прежнее время не было организовано правильное разыскание кометь.

Причина исчезновенія кометы можеть быть, конечно, и другая. Наприм'єрь, комета, двигавшаяся по эллипсу и им'євшая небольшой періодь, могла быть выхвачена изъ пред'єловь Солнечной системы тягот'єніемъ къ одной изъ большихь планеть; въ этомъ случать эллиптическая орбита кометы могла вполн'є изм'єниться и принять иной видь—стать параболой или гиперболой, и тогда комета должна уйти въ безпредъльныя пространства вселенной; подобная комета болъе не вернется къ Солнцу.

Списокъ однажды появлявшихся періодическихъ кометъ ежегодно печатается во французскомъ астрономическомъ календаръ «Connaissance des Temps» и постоянно дополняется новыми открытіями.

Опредъление большихъ періодовъ обращенія кометь вокругь Солнца не можеть быть произведено съ большою точностью. Для предёла въ данномъ случав можно принять 100 леть, полагая, что періоды менес 100 леть могуть быть разсматриваемы, какъ точно опредъленные. Вотъ причина, почему изъ всъхъ кометь списка «Connaissance des Temps» мы выписали въ следующую таблицу только те кометы, которыя имьють періодь обращенія менье 100 льть; въ ней находятся также и такія кометы, вторичное появленіе которыхъ, со времени ихъ открытія, еще не происходило. Напримъръ, комета, открытая Копфомъ въ 1906 г. (№ 10 по списку), имъетъ періодъ въ 6,7 лътъ; ея вторичное появление можеть произойти только въ 1912 году, а потому въ настоящее время еще нельзя сказать, появится ли она, или нътъ; если она при благопріятных условіях не будеть видна, то придется присоединить ее къ затерявшимся кометамъ. Къ последнимъ можно причислить кометы 1894 I, 1881 V, 1889 VI, 1846 VI и другія; онѣ очевидно, затерялись, и мало надежды вновь увидеть ихъ. Темъ не менее, не зная причины ихъ исчезновенія, астрономы должны следить во время ожидаемаго ихъ возвращенія къ Солнцу за тою частью неба, гдъ онъ должны появиться. Въэтомъ дѣлѣ любители астрономін могли бы оказать свое содѣйствіе, особенно, если они имѣютъ возможность примѣнять фотографію въ дѣлѣ разысканія кометь.

Списокъ періодическихъ кометь, появлявшихся только одинъ разъ.

Æ	Коме	Ta.	Кто открыль комету.	Періодъ обраще- ніявъго- дахъ.	Годъ ожи- даемаго по- явленія.
1	1819	IV	Бланпенъ	4.8*	1912
2	1766		Хелфенцридеръ	5.0*	1910
3	1884		Бернердъ.	5.4	1911
4	1886	IV	Бруксъ.	5.6	1914
5	1783		Пиготъ.	5.9*	1913
6	1890	VЦ	Шпиталеръ.	6.4	1916
7	1892	V	Бернердъ.	6.5	1911
- 8	1896	<b>v</b> .	джакобини.	6.6	1916
9	1858	III	Тетль.	6.6	1910
10	1906	IV	Копфъ.	6.7	1912+
11	1900	Ш	Джакобини.	6.8	1913
12	1905	II	Борелли.	7.0	1912+
13	1895	II	Свифтъ.	7.2	1910
14	1894	I	Деннингъ.	7.4	1916
15	1906	VI	Меткальфъ.	7.6	1914 +
16	1881	V	Деннингъ.	8.7	1915
17	1889	VI	Свифтъ.	8.9	1916
18	1846	VI	Петерсъ.	13.4	1913
19	1866	I	<b>Т</b> емп <b>е</b> ль.	33.2	1932
20	1867	I	Коджіа.	40.1	1947
21	1852	IV	Вестфаль.	60.7	1913+
22	1846	IV	Де Вико.	75.7	1921 +
23	1847	V	Брорзенъ.	80.8	1927 +

Періоды, обозначенные звъздочками \*, опредълены съ малою точностью. Годы ближайшаго появленія кометы, обозначенные крестикомъ +, относятся къ кометамъ, еще не возвращавшимся къ Солнцу послъ ихъ открытія; эти кометы еще нельзя считать затерявшимися.

Мнѣ приходилось нѣсколько разъ обращать вниманіе читателя на трудность точнаго опредѣленія періода обращенія кометы вокругъ Солнца; самыя незначительныя ошибки наблюденія могутъ сильно вліять на величину опредѣляемаго періода. Съ увеличеніемъ оптической силы телескоповъ и съ усовершенствованіемъ способовъ наблюденія, получаемые выводы становятся точнѣе. Насколько въ послѣднее время увеличилась точность наблюденій, можно судить по слѣдующимъ даннымъ:


Кометы.	Точность опредѣленія оборота. $^{\circ}/_{\circ}$	Кометы.	Точность опедёленія оборота.	
1846 IV	4.0)	1881 V	1.1	
1846 VI	$11.2 \left[ \begin{array}{c} 0/0 \\ 0 \end{array} \right]$	1884 II	0.2 0/0	
1847 V	$6.2  \big)^{5.8}$	1886 JV	$4.1 \ 3.1$	
1852 IV	1.6	1889 VI	10.0	
1858 III	1.2)	18 <b>9</b> 0 VII	0.2	
1866 I	$4.5 \ \ 3.6$	1892 V	4.6	
1867 I	5.0	1894 I	0.1	
		1895 II	0.1 $1.3$	
		1896 VII	0.3	

Какъвидно за 60 лътъ ошибки съ 5.8°/о—уменьшились до 1.3°/о. Если, напримъръ, періодъ опредълился


въ 20 лътъ, то ожидаемая ошибка не превосходить 0.26 или четверти года.


Приведенный выше списокъ періодическихъ кометъ, появлявшихся только одинъ разъ, даетъ богатый матеріалъ молодымъ астрономамъ, обладающимъ хорошимъ зрѣніемъ и хорошими оптическими инструментами: ежегодно ожидается вторичное появленіе одной или нѣсколькихъ періодическихъ кометъ. При правильной организаціи разысканія кометъ можно надѣяться, что большая часть кометъ приведеннаго списка будетъ разыскана. Какъ примѣръ я приведу комету Перрине (1896 VII); она была вторично открыта въ 1909 году (см. главу о періодическихъ кометахъ, стр. 57), и съ тѣхъ поръ ея періодичность вполнѣ установлена.





І. Семья Юпите





І. Семья Юпитеровыхъ кометь.



# 9. Группировка періодических в кометь около больших в планеть. В роятное существованіе занептунной планеты.

Таблицы періодическихъ кометь, приведенныя въ главахъ 5 и 8, указывають на замѣчательныя особенности по отношенію къ продолжительности періодовъ обращенія кометь вокругъ Солнца. Большая часть кометъ имѣетъ періодъ менѣе 7 лѣтъ; затѣмъ сразу замѣчается скачокъ на 13 лѣтъ; отъ этого періода на 30—40 лѣтъ и наконецъ на 70 лѣтъ и болѣе. Нѣтъ непрерывнаго измѣненія періодовъ. Нельзя допустить, чтобы подобные скачки являлись дѣломъ простого случая; очевидно, какая-то особая причина вызвала замѣченное явленіе; разсмотримъ ее подробнѣе.

Если на листѣ бумаги нарисовать орбиты большихъ планетъ, помъстивъ Солнце въ общемъ фокусъ, и затъмъ въ томъ же масштабъ нарисовать орбиты періодическихъ кометъ, то окажется, что всъ кометы съ небольшимъ періодомъ обращенія располагаются около орбитъ большихъ планетъ—Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, при чемъ нъкоторыя изъ орбитъ не с. п. глазенанъ.

доходять до большихъ планетъ, а другія немного переходять за нихъ.

Законъ распредёленія кометь въ предёлахъ Солнечной системы очевидень. Всё кометы образують четыре ясно выраженныя группы или семьи, называемыя по тёмъ большимъ планетамъ, до орбитъ которыхъ доходятъ кометы. Въ каждой семьё насчитывается слёдующее число кометь:

въ семьъ Юпитера . . . . 25 кометъ.

- » » Сатурна . . . . 2
- » » Урана . . . . 2 »
- » » Нептуна . . . 6 »

Періодическія кометы Юпитеровой семьи описаны въглавѣ 5-й; сатурнова же семья состоить изъ двухъкометь:

- 1. Тетля, періодъ ея обращенія. . . . . . 13,67 л.
- 2. К. Петерса, періодъ ея обращенія . . . 13,38 л.

Первая комета была наблюдаема нѣсколько разъ: въ 1858, 1885 и 1899 гг., а вторая только однажды; она открыта Петерсомъ (С. Н. F. Peters) 26 іюня 1846 г. въ Неаполѣ и была наблюдаема имъ до 21 іюля; кромѣ его наблюденій извѣстно только одно, произведенное 2 іюля въ Римѣ. Хотя періодъ обращенія кометы оказался сравнительно небольшимъ, но ея болѣе никогда не видѣли; всѣ ея послѣдующія появленія прошли незамѣченными. Въ настоящее время нѣтъ болѣе надежды на появленіе кометы Петерса: она должна бытъ причислена къ пропавшимъ. Всего вѣроятнѣе, что вещество, составлявшее комету Петерса, распредѣли-




Рис. 29. Семьи кометь, принадлежащія Сатурну, Урану й Нептуну.

лось вдоль орбиты, образовавъ метеорный потокъ. Къ сожалѣнію, мы никогда не увидимъ падающихъ звѣздъ, составляющихъ этотъ потокъ, потому что послѣдній не пересѣкаетъ орбиту Земли, и мы не можемъ встрѣтиться съ его падающими звѣздами. Хотя мы не видимъ потока, образовавшагося изъ кометы Петерса, но онъ существуетъ, и всѣ твердыя частицы, составляющія его, движутся вдоль орбиты кометы. Поэтому семья Сатурновыхъ кометъ состоитъ изъ кометъ Тетля и одного потока, образовавшагося изъ кометъ Петерса. Кромѣтого возможно, что вмѣстѣ съ потокомъ кометы Петерса существуетъ еще нѣсколько или много другихъ метеорныхъ потоковъ, ограниченныхъ орбитою Сатурна, но мы ихъ не видимъ, и о нихъ ничего не знаемъ.

Уранова семья состоить изъ двухъ кометь: 1866 I и 1867 I.

Комета 1866 I открыта 19 декабря 1865 года Темплемъ въ Марсели и была наблюдаема до 9 февраля 1866 года; она прошла черезъ перигелій 11 января 1866 г. и вслъдствіе этого причислена къ 1866 году, ане 1865 г. Орбита, вычисленная изъ всѣхъ наблюденій, оказалась эллипсомъ съ періодомъ обращенія кометы вокругъ Солнца въ 33,2 года. Какъ только орбита кометы Темпля была вычислена, итальянскій астрономъ Скіапарелли указалъ на ея тождество съ орбитою ноябрьскаго потока падающихъ звѣздъ, извѣстнаго подъ именемъ Леонидъ (13-го ноября по новому стилю). Ближайшее появленіе кометы Темпля должно было произойти въ 1899 г., но комета не могла быть разыскана, несмотря на всѣ старанія астрономовъ. Слѣ-

дующее затъмъ появление кометы ожидается 1932 году, но мало надежды увидъть ее и въ этомъ году, такъ какъ по всей въроятности она, какъ и комета Петерса, уже разложилась въ метеорный потокъ. Падающія звізды этого потока движутся вмізсть съ Леонидами, образовавшимися въ свою очередь изъ кометы, которую мы никогда не видъли; она двигалась рядомъ съ кометою Темпля, но разложилась вь метеорный потокъ раньше кометы Темиля. Комета Темпля и Леониды составляли, въроятно, когда-то одно свътило: оно совершило много оборотовъ вокругъ Солнца, и затъмъ, подобно кометъ Біела, раздълилось на двъ части. Объ части, какъ самостоятельныя кометы, двигаясь рядомъ, могли соверщить несколько обращеній вокругъ Солнца, но одна изъ нихъ разложилась въ метеорный потокъ Леонидъ до 1865 года, а другая продолжала двигаться, какъ обособленное свътило, вокругъ Солнца, и въ концъ 1865 г. была открыта Темплемъ; но послъ этого года и она, въ свою очередь, разложилась въ метеорный потокъ; такимъ образомъ кометъ этого потока болъе не существуеть; на ихъ мъстъ движутся рои падающихъ звъздъ, съ которыми мы встръчаемся каждые 33 года, но надающія звізды распреділены также вдоль всей орбиты прежнихъ кометъ, и ежегодно 13-го ноября по новому стилю мы встречаемся съ ними.

Нептунова семья состоить изъ шести кометь:

			Періодъ въ годахъ.	Годъ ближайшаго появленія.
1) Вестфаля	1852	IV	60.7	1912
2) Понса-Брукса	1884	Ι	71.6	1956

			ріодъ годахъ.	Годъ, ближайшаго появленія.
3) Ольберса	1887	$\mathbf{V}$	72.6	1959
4) де-Вико	1846	IV	75.7	1922
5) Галлея	1835		76.0	1910
6) Брорзена	1847	V	80.8	1928

Изъ этой группы комета Галлея является наиболъе замъчательною; мы знаемъ ея исторію (стр. 108).

Комета 1852 IV открыта Вестфалемъ въ Гётингенъ 24-го іюля. Вначалъ она была слабая, но въ октябръ была видна нъкоторое время просто глазомъ; послъднее наблюденіе произведено 11-го января 1853 года въ Боннъ Шенфельдомъ. Лучшая орбита получена самимъ Вестфалемъ; вычисленный имъ періодъ въ 60,7 лътъ принимается за наиболъе въроятный. Ближайшее появленіе кометы Вестфаля ожидается въ 1912 году.

Кометы Понса-Брукса и Ольберса уже описаны нами въ главъ 5.

Четвертая комета 1846 года была открыта 20 февраля де-Вико въ Римѣ; независимо отъ него комета открыта Бондомъ въ американскомъ Кембриджѣ и была наблюдаема до 19 мая. Изъ всѣхъ наблюденій можно было опредѣлить эллиптическую орбиту съ періодомъ обращенія въ 75,7 лѣтъ. Ближайшее ея появленіе ожидается въ 1922 году.

Комета 1847 V открыта 20 іюня Брорзеномъ въ Альтонъ. Комета была слабая телескопическая съ неясно выраженнымъ ядромъ; несмотря на слабый блескъ кометы, она могла быть наблюдаема до 12 сентября. Наиболъе въроятный періодъ вычисленъ вънскимъ астрономомъ Шоблохомъ; онъ равенъ 80,8 лътъ.

Группировка періодическихъ кометъ около большихъ планетъ даетъ намъ основаніе предполагать, что эллиптическія орбиты кометъ и слѣдовательно періодичность кометъ произошли подъ вліяніемъ тяготѣнія къ большимъ планетамъ. Комета, двигаясь по параболѣ, можетъ, при вступленіи въ предѣлы Солнечной системы, оказаться вблизи одной изъ большихъ планетъ и быть ею завлеченною или захваченною въ плѣнъ: тогда комета значительно измѣняетъ видъ своей орбиты и изъ параболической становится періодическою; новый эллипсъ доходитъ до орбиты притягивающей планеты, и комета становится членомъ семьи данной планеты. Разсмотримъвопросъ, которая изъ планетъ имѣетъ больше возможности завлечь кометы въ свой плѣнъ.

Предположимь, что комета, вступивъ въ Солнечную систему, приблизилась кънъкоторой планетъ настолько, что тяготъніе къ ней равно тяготънію къ Солнцу; въ этомъ случать комета претерпить значительныя уклоненія отъ своего пути и ея орбита можетъ превратиться въ эллиптическую или гиперболическую, если она сначала двигалась по параболъ. Въ первомъ случать она попадаетъ въ плънъ къ данной планетъ и входитъ въ составъ ея группы, а во-второмъ она выкидывается изъ предъловъ Солнечной системы навсегда. При всъхъ равныхъ условіяхъ планеты, обладающія наибольшими массами и наиболте отдаленныя отъ Солнца, имъютъ возможность завлечь большее число кометъ. Юпитеръ, какъ имъющій наибольшую массу, имъетъ самую богатую группу періодическихъ кометъ.

Завлеченныя кометы, какъ періодическія, являются временными свътилами Солнечной системы; при ка-

ждомъ своемъ обращени вокругъ Солнца разстояніе между частицами, составляющими ядро кометы, непрерывно увеличивается, и въ концѣ концовъ комета разлагается въ метеорный потокъ; послѣдній, встрѣчаясь съ планетами и съ Землею, отдаетъ имъ множество своихъ частицъ, и такимъ образомъ ростъ планетъ происходитъ непрерывно, вѣчно. Твореніе міровъ не закончено и никогда не будетъ закончено. Роль кометъ въ мірозданіи великая: онѣ приносять изъ небеснаго пространства большія массы веществъ и оставляють его въ Солнечной системѣ; еще большее число частицъ (метеоровъ, падающихъ звѣздъ) упадаетъ на Солнце, поддерживая въ немъ неизсякаемый источникъ свѣта и тепла.

Въ предыдущихъ строкахъ мы изучили группировку кометъ около большихъ планетъ Солнечной системы и подмѣтили любопытное явленіе: всѣ періодическія кометы распредѣлены не случайно въ предѣлахъ Солнечной системы, а образуютъ группы или семьи около большихъпланетъ. Подобную группировку можно объяснитъ тѣмъ, что кометы, подъ вліяніемъ тяготѣнія къ большимъ планетамъ, измѣняютъ свою орбиту на эллиптическую такихъ размѣровъ, что отдаленнѣйшая точка ея доходитъ только до орбиты тѣхъ большихъ планетъ, которыя измѣнили ихъ движеніе. Большія планеты какъ бы выхватываютъ кометы изъ небеснаго пространства и завлекають въ плѣнъ, обращая ихъ въ періодическія своей группы.

Только подобнымъ плѣненіемъ планетами и можно объяснить разсмотрѣнную нами группировку кометъ въ предѣлахъ Солнечной системы.

Если мы затъмъ перейдемъ предълы Солнечной системы и разсмотримъ кометы, слъдующія за Нептуновой группой, то также замътимъ ясно выраженную ихъ группировку.

Выпишемъ кометы, имѣющія періоды болѣе 100 лѣть, и слѣдующія непосредственно за кометою Брорзена, вошедшею въ Нептунову группу.

Комет	а. Кто открылъ.	Разстоя- ніе пери- гелія отъ Солица.	Эксцен. триситетъ	Время обращенія.	Наибольшее удаленіе отъ Солнца.
1862 II	I Тетль	0.96	0.960	119.6	47.6 \ 48.7
1889 III	I Бернерд <sub>'</sub> ь	1.10	0.957	128.3	49.8 ) 40.4
1857 IV	К. Петерсъ	0.75	0.980	234.7	75.4 - 75.4
1885 II	Г Бруксъ	0.75	0.982	274.5	83.7)
1905 II	I Джіакобин	ır 1.11	0.975	297.1	87.9 86.9
1874 IV	И Коджіа	1.69	0.963	306.1	89.1

Наибольшее удаление кометь отъ Солнца выражено въ среднемъ разстоянии Земли отъ Солнца, принимаемомъ за единицу. Напомнимъ, что Нептунъ удаленъ отъ Солнца на 30 подобныхъ единицъ.

Первыя двѣ кометы образують рѣзко выраженную группу: ея кометы удаляются до 49 единицъ; то же самое можно сказать и о трехъ послѣднихъ кометахъ: онѣ образують особую группу, доходящую до 87 единицъ. Третья же комета стоить совершенно особенно, не входя ни въ ту, ни въ другую группу.

Признаемъ фактъ плѣненія кометъ большими планетами. Если мы замѣтимъ, что за предѣлами Солнечной системы существуютъ группы кометъ, подобныя тѣмъ, которыя наблюдаются въ ея предѣлахъ около

большихъ планетъ, то мы можемъ предположить, что за предълами Нептуна существують еще планеты, которыя не были наблюдаемы изъ-за слабости блеска. Нептунъ представляется намъ телескопическимъ свътиломъ; тъмъ болъе должны быть телескопическими планеты, лежащія значительно дальше Нептуна. Отрицать существование занептунныхъ планеть нъть никакихь основаній; в вроятность же ихъ существованія весьма большая. Американецъ профессоръ Э. Пикерингъ производитъ тщательное разысканіе занептунныхъ планетъ фотографическимъ путемъ, но до настоящаго времени ему не удалось открыть ихъ. Будемъ, однако, надъяться, что терпъніе и трудъ астрономовъ въ скоромъ времени увънчаются успъхомъ.

# 10. Большія кометы прежнихъ временъ.

## Комета 1556 года.

Изъ древнихъ кометъ достойна вниманія большая комета 1556 года. По изслѣдованію извѣстнаго кометографа, Пингре, она имѣетъ большое сходство съ кометою 1264 года, появившеюся въ іюлѣ мѣсяцѣ. Ее увидѣли въ первый разъ во Франціи послѣ заката Солнца. Комета, какъ описываетъ ее Пингре, — «была большою и знаменитою». Не слѣдуетъ забывать, что то время (XIII стол.) было эпохою предразсудковъ, и во вліяніе кометь на земную жизнь вѣрилъ и старъ, и младъ. Понятно, что неожиданное появленіе большой яркой кометы произвело ужасное впечатлѣніе. Оно еще болѣе усилилось, когда комета исчезла «въ день смерти папы Урбана IV». Современники и очевидцы говорили, что «комета явилась только для того, чтобы предвозвѣстить эту смерть».

Комета сильно напугала и императора Карла V: онъ не сомнъвался въ скорой своей смерти и, какъ говорятъ, воскликнулъ:

His ergo indiciis me mea fata vocant,

— что было переложено французами въ стихи, а также переведено Пингре слъдующимъ образомъ:

Въ этомъ яркомъ знакъ вижу свою близкую кончину.

«Какъ бы то ни было, но—продолжаеть Пингре этотъ паническій страхъ сильно подъйствовалъ, судя по историкамъ того времени, на Карла V, вслъдствіе чего онъ ръшился, спустя нъсколько мъсяцевъ, уступить императорскую корону своему брату, Фердинанду; испанскую же корону онъ уступилъ своему сыну, Филиппу. Если приведенный разсказъ въренъ, то событіе это можно поставить на ряду съ великими, вызванными малыми причинами».

Мы воздержимся отъ какой бы то ни было критической оцѣнки справедливости передачи этого событія историками того времени; замѣтимъ только, что нѣкоторые ученые сомнѣваются въ ея достовѣрности и доказываютъ, что Карлъ V уже въ 1555 году рѣшилъ отрѣшиться отъ престола.

Комета эта названа «кометою Карла V-го».

Помимо историческаго интереса, эта комета въ высшей степени замъчательна и въ астрономическомъ отношеніи. Такъ какъ періодъ обращенія могъ быть опредъленъ только приблизительно, то уже въ 1844 г. Энке ожидалъ ея появленія. Онъ даже думалъ, что элементы третьей кометы этого года имъютъ аналогію съ элементами кометы Карла пятаго. Мы приводимъ ихъ рядомъ:

Комета		•						1556 г. (Карла	V)	1844	г.
Долгота	пе	ри	гел	ія				274°		$296^{\circ}$	
Долгота	В	cx(	одя	ща	го	уз.	та	175		118	

Наклонность	$30^{\circ}$	$46^{\rm o}$
Разстояніе перигелія .	0,505	$0,\!252$
Направленіе движенія.	прямое	прямое.

Нѣкоторое сходство можно замѣтить, но утверждать, что это одна и та же комета-нельзя. Но можно ли ожидать полнаго сходства элементовъ? Вспомнимъ, что въ своемъ афеліи комета удаляется отъ Солнца на разстояніе въ 871/2 разъ большее, чёмъ разстояніе Земли отъ Солнца. Тамъ, вдали отъ центра притяженія, при медленномъ движеніи кометы, достаточно малъйшей причины, чтобы измънить направление движенія, вследствіе чего изменится и фигура, и размъры орбиты; поэтому, можно не удивляться, если при двухъ появленіяхъ кометы мы встрічаемъ столь значительныя разногласія въ элементахъ. Если бы причины, измѣнившія направленіе, а можетъ быти скорость движенія, были намъ извъстны, такъ что мы могли бы выразить ихъ количественно, то сравненіе элементовъ дало бы намъ неопровержимое доказательство тождественности или нетождественности коь меть; но такъ какъ эти причины намъ неизвъстны, да едва ли будуть когда-либо извъстны-онъ лежать за предълами возможности нашихъ знаній, -то мы не въ состояни сказать, представляють ли кометы 1556 и 1844 годовъ два появленія одной и той же кометы, или нътъ.

Многіе знаменитые астрономы занимались изслъдованіями объ этой замъчательной кометь; много было приложено труда для того, чтобы убъдиться, принадлежить ли она къ числу періодическихъ. Джонъ

Гершель, въ своихъ «Очеркахъ астрономіи», говоритъ слъдующее по этому поводу: «Между кометами 1264 и 1556 гг. замъчается большая аналогія. Въроятность ея еще болье увеличивается тымь, что блестящая комета съ косою въ 40 градусовъ, видимая днемъ, появилась въ 975 году, и что въ китайскихъ летописяхъ занесены появленія большихъ кометъ въ 395 и 104 годахъ. Если допустить, что эти кометы представляють различныя появленія одной и той же кометы, то средній періодъ обращенія ея будеть въ 292 года. Но отъ вліянія планетныхъ возмущеній могуть произойти большія уклоненія оть средняго періода, и хотя въ то время, когда мы пишемъ эти строки (въ 1858 г.), появление этой кометы еще не было наблюдаемо, но могутъ пройти еще два или три года, послъ чего уже въ глазахъ самыхъ компетентныхъ судей появление ея будеть безнадежно».

Другой ученый изъ Миддельбурга (Зеландія), Бомъ, взялся за этотъ вопросъ, имѣя въ виду рѣшить его вполнѣ, пользуясь всѣми данными современной науки. Шагъ за шагомъ слѣдилъ онъ путемъ вычисленій за движеніемъ кометы внѣ предѣловъ ея видимости, принимая во вниманіе притягательное дѣйствіе большихъ планетъ. Въ результатѣ его работы оказалось, что появленіе кометы можно ожидать въ 1858 году съ точностью до двухъ лѣтъ; слѣдовательно, она можетъ появиться двумя годами раньше или двумя годами послѣ 1858 г.,—въ промежуткѣ 1856—1860 г. Работа Бома была совершенно такая же, какую выполнили Клэро, де-Лаландъ и г-жа Лепотъ для кометы Галлея, но результатъ былъ иной. Прошелъ

1856, 57 и слѣдующіе годы, а комета не была видна. Если причина невидимости заключалась просто въневыгодномъ положеніи ея относительно Солнца, то ближайшее появленіе кометы можно ожидать только въ XXII столѣтіи. Лишь тогда удастся съ достовѣрностью узнать о періодѣ обращенія кометы и утвердить ея принадлежность къ нашей Солнечной системѣ.

Комета Карла V еще тъмъ интересна въ историческомъ отношени, что съ нею желали связать кончину міра. Передъ появленіемъ ея въ 1857 году, паническій страхъ, вызванный безразсудными предсказаніями какихъ-то нъмцевъ-спекулянтовъ, объялъ всю Европу въ ожиданіи кончины міра. Земля, говорилось въ предсказаніи,—должна была встрътить комету Карла V-го 13 іюня, которая и пожретъ огнемъ все земное. Такимъ образомъ, будто бы, произойдетъ кончина міра.

## Комета 1680 года.

Изъ числа большихъ кометъ особеннаго вниманія заслуживаетъ комета 1680 г., появившаяся во времена Ньютона. Читатель знаетъ (стр. 33), что на ней именно Ньютонъ доказалъ справедливость всемірнаго закона тяготънія и для кометъ. Комета была яркая, блестящая, съ большою косою въ 80 градусовъ; ни одна комета не представляетъ такое богатство литературы, какъ комета 1680 года; правда, большая часть печатныхъ трудовъ о ней ничего научнаго не содержитъ, но одно то, что литература о ней такъ богата, свидътельствуетъ о сильномъ впечатлъніи, вызванномъ ея появленіемъ. Коса въ 80 градусовъ—

въдь это безъ малаго половина дуги большого круга надъ видимымъ горизонтомъ. Можно себъ представить, какъ была красива комета!

Къмъ была открыта комета—трудно сказать; въроятно многіе увидъли ее въ то время, когда она уже достигла значительной яркости. Первое научное наблюденіе произведено нъмецкимъ астрономомъ Готфридомъ Кирхомъ на разсвътъ съ 13 на 14 ноября 1680 года, а потому ея открытіе ему и приписывается. Англійскій астрономъ Галлей опредълилъ эксцентриситеть орбиты и періодъ обращенія кометы вокругъ Солнца; для періода онъ получилъ значеніе въ 575 л.

Англійскій философъ и богословъ Вистонъ, принявъ это значеніе періода за точное, построилъ цѣлый рядъ сказочныхъ предположеній о вліяніи кометы на Землю. Вначалѣ его гипотеза была вполнѣ абстрактна и не относилась ни къ какой кометѣ. Но когда Галлей опредѣлилъ орбиту кометы 1680 года и нашелъ, что она періодическая, совершая свое обращеніе около Солнца въ 575 лѣтъ, тогда Вистонъ, вычисляя прежнія появленія кометы, увидѣлъ, что въ древности она проходила черезъ перигелій въ 2349 и 2926 г. до нашей эры, т.-е. во время всемірнаго потопа 1). Этого было достаточно для богослова-астронома: онъ ухватился за свою теорію, приписалъ кометѣ 1680 года не только причину всемірнаго потопа, но и причину будущей кончины міра.

По мивнію Вистона, Земля—это древняя комета, нивная свой перигелій весьма близко отъ Солнца.

<sup>1)</sup> Годъ всемірнаго потопа точно неизвъстенъ.

Этимъ обстоятельствомъ объясняется тотъ жаръ, который получала Земля при каждомъ своемъ обращеніи вокругъ Солнца,—жаръ, сохранившійся еще и въ настоящее время внутри Земли. Когда же, по прошествіи извъстнаго времени, центробъжная сила (?) уменьшилась, вслъдствіе чего орбита приблизилась къ кругу, Земля стала получать солнечную теплоту равномърнымъ образомъ. Благодаря этому, прежняя атмосфера древней кометы очистилась, возстановилось мало-по-малу равновъсіе между воздухомъ и водою, показались Солнце и Луна и, наконецъ, животныя, а за ними и человъкъ.

Къ этому описанію мірозданія англійскаго богослова какой-то каноникъ Св. Женевьевы въ Парижѣ прибавилъ слѣдующія строки: «Когда произошло грѣхопаденіе человѣка, маленькая комета прошла очень близко отъ Земли и, пересѣкая наклонно плоскость ея орбиты, придала планетѣ вращательное движеніе. Безъ сомнѣнія, та же комета придала земной орбитѣ почти совершенно круговую форму, которая, какъ говоритъ Вистонъ, была еще до потопа». Далѣе онъ прибавляетъ: «Богъ предвидѣлъ, что человѣкъ согрѣшитъ и что за его ужасные грѣхи онъ будетъ жестоко наказанъ; поэтому, во время сотворенія міра, Онъ сотворилъ и комету, которая послужитъ Ему орудіемъ наказанія. Это—комета 1680 года».

Приведемъ далъе описание всемирнаго потопа по Вистону:

Въ пятницу 28 ноября 2349 г., или же 2 декабря 2926 г.—это все равно, такъ какъ время потопа неизвъстно,—комета находилась у своего узла, т.-е. пе-

ресвила земную орбиту; въ томъ же узлв находилась и Земля. Соединеніе (не столкновеніе <sup>1</sup>) произошло въ тотъ моментъ, когда считали полдень въ Пекинв, гдв, какъ слвдуетъ полагать, жилъ Ной до потопа. Какое же было двйствіе этого соединенія кометы, которой Вистонъ приписываетъ массу, равную четверти массы Земли?—Произошелъ громадный приливъ, ужасивйшее наводненіе. Горныя цвии Арменіи и сосвднія вершины, находившіяся всего ближе къ кометв, треснули отъ давленія прилива подземной раскаленной массы и раскрылись. И такимъ образомъ произошло страшное опустошеніе; земная поверхность покрылась водою: насталъ всемірный потопъ.

Но здѣсь не прекратилось опустошеніе. Атмосфера и хвость кометы задѣли за Землю и наполнили ея атмосферу водою и землею, ниспадавшими въ теченіе сорока дней, и такъ «разверзлись всѣ выси небесныя». Глубина воды во время потопа была, по Вистону, въ шесть англійскихъ миль (5 версть), изъкоторыхъ около одной мили произошло отъ изверженія внутреннихъ жидкихъ массъ Земли, почти четыре мили отъ атмосферы кометы, и лишь ничтожная часть отъ хвоста кометы.

Вотъ картина объясненія всемірнаго потопа по Вистону. Посмотримъ теперь, какимъ образомъ, по его мнѣнію, та же комета сожжетъ Землю при второй съ нею встрѣчѣ.—Вистонъ вовсе не затрудняется дать и этому объясненіе. Второе прохожденіе кометы вблизи Земли, говоритъ Вистонъ, но съ западной стороны,

<sup>1)</sup> Комета прошла весьма близко отъ Земли.

замедлить движение Земли, вслъдствие чего ея орбита превратится въ вытянутый эллипсъ; и тогда Земля будеть очень приближаться къ Солнцу, которое и спалить все на ней: сама Земля воспламенится.

Вотъ «научныя бредни» Вистона,—человъка несомнънно большой эрудиціи; какъ и многіе изъ его современниковъ, онъ впаль въ ошибку, желая согласовать науку съ преданіемъ.

Нѣкоторые изъ современниковъ Вистона, авторы статей о кометѣ 1680 г., полагали, что она появилась во время взятіи Трои, когда плеяда Электра, не имѣя силъ перенести разрушеніе Трои (1194 до Р. Хр.), покинула своихъ сестеръ и скрылась у сѣвернаго полюса Земли; съ тѣхъ поръ въ плеядахъ только шесть звѣздъ, по числу оставшихся сестеръ. Другіе писатели полагали, что комета появилась въ 43 г. до Р. Хр., чтобы предсказать смерть Цезаря Августа», и третьи, наконецъ, думали, что та же комета появилась въ 619 г. до Р. Хр.—въ годъ, совпадающій съ разрушеніемъ Ниневіи.

Всѣ эти попытки согласовать событія земной жизни съ небесными явленіями являются дѣтски-наивными, если вспомнить, что періодъ обращенія въ 575 лѣть совершенно не можеть быть опредѣлень съ достаточною точностью для того, чтобы можно было предсказать будущее или вычислить время ея прошлаго появленія; я не говорю уже о допущеніи зависимости между разрушеніемъ Трои, смертью Августа и появленіемъ кометь; подобное допущеніе лежить въ основѣ астрологіи, а не астрономіи, и не имѣеть никакой обоснованной научной почвы.

Въ 19-мъ столътіи, когда были выработаны правила для ръшенія уравненій по способу наименьшихъ квадратовъ, основанному на теоріи въроятностей, были вновь вычислены элементы орбиты кометы 1680 года. Наиболъе обстоятельныя изслъдованія въ этомъ отношении произведены берлинскимъ астрономомъ Энке, опредълившимъ періодъ обращенія въ 8814 юліанскихъ лътъ, при чемъ въроятныя ошибки элементовъ указывають на предълы возможныхъ періодовъ; они оказываются настолько широкими,именно отъ 6179 до 14031 года, - что предсказывать будущее появление кометы или разыскивать ее въ прошломъ представляется совершенно празднымъ занятіемъ. Послѣ этихъ изслѣдованій становится очевидною наивность Вистоновскихъ гипотезъ о прошломъ и будущемъ Земли. Вся его сказочная теорія рушится отъ того только, что но существу дела періодъ кометы 1680 г. не можеть быть опредълень.

Если остановиться на періодѣ обращенія кометы вокругъ Солнца, опредѣленномъ Энке, именно 8814 лѣтъ, то въ своемъ афеліи комета въ 850 разъ дальше отъ Солнца, чѣмъ Земля.

«На этомъ громадномъ разстояніи, говорить Гумбольдть, комета 1680 года, которая въ ближайшемъ разстояніи отъ Солнца пробъгаеть 893 километра въ секунду, т. е. имъеть скорость въ тридцать разъ большую, чъмъ Земля,—движется лишь со скоростью едва трехъ метровъ въ секунду; эта скорость приблизительно въ три раза больше скорости теченія нашихъ европейскихъ ръкъ, и въ два раза меньше найденной мною скорости теченія Кассиквіаре, притока Ориноко».

При такой малой скорости достаточно малѣйшей причины,—напримѣръ, встрѣчи или сближенія съ метеорнымъ облакомъ или съ другою кометою,—чтобы измѣнилась орбита кометы кореннымъ образомъ, и комета можетъ вернуться къ Солнцу не черезъ 8814 лѣтъ, а раньше или позже.

Въ заключение обращу внимание на то, что вся теорія Вистона основана на неизбѣжности гибельныхъ катастрофъ при встрѣчѣ Земли съ кометою или ея косою. Вопросу этому посвящена особая глава, и, прочитавъ ее, читатель убѣдится, что и въ этомъ отношеніи Вистонъ, по невѣдѣнію, сталъ на ложный путь. Столкновеніе кометы съ Землею или погруженіе ея въ хвостъ кометы никакихъ катастрофъ произвести не можеть. Слѣдовательно, и съ этой точки зрѣнія рушится вся его теорія.

### Комета Шезо 1744 года.

«Въ началѣ сего года явившаяся комета, которая своимъ видомъ и величиною отъ многихъ другихъ отличалась, и чрезъ то зрѣніе всѣхъ людей къ себѣ обратила, почитается и у Астрономовъ за достойную примѣчанія и прилежнаго разсужденія».—Такъ начинается «Описаніе кометы, которая видима была 1744 года» въ книгѣ Гейнсіуса, переведенной на русскій языкъ М. Ломоносовымъ ¹). Комета эта дѣйствительно достойна вниманія.

<sup>1) «</sup>Описаніе въ началѣ 1744 года явившіяся кометы купно съ нѣкоторыми учиненными объ ней разсужденіями черезъ Готфрида Гейнсіуса, Императорской Академіи Наукъ Члена

Комета открыта, повидимому, Клинкенбергомъ въ Гаардем 9-го декабря 1743 года, но особенно старательно была наблюдаема Гейнсіусомъ въ Петербургъ, Шезо-въ Лозанив и Хіортеромъ-въ Швеціи. Комета названа именемъ Шезо, во-первыхъ, потому, что первенство въ ея открытіи Клинкенбергомъ не удостовърено, а первенство Шезо-несомнънно; во-вторыхъ, потому, что первыя точныя наблюденія сдібланы Шезо, издавшимъ о ней прекрасную монографію 1). Орбита кометы была опредвлена дввнадцатью астрономами; по одному этому можно судить, какое оживленіе внесла комета въ сравнительно спокойную жизнь астрономовъ. Всв вычисленныя орбиты представляли прекрасное между собою согласіе, что указывало на хорошую точность наблюденій. Орбита ничего особеннаго не представляла, развъ что большое приближение къ Солнцу—въ 5 разъ болве, чвмъ Земля. Въ Россіи Эйлеръ вычислиль нъсколько разъ орбиту кометы Шезо, пользуясь каждый разъ различными наблюденіями. Зато блескъ кометы и ея коса представляли нъчто изъ ряда выходящее.

Комета Шезо самая яркая 18-го столътія; нъкоторое время она была видна днемъ, при полномъ солнечномъ сіяніи. Кромъ того, комета отличалась роскошною сложною косою.

и профессора Астрономіи». Съ нѣмецкаго азыка перевель Императорской Академіи Наукъ Адъюнктъ Михайло Ломоносовь. С.-Петербургъ, 1744 г. стр. 23.

<sup>1)</sup> De-Cheseaux, I. P. L. Traité de la Comète qui a paru en Déc. 1744 etc. Lausanne et Genève. 1744. 8.




Рис. 30. Комета Щезо 1744 г.

Шезо наблюдаль, между прочимь, косу кометы въ то время, какъ голова кометы уже закатилась за горизонть: это было съ 7-го на 8-е и съ 8-го на 9-е марта 1744 года. Мы приводимъ здъсь рисунокъ, сдъланный самимъ Шезо. А. Виннеке сравнилъ наблюденія, произведенныя Шезо, съ наблюденіями де-Лиля въ Петербургъ и нашелъ между ними весьма удовлетворительное согласіе.

Въ эти ночи коса кометы состояла изъ шести свътовыхъ пучковъ или струй. Каждый пучокъ состоялъ, въроятно, изъ особаго вещества. Мы говоримъ «въроятно», потому что въ то время спектральный анализъ еще не былъ извъстенъ и, слъдовательно, не было возможности опредълить ихъ составъ.

Эксцентриситеть орбиты кометы Шезо такъ близокъ къ единицъ, что орбита принимается за параболическую. Съ 1744 года комета удаляется отъ Солнца и долго будетъ удаляться; а когда она вернется къ Солнцу неизвъстно; пройдутъ въка и тысячелътія прежде, чъмъ жители Земли ее увидятъ.



II. Большая комета Донати 1858 г. –

# 11. Большія кометы новъйщаго времени.

Девятнадцатое стольтіе богато большими кометами: за стольть ихъ появилось не менье 25, видимыхъ просто глазомъ; изъ нихъ самыя блестящія были кометы 1807, 1811 и 1858 годовъ; онь описаны нами въ книгь «Друзьямъ и Любителямъ Астрономіи», а потому мы здысь не останавливаемся на ихъ описаніи; мы обратимъ только вниманіе на двойную косукометы Донати 1858 г. Изъ остальныхъ достойны вниманія кометы 1843 І, 1860 ІІІ, 1861 ІІ, 1880 І, 1881 ІІІ, 1882 ІІ, 1887 І, 1888 І и 1893 ІІ. Самая блестящая изъ этихъ кометь была несомныно комета 1882 ІІ, такъ что въ 19-мъ стольтій было четыре выдающихся по блеску кометы: 1807, 1811, 1858 и 1882 г.

#### Вольшая комета 1843 I.

Эта блестящая комета была сразу открыта многими лицами 27 и 28 февраля въ Южной Америкъ днемъ при полномъ солнечномъ сіяніи. Первое о ней извъстіе далъ кап. Рейсъ съ острова Благовъщенія. Если бы она была на ночномъ небъ, то представляла бы чудное явленіе и, въроятно, превосходила бы

своимъ блескомъ всѣ кометы 19-го столѣтія. Въ зиму 1843 года въ Европѣ была безпрерывно пасмурная погода; вслѣдствіе этого комету могли увидѣть и наблюдать только въ серединѣ марта, когда блескъ кометы уже значительно уменьшился; комету наблюдали по вечерамъ въ юго-западной части неба.

Комета быстро приближалась къ Солнцу и почти коснулась его поверхности: разстояніе между ядромъ кометы и поверхностью Солнца не превосходило 767 т. килом.; между поверхностями обоихъ свътилъ разстояніе было еще меньше. Комета погрузилась въ солнечную корону.

Когда элементы кометы были вычислены, то оказалось, что они сходны съ элементами кометы 1668, но вывести изъихъ сходства величину періода обращенія не удалось. Позднѣе, въ 1880 году, еще разъ всномнили объ этой кометѣ, когда ея элементы оказались такими же, какъ и у кометы 1880 І. Въ этомъ году также не удалось опредѣлить періода обращенія, но Хоекъ открылъ такъ называемыя группы или семьи кометъ, о чемъ подробно изложено въ слѣдующей (12) главѣ.

Комета имѣла косу въ 40° длиною; къ сожалѣнію, изъ-за пасмурной погоды на сѣверѣ не могли любоваться этой чудной кометой.

## Вольшая комета Донати 1858 г.

Подробныя свёдёнія объ этой кометь читатель найдеть, какъ замічено въ началів настоящей главы, въ моей книгів, «Друзьямь и Любителямь Астрономіи» (стр. 326); мы здівсь разсмотримь только ея косы.




Рис. 31. Комета Донати 1858 г.

Комета Донати еще у многихъ на памяти—она долго красовалась на сѣверномъ небѣ; ею можно было любоваться съ конца августа до начала декабря. Наибольшаго блеска она достигла въ октябрѣ. Въ это время у нея были двѣ косы: одна прямолинейная, а другая—изогнутая, въ видѣ турецкой сабли. Вторая коса опоясывала полъ-неба и представляла рѣдкое, дивное зрѣлище.

Косы кометы Донати были изслѣдованы Ө. Бредихинымъ; по виду ихъ, онъ опредѣлилъ ту отталкивательную силу, которая производитъ кометныя косы, и пришелъ къ заключенію, что прямолинейная коса производится отталкивательною силою, которая въ 12—17 разъ больше, чѣмъ отталкивательная сила, образовавшая изогнутую косу, отстающую немного отъ первой. Подобной дивной, роскошной косы, какъ у кометы Донати, не удалось болѣе наблюдать. Вначалѣ прямолинейная коса І типа была длиннѣе изогнутой косы ІІ типа, а затѣмъ коса ІІ типа стала длиннѣе и роскошнѣе. Обѣ косы изображены на прилагаемомъ рисункѣ; на верху начальный видъ кометы, внизу—во время наибольшаго расцвѣта въ началѣ октября.

Комета Донати движется по весьма вытянутому эллипсу и совершаеть полное обращение вокругь Солнца въ 1950 лѣтъ; періодъ этотъ опредѣленъ съ вѣроятною опибкою въ 6 лѣтъ. Ближайшее появление кометы можно ожидать въ началѣ 39-го столѣтія.

## Комета 1860 III.

Третья комета 1860 года была открыта 18 іюня одновременно нѣсколькими наблюдателями въ Европѣ и Америкѣ. Въ день открытія у нея была коса въ 20°, но затѣмъ она быстро уменьшилась вмѣстѣ съ уменьшеніемъ блеска кометы. Комета была видна до конца іюля. Орбита ея ничего особеннаго не представляла.




Рис. 32. Коса большой кометы 1861 II.

### Вольшая комета 1861 II.

Большая комета 1861 II была одновременно открыта въ началѣ іюня астрономами: на мысѣ Доброй Надежды, въ Сантъ-Яго (Чили) и въ Олиндѣ возлѣ Ріо-де-Жанейро. Комета двигалась на сѣверъ по орбитѣ, лежащей въ плоскости, почти перпендику-

лярной къ эклиптикъ. Черезъ эклиптику комета прошла, находясь какъ разъ между Солнцемъ и Землею, и когда она вышла изъ солнечныхъ лучей, то представилась жителямъ съвера въ наибольшемъ своемъ блескъ. Коса кометы имъла длину въ 40°, а въ Абинахъ, на чудномъ южномъ небъ, она разстилалась по дугъ въ 120°! Коса была сложная въ видъ распахнутаго въера (рис. 32); она состояла изъ нъсколькихъ свътовыхъ полосъ. Земля погрузилась въ косу этой кометы; никакими инструментами, ни химическимъ анализомъ не могли удостовърить присутствіе постороннихъ газовъ въ земной атмосферъ. Вотъ одно изъ блестящихъ доказательствъ тому, что погружение Земли въ косу кометы является для обитателей Земли совершенно безвреднымъ. Когда въ газетахъ возбуждается страхъ передъ ожидаемымъ столкновеніемъ съ кометою или погруженіемъ въ ея косу, слідуеть всегда вспоминать о кометь 1861 года: мы погрузились въ ея косу, но не знали объ этомъ.

Блестящая комета 1861 года могла быть наблюдаема почти въ теченіе цѣлаго года: послѣднее наблюденіе надъ нею произведено О. Струве въ Пулковѣ 1 мая 1862 года.

#### Вольшія кометы 1880 І и 1882 II.

Большая комета 1880 I была наблюдаема только въ южномъ полушаріи; ее открыль 4 февраля Гульдъ въ Кордобъ (въ Аргентинской республикъ); ея длинная коса была видна нъсколькими днями раньше.

Что касается кометы 1882 II, то она одновременно открыта во многихъ мъстахъ южнаго полушарія въ первыхъ числахъ сентября. Обѣ кометы движутся по одной и той же орбитъ, слъдуя одна за другою; ихъ орбиты имъютъ большое сходство съ орбитами кометь 1668 и 1843 I (стр. 169). Всѣ четыре кометы очень яркія и имъютъ внѣшнее сходство; сходны также и обстоятельства ихъ появленія: всѣ онѣ появились неожиданно и были открыты одновременно




Рис. 33. Прохождение кометы 1882 II черевъ дискъ Солица.

во многихъ мѣстахъ южнаго полушарія тогда, когда уже обладали значительнымъ блескомъ; всѣ онѣ были видны днемъ вблизи самаго Солнца. Въ сѣверномъ полушаріи можно было наблюдать комету 1882; въ Петербургѣ она была видна по утрамъ; комета имѣла величественную косу, уступавшую только кометѣ 1811 года; она представляла оригинальное явленіе: коса расширялась и оканчивалась вилкой, какъ хвость ласточки; при этомъ блескъ ея быль однообразный и вдругъ прекращался въ концѣ косы. Астрономы Капской обсерваторіи Финлей и Элькинъ

наблюдали 17 сентября прохождение кометы черезъ дискъ Солнца; это единственный случай наблюдений подобнаго рода. Движение кометы въ этотъ день изображено на рис. 33.

Во время прохожденія кометы черезъ дискъ Солнца она не была видна: какъ только она вступила на край солнечнаго диска, она тотчасъ же стала невидимою.


Послѣ прохожденія кометы 1882 г. черезъ перигелій, когда она была видна съ сѣвернаго полушарія, замѣтили въ ея ядрѣ любопытныя измѣненія: оно сначала вытянулось въ блестящую полоску и затѣмъ раздробилось на четыре части. Подобное явленіе, какъ извѣстно читателю, наблюдалось и въ кометѣ Брукса 1889 года, а также въ кометѣ 1888 І.

Невооружевнымъ глазомъ комета была видна только до февраля 1883 г., затъмъ скрылась, но въ телескопъ ее можно было наблюдать до 16 августа.

Періодъ обращенія всёхъ трехъ кометь не могъ быть опредёлень, но во всякомъ случат онъ не менте 700 лёть.

#### Вольшая комета 1881 III.

Между кометами 1880 и 1882 года, описанными на предыдущихъ страницахъ, появилась блестящая комета 1881 года; она была открыта 22 мая Д. Тебутомъ въ Виндзоръ, въ Австраліи; черезъ мъсяцъ она перешла въ съверное полушаріе и была видна просто глазомъ до ноября мъсяца, а затъмъ была еще наблюдаема въ телескопъ въ теченіе трехъ мъсяцевъ, такъ что въ общей сложности ее наблюдали въ продолженіи 9 мъсяцевъ. Она была настолько ярка, что могла



III. Большая комета 1843 г.

быть наблюдаема въ меридіанѣ съ помощью меридіанныхъ круговъ, и наблюденія этого рода, отличаясь большою точностью, дали возможность опредълить прекрасную орбиту кометы. Орбита, вычисленная профессоромъ Ө. Ө. Витрамомъ изъ трехъ наблюденій, оказалась такою же точною, какъ и орбита, вычисленная другими наблюдателями изъ многихъ наблюденій. Орбита этой кометы имъетъ большое сходство съ орбитою большой кометы 1807 г., но ихъ тождество не могло быть окончательно удостовърено; всего въроятнъе, что объ кометы идутъ одна вслъдъ за другою по одной и той же орбитъ. Періодъ кометы 1881 ІІІ, опредъленный изъ всъхъ наблюденій, оказался въ 2954 года.

#### Вольшая комета 1887 г.

Первая комета 1887 г. была открыта 18 января одновременно многими лицами въ южномъ полушаріи; она была замѣчена тогда, когда уже достигла значительнаго блеска и когда имѣла длинную косу въ 40 градусовъ. Какъ внѣшній видъ, такъ и орбита этой кометы имѣютъ сходство съ кометами 1668, 1843 І, 1880 І и 1882 ІІ; вмѣстѣ съ ними она составляетъ одну семью, только блескъ кометы 1887 І слабъе другихъ той же семьи; вслѣдствіе этого она не могла быть наблюдаема такъ долго: послѣдній разъ ее видѣли 29 января; всего же она была видна въ теченіе 12 дней.

Особенность, этой кометы заключалась въ отсутстви ядра; начиная съ 21 января ни на одной обсерси. п. главенацъ.

ваторіи не удалось вид'єть ядра кометы. Это явленіе вм'єсть съ быстрымь уменьшеніемь блеска кометы служить указаніемь тому, что комета разлагалась въ метеорный потокъ. Можно пожал'єть, что тогда небесная фотографія не им'єла такого широкаго прим'єненія, какъ въ настоящее время, и что за нею не им'єли возможности сл'єдить посл'є того, какъ она скрылась изъ виду въ самыхъ большихъ телескопахъ.

## Комета 1888 І.

Начало 1888 года, какъ и предыдущаго, ознаменовалось открытіемъ блестящей кометы: 18 февраля астрономъ Саверталь на Мысѣ Доброй Надежды открылъ блестящую комету, имѣвшую небольшую косу; онъ замѣтилъ комету не въ телескопъ, а просто глазомъ. До начала апрѣля можно было наблюдать комету невооруженнымъ глазомъ; въ телескопъ же комету наблюдали до 7 сентября; послѣднее наблюніе было сдѣлано въ этотъ день нынѣшнимъ вице-директоромъ Вѣнской Обсерваторіи І. Пализа.

Въ головъ кометы Саверталя происходили явленія, подобныя тъмъ, которыя наблюдались въ кометъ 1882 II. Сначала были замъчены какія-то особенныя свътовыя истеченія изъ ядра кометы, истеченія, не совпадавшія съ косою, а затъмъ ядро вытянулось въ длинную полоску съ нъсколькими свътовыми уплотненіями. Комета, безъ всякаго сомнънія, вступила на путь разложенія въ метеорный потокъ.

Комета была наблюдаема во многихъ обсерваторіяхъ, и это дало возможность опредёлить орбиту

весьма точно. Орбита оказалась эллиптическою съ довольно значительнымъ экспентриситетомъ 0,99585 по опредѣленію Тенанта 1). Разстояніе перигелія оть Солица равияется 0,7 разстоянія Земли отъ Солнца: этимъ элементамъ соотвътствуетъ періодъ обращенія вокругь Солнца въ 2200 леть, такъ что ближайшее ея появление могло бы состояться въ 4088 году. Предсказывать появление кометы на столь. продолжительный срокъ, какъ было замъчено въ началъ настоящей книги, нътъ возможности. Но если даже и признать правильность опредъленія періода обращенія кометы вокругь Солнца, то едва ли когда нибудь удастся вторично увидъть комету Саверталя; уже въ 1888 году она вступила на нуть разложенія. въ метеорный потокъ, и весьма возможно, что въ настоящее время нъть болъе кометы, а вмъсто нея существуеть метеорный потокъ, пвижущійся по орбить кометы, удаляясь отъ Солнца. До конца, 30-го стольтія онъ будеть продолжать удаляться отъ Солнца, а затъмъ начнетъ приближаться къ нему.

## Вольшая комета 1893 II.

Комета 1893 II, подобно другимъ блестящимъ, была открыта одновременно многими астрономами и любителями астрономіи. Первое наблюденіе въ Европъ произведено 9 іюля г. Кениссэ въ Жювизи, возлъ Парижа; въ Соединенныхъ же Штатахъ Съ

<sup>1)</sup> Monthly Notices of the R. A. Soc. vol. 49, p. 285.

верной Америки первое наблюденіе произведено г. Рордамомъ въ Ютахѣ. Одновременно съ г. Рордамомъ комету видѣли просто глазомъ Джонсонъ въ Альтѣ, Миллеръ въ Айовѣ и Боссъ въ Альбани. Послѣ того, какъ стало извѣстно объ открытіи Рордамомъ кометы, испанецъ г. Розо де-Луна (Roso de Luna) изъ Логрозана въ Эстрамадурѣ сообщилъ, что онъ видѣлъ комету 4 іюля, но принялъ ее за новую звѣзду. Вмѣстѣ съ тѣмъ астрономъ Сперра изъ Рандольфа, въ штатѣ Огайо, увѣдомилъ редактора «Astronomische Nachrichten», что онъ открылъ комету 19 іюня и до 10 іюля наблюдалъ ее въ теченіе 13 вечеровъ, принимая ее за періодическую комету Финлея, появленіе которой въ то время ожидалось. Такимъ образомъ первенство открытія кометы принадлежитъ г. Сперра.

Комета Сперра-Рордама имѣла косу въ 12 градусовъ и кромѣ того еще три боковыя косы; онѣ, по всей вѣроятности, указывали на начавшееся дробленіе кометы и разложеніе въ метеорный потокъ. Къ сожалѣнію, комета могла быть наблюдаема только до середины августа, когда она поблекла въ лучахъ Солнца. Изъ лучей Солнца комета вышла только въ ноябрѣ, но она была такъ слаба, что могла быть наблюдаема только однажды: 3 ноября астрономомъ Черулли въ Терамо.

### Вольшая комета 1901 г.

Первая большая комета 20-го стольтія открыта сразу нъсколькими наблюдателями, когда она уже обладала значительнымъ блескомъ. Центральной стан-




Рис. 34. Косы большой кометы 1901 г.

ціей для передачи астрономическихъ телеграммъ въ Килъ получены слъдующія телеграммы:

- 1) Очень яркая комета открыта 23 апръля Хольсемъ въ Квинстоунъ, Капской колоніи.
- 2) Очень яркая комета открыта 24 апръля Татерсалемъ на мысъ Ліювинъ возлъ Мельбурна въ Австраліи.
- 3) Очень яркая комета открыта 2 мая въ Ареквипъ. Комета открыта около Солнца и перемъщалась къ съверу; первое наблюдение въ съверномъ полушарии произведено 27 апръля въ американской обсерватории Іеркеса при солнечномъ восходъ приблизительно на 15° къ съверу отъ Солнца. Къ сожалънию, комета быстро удалялась отъ Солнца и отъ Земли и вслъдствие этого видимый блескъ ся уменьшался съ каждымъ днемъ.

Послѣ того, какъ были обнародованы извѣстія объ открытіи большой кометы 1901 года, Лоренцо Кронъ изъ Уругвая сообщилъ редактору «Astronomische Nachrichten», что г. Вискара, управляющій имѣніемъ Эстанція, лежащаго возлѣ г. Пайзанду, видѣлъ комету утромъ 12 апрѣля. Изъ описанія и распросовъ г. Кронъ убѣдился, что это дѣйствительно была комета; самъ же Кронъ въ первый разъ увидѣлъ ее 20 апрѣля и былъ пораженъ величіемъ небеснаго явленія.

За кометою стали усердно наблюдать и зарисовывать видь ея косъ. Оказалось, что коса постоянно мёняла свой видь. Съ 5 мая видны были двё косы: одна яркая, другая очень слабая. Астрономъ Капской обсерваторіи Р.Т.А. Иннесъ изо дня въ день слё-

диль за кометою съ 3 мая до 14 іюня, а г. Ленть за это время наблюдаль измѣненія, изображенныя на прилагаемыхъ рисункахъ.

24 апръля коса кометы была одинокая и принадлежала къ I типу; затъмъ 5 мая она становится, какъ сказано, двойною I и II типовъ, при чемъ преобладающею, наиболъе яркою является коса I типа; 7-го мая коса II типа длиннъе косы I типа, послъдняя меркнетъ и сокращается, а на послъднемъ рисункъ, полученномъ 12 мая на фотографической пластинкъ, коса I типа (правая) совсъмъ маленькая; коса II типа тоже небольшая, за то III-го типа ярче и больше двухъ остальныхъ косъ.

Если читателю посчастливится открыть комету, то слѣдуетъ сообщить по телеграфу въ Пулковскую обсерваторію; можно также сообщить въ Кильскую Центральную Станцію для передачи астрономическихъ телеграммъ по сокращенному адресу: «Astronom Centralstelle Kiel». При этомъ право первенства будетъ дано тому, кто первый сообщитъ точное положеніе ядра кометы.

Наблюденія, произведенныя г. Лентомъ, дали Ө. Бредихину матеріалъ для изученія явленій, происходившихъ въ этой кометѣ. Сначала отъ кометы отдѣлялось вещество, образовавшее косу І типа; когда же оно стало изсякать, поблекла коса І типа и появилась коса ІІ типа изъ другого вещества, а въ концѣ видимости кометы появилось вещество для образованія косы ІІІ типа. Безъ хорошихъ изображеній кометныхъ косъ никакого успѣха въ развитіи этого отдѣла Астрономіи быть не можетъ. Друзья и



Рис. 35. Комета 1908 г. Морхауза 3 октября. (По фотографіи Бернерда).



Рис. 36. Комета 1908 г. Морхауза 4 октября. (По фотографіи Бернерда).

любители Астрономіи могли бы въ данномъ вопросъ оказать большія услуги наукъ, особенно въ томъ случаь, если они имъють фотографическую камеру.

Эксцентриситеть орбиты кометы 1901а не могь быть опредёлень; вслёдствіе этого астрономы принимають, что комета движется по параболів.

## Замъчательная комета Морхаува 1908 г.

Астрономъ Іеркской обсерваторіи Морхаузъ замѣтиль, что на фотографической пластинкѣ, снятой имъ 1-го сентября съ созвѣздія Жираффы (Camelepardalis), видно яркое изображеніе кометы съ длинною косою; комета быстро двигалась къ сѣверо-западу. Открытая имъ комета была третья въ 1908 году и обозначена буквою с латинскаго алфавита: 1908 с. Хотя она только изрѣдка была видна просто глазомъ, но ея фотографическіе лучи были очень сильные, и вслѣдствіе этого удалось получить прекрасные негативы. Ни одна комета еще не представляла такихъ удивительныхъ явленій, какъ комета Морхауза; вотъ причина, почему мы включили ее въ списокъ большихъ кометъ, назвавъ ее, однако, не большою, а замѣчательною.

Въ предыдущемъ году появилась комета Даніеля; она была также видна просто глазомъ въ теченіе двухъ мъсяцевъ, какъ слабое свътило, но сама по себъ комета ничего особеннаго не представляла; мало того, фотографическіе снимки получались при болъе продолжительной выдержкъ, чъмъ съ кометы Морхауза, которая только во время своего наибольщого блеска могла быть видна просто глазомъ; во все же осталь-

ное время оставалась телескопическою. Въ кометъ Морхауза постоянно происходили перемъны, иногда съ непостижимою быстротою. Мы приводимъ здъсь два снимка, полученные Бернердомъ 3 и 4 октября; въ первый вечеръ изъ головы вытекаетъ нъсколько свътовыхъ струекъ, образующихъ прямую косу; во второй вечеръ только одна струя, но коса искривлена и какъ бы переломана въ двухъ мъстахъ.

Необычайное измѣненіе въ косѣ кометы произошло 15 октября. Уже съ 14 сентября была замѣтна какая-то усиленная дѣятельность въ ближайшихъ частяхъ косы, лежащихъ около самой головы кометы: эти части были блестящія, свѣтовыя полоски были рѣзкія. Въ кометѣ происходило нѣчто особенное. Усиленіе свѣта полосокъ указывало на выбрасываніе изъ ядра кометы значительныхъ массъ кометнаго вещества. Дѣятельность кометы усиливалась, а черезъ 12 часовъ произошелъ взрывъ, изображенный на рис. 37. Между отдѣлившеюся массою и ядромъ кометы замѣчается слабая коса, которая, однако, у самаго ядра снова становится яркою. Очевидно, послѣ взрыва дѣятельность нѣсколько успокоилась, но затѣмъ она снова возобновилась.

Отдълившіяся массы въ косъ кометы могли состоять изъ мельчайшихъ твердыхъ частицъ, выброшенныхъ изъ ядра отталкивательною силою солнечныхъ лучей; подобное отталкиваніе, вызываемое давленіемъ солнечныхъ лучей, доказано теоретически, а затъмъ и эмпирически, о чемъ мы узнаемъ въ главъ 15, нашимъ извъстнымъ ученымъ, профессоромъ Московскаго университета П. Н. Лебедевымъ. Затъмъ отъ нагръванія вещества солнечными лучами твердое вещество стало превращаться въ газообразное, образовавшее, въ свою очередь, независимыя косы. Послѣ 16 октября комета продолжала представлять удивительныя измѣненія



Рис. 37. Комета 1908 г. Морхаува 15 октябія. (По фотографіи Бернерда).

сеоего вида; 28 октября комета стала видима просто глазомъ съ крошечною косою, а въ слъдующій вечеръ коса уже была длиною въ 6 градусовъ; спустя день комета едва была видима; 20-го же октября комета



Рис. 38. Комета 1908 г. Морхауза 16 октября. (По фотографіи Бернерда. ІПкала: 1 сантим. — 25').

снова казалась яркою съ косою въ 6 градусовъ. На фотографическихъ пластинкахъ коса была длижбю въ 15 градусовъ и продолжала представлять удивительныя явленія. Мы приводимъ фотографическій снимокъ, полученный Бернердомъ 16 ноября 1908 года при выдержкъ въ 1 ч. и 3 м. На негативъ замътна цълая система свътовыхъ струекъ; изъ нихъ однъ правильныя, а другія искривленныя. Въ косъ кометы, повидимому, произошло явленіе, отчасти напоминающее то, которое наблюдалось 15 октября (см. рис. 37).

Бернерду удалось въ этотъ вечеръ, 15 октября, снять комету два раза при одинаковой выдержкъ. Объ пластинки даютъ прекрасное стереоскопическое изображение кометы Морхауза. Мы приводимъ эти снимки на особомъ листъ; читатель можетъ выръзать ихъ по дини, указанной на рисункъ, и вставить въ стереоскопъ.

## Вольшая комета 1910а.

Первая комета 1910 года открыта въ Іоганнесбургѣ, бывшей столицѣ Трансваальской республики, одновременно многими лицами; первое же наблюденіе произведено Иннесомъ и Ворселемъ въ Іоганнесбургѣ 4 января. За два дня передъ тѣмъ ее видѣли въ бывшей Оранжевой республикѣ. Въ день открытія комета была такъ ярка, что могла быть видима днемъ возяѣ самаго Солнца. Комета быстро двигалась къ сѣверу и черезъ нѣсколько дней уже перемѣстилась въ сѣверное полушаріе; вмѣстѣ съ тѣмъ она быстро удалялась отъ Солнца и Земли и вслѣдствіе этого ея блескъ уменьшался съ каждымъ днемъ. Въ Петербургѣ она



Рис. 39. Комета 1910а.


могла быть видима съ 12 до 15 января просто глазомъ, на вечернемъ небѣ, а затѣмъ стала телескопическою и скрылась въ вечернихъ лучахъ Солнца. Фотографія ея косы представляла весьма ровный изогнутый коноидъ безъ перегибовъ и изломовъ. Ничего подобнаго тому, что представляла комета Морхауза, въ ней не наблюдалось. Комета не періодическая, и о вторичномъ ея возвращеніи пока не можетъ быть и рѣчи.

## Комета Галлея.

Последнею большою кометою, блиставшею до изданія настоящей книги, была комета Галлея. Открытая въ сентябръ 1909 года на фотографической пластинкъ. она стала видима просто глазомъ до восхода Солнца па югъ Россіи только въ последнихъ числахъ апреля по старому стилю. Она имъла порядочную косу, была блестящая и могла быть легко наблюдаема. На съверѣ Россіи, гдѣ въ это время утреннія зори блестящія, комету нельзя было видіть. Исторія кометы Галлея изложена на стр. 108. Здёсь мы замётимъ, что блескъ кометы Галлея въ настоящемъ ея появленіи быль, повидимому, слабъе, чъмъ въ предыдущія появленія. Весьма возможно, что комета уже стала дробиться и разлагаться въ метеорный потокъ. Окончательное ръшение этого вопроса принадлежить буду $щему^1$ ).

<sup>1)</sup> Весьма обстоятельное изложение о кометь Галлея, читатель найдеть въ книгь Н. М. Субботиной: «Исторія кометы Галлея». С.-Петербургь 1910 г.

IV. Комета Морхауза 1908 г. для стереоскопа.





# 12. Строеніе кометъ.

Опредъленіе массы кометь или, иначе говоря, опредъленіе количества вещества, заключающагося въ кометь, сравнительно съ массою Земли или Солнца—дъло весьма трудное и во многихъ случаяхъ недоступное, несмотря на совершенство современной наблюдательной астрономіи. Различными, однако, соображеніями можно убъдиться въ томъ, что масса кометь есть величина ничтожно малая сравнительно съ массою Луны. Въ нъкоторыхъ только случаяхъ является возможность опредълить предълъ, превысить который масса кометы не можеть.

Мы уже имѣли случай привести данныя о размѣрахъ кометъ и ихъ косъ, и убѣдились, что своею величиною нѣкоторыя кометы превосходятъ всѣ свѣтила Солнечной системы и даже Солнце. Мы также доказали, что размѣры кометныхъ косъ не ограничены: они безконечны въ одну сторону. Если бы комета вмѣстѣ со своею косою состояла изъ плотнаго вещества, то масса всей кометы была бы больше не только массы Земли, но и Солнца; мало того, масса

кометы, безграничной по своей формъ, была бы безконечно велика; каждая появившаяся комета была бы преобладающимъ свътиломъ Солнечной системы; всв планеты стали бы обращаться вокругь кометы, а не вокругъ Солнца. Въ Солнечной системъ произошель бы форменный переполохъ. Ничего подобнаго. однако, не происходить. Солнце остается преобладающимъ свътиломъ Солнечной системы, и несмотря на одновременное появление нъсколькихъ кометъ, всв иланеты соверщають свое обращение вокругь Солнца самымъ правильнымъ образомъ. Мы узнаемъ дальше, что въ предълахъ Солнечной системы постоянно находится много кометь (стр. 253); всё онё также обращаются вокругь Солнца и уходять изъ предъловъ планетнаго міра, не производя никакихъ замътныхъ въ немъ переворотовъ. Все это приводить нась къ заключенію, что кометы по своей массъ значительно меньше не только Солнца, но и планеть.

Воть первое заключеніе, которое можно вывести изъ изв'єстныхъ фактовъ. Дал'єе, разбирая наблюдаемыя явленія, мы утверждаемъ, что ни одна комета не можеть быть по своей масс'є больше наименьшей планеты, именно Меркурія, потому что и въ его движеніи ни одна изъ изв'єстныхъ намъ кометь не произвела сколько-нибудь зам'єтныхъ возмущеній. Но мы можемъ значительно сузить только-что найденный высшій предёлъ для массы кометь.

Мы знаемъ, что орбиты нѣкоторыхъ кометъ подъ могучимъ вліяніемъ Юпитера изъ параболическихъ преобразовались въ эллиптическія; такой случай былъ,

напримъръ, съ кометою Лекселя. При вступленіи кометы въ Солнечную систему, ея орбита была превращена въ эллиптическую, а затъмъ, при дальнъйшемъ движеніи, подъ дъйствіемъ того же Юпитера, орбита кометы превратилась въ параболическую, а можеть быть и въ гиперболическую, и комета ушла въ безпредъльныя звъздныя пространства. Вліяніе Юпитера оказалось въ данномъ случать настолько сильнымъ отъ того, что комета Лекселя значительно приблизилась къ нему; она даже вступила въ предълы, занимаемые спутниками Юпитера. Если бы масса кометы была такой же величины или была сравнима съ массою Юпитера, то она произвела бы въ его движеніи столь же значительныя возмущенія, какія произвель Юпитерь въ ея движенін; между тімь комета не возмутила движенія не только Юпитера, но даже и его спутниковъ; слъдовательно, масса кометы Лекселя несравненно меньше массы спутниковъ Юпитера. Въ данномъ случав мы имъемъ болъе точное опредъление величины, больше которой не можеть быть масса кометы Лекселя. Переведемъ этотъ предълъ на части земной массы, которая составляеть  $\frac{1}{349390}$  часть массы Солица. Наименьшій спутникъ Юпитера—первый; его масса въ 178 разъ меньше массы Земли. Масса кометы Лекселя во всякомъ случат меньше перваго спутника Юпитера, такъ какъ въ его движении не было замътно никакихъ возмущеній; мало того, она должна быть значительно меньше этой массы, -- настолько меньше, что тяготъніе спутника къ кометъ не могло быть

замѣчено <sup>1</sup>), а это могло быть только въ томъ случаѣ, если ея масса по крайней мѣрѣ въ десять тысячъ разъ меньше массы спутника, т. е. меньше  $\frac{1}{1\,780\,000}$  массы Земли, или, въ круглыхъ числахъ, меньше одной двухъмилліонной доли массы Земли. Допустимъ даже, что у кометы Лекселя была дѣйствительно такая масса, а она была навѣрно меньше; предположимъ, кромѣ того, что комета имѣла такую же плотностъ, какъ и Земля, то все вещество кометы помѣстилось бы въ шарѣ, радіусъ котораго равенъ 56 километрамъ.

Вотъ выстій предълъ для массы кометы Лекселя. По единичному опредъленію, конечно, нельзя обобщать явленіе и утверждать, что и у всъхъ кометъ массы такія же ничтожныя. Мы можемъ только сказать, что «въроятно и у всъхъ кометъ масса ничтожная»; если бы у нихъ была значительная масса, то при множествъ кометъ, обращающихся въ предълахъ Солнечной системы, вліяніе ихъ на движеніе планеть и ихъ спутниковъ непремънно сказалось бы.

Разсмотримъ теперь вопросъ: каково строеніе кометь. Для рѣшенія этого вопроса у насъ имѣются многія весьма цѣнныя данныя наблюденій.

Многіе астрономы наблюдали любопытное явленіе: кометы, проходя передъ звъздами и закрывая ихъ своею головою и даже ядромъ, нисколько не

<sup>1)</sup> Пятый, шестой, седьмой и восьмой спутники Юпитера значительно меньше I-го Ганилеева спутника, по въ то время они еще не были открыты, и всябдствіе этого, неизвъстно, вызвада ли комета Лекселя нъкоторыя возмущенія въ ихъ движеніи.

умаляли ихъ блеска. Такъ, напримъръ, въ 1828 г. В. Струве наблюдалъ закрытіе кометою Энке звъзды одиннадцатой величины и не замътилъ при этомъ никакого уменьшенія яркости звъзды. Комета имъла въ это время 500,000 килом. въ діаметръ. Принимая во вниманіе эти размъры, а также и то, что яркость звъзды вовсе не уменьшилась, Струве заключилъ, что плотность ядра кометы и ея атмосферы меньше средней плотности нашей атмосферы въ 45 квадриллюновъ разъ (по французскому счисленію: 45 и 15 нулей)!

Подобный же методъ изслъдованія былъ приложенъ къ кометъ 1825 года; она прошла передъ звъздою пятой величины и нисколько не уменьшила ея яркости, по крайней мъръ уменьшене ея яркости не могло быть замъчено. Въ это время лучи свъта, исходивше отъ звъзды, проходили черезъ кометную массу, діаметръ которой былъ въ тысячу разъ больше высоты нашей атмосферы. Такъ какъ лучъ свъта, прошедшій черезъ земную атмосферу, теряетъ одну четверть своей яркости, и лишь три четверти достигають глаза, то яркость звъзды, наблюдаемой черезъ комету, равнялась бы

 $\binom{3}{4}^{999}$ 

въ томъ случаї, если бы плотность кометной атмосферы равнялась средней плотности земной атмосферы, и если блескъ звъзды, не закрытой кометой, принять за единицу. Число  $\binom{3}{4}^{999}$  равняется дроби, у которой числитель есть единица, а знаменатель 75, за которыми слъдуютъ 124 нуля. Не только подобнаго уменьшенія блеска, но вообще никакого уменьшенія не замѣтили; поэтому мы заключаемъ, что плотность кометнаго вещества должна быть неизмѣримо мала сравнительно съ среднею плотностью земной атмосферы. На основаніи этого вывода Дж. Гершель могъ утверждать, что и масса кометь ничтожна.

Совершенная прозрачность кометы можеть быть и при негазообразномъ строеніи ея; если, напримъръ, комета состоить изъ собранія мелкихъ твердыхъ частиць, не соприкасающихся одна съ другою, то лучи свъта, пройдя черезъ подобную космическую тучу, могуть и не умалиться въ своемъ блескъ. Дъйствительно, вообразимъ космическую тучу, лежащую между нами и наблюдаемою звъздою; мы разсматриваемь звъзду въ телескопъ, на объективъ котораго упадаеть пучокъ параллельныхъ лучей цилиндрической формы. Если разсматриваемый пучокъ лучей. при своемъ прохожденіи черезъ комету, не встрътится ни съ одною частицею, составляющею комету, то никакого умаленія блеска зв'єзды не произойдеть. Впрочемъ, лучи могуть встрътить нъкоторыя частицы, но только при условіи, чтобы происходящее при этомъ ослабление блеска было для глаза незамътно, а точными фотометрическими измъреніями установленъ слъдующій законъ: если измъненіе блеска произошло меньше, чемъ на 1/14 часть всего света, то глазъ не замъчаеть происшедшаго измъненія; поэтому изъ всего пучка лучей, упадающихъ на объективъ рефрактора, 1/14 можеть быть задержана частицами кометы. По произведеннымъ расчетамъ оказывается, что для телескопа, имфющаго въ діаметрф

20 сантим., лучи свъта могутъ встрътить 700 частицъ діаметромъ въ два миллиметра каждая, и при такихъ условіяхъ умаленіе свъта не будетъ замъчено.

Спрашивается, однако, возможно ли подобное строеніе ядра кометы? Приведемъ нъкоторыя наблюденія, проливающія яркій свъть на поставленный вопросъ.

Мы знаемъ, что комета Біела, бывшая вначалѣ одинокою, раздѣлилась въ 1845 году на двѣ части, а затѣмъ совершенно скрылась отъ взоровъ наблюдателей; она стала совершенно невидимою.

Мы знаемъ также, что комета, открытая Ліэ въ Олиндъ (Бразилія) 26 февраля 1860 г., была двойная; впереди шедшая комета была наиболье яркая и нъсколько вытянутая, а слъдовавшая за нею—слабая, имъвшая круглую форму. Вслъдствіе слабости кометы, она могла быть наблюдаема только до 13 марта и затъмъ скрылась изъ виду.

Мы знаемъ еще, что ядро кометы 1882 года раздробилось на части. Затъмъ мы знаемъ, что ядро періодической кометы Брукса (1889V) при первомъ ея появленіи раздробилось на четыре или пять частей, при чемъ каждая часть имъла свою косу. Дробленіе ядра произошло послъ открытія кометы, почти на глазахъ наблюдателей.

Наконецъ, мы знаемъ, что комета Біела, послѣ того, какъ она стала невидимою, встрѣтилась съ Землею, и при этомъ наблюдалось большое число падающихъ звѣздъ.

Воть явленія, которыми мы воспользуемся для уясненія природы кометь вообще, и въ частности строенія ихъ ядра.

Если бы кометы состояли изъ сплошного твердаго или жидкаго вещества, то дробленія кометь на части никогда бы не произошло. Въ сплошныхъ тълахъ частипы такъ плотно сцеплены одна съ другой, что для ихъ разъединенія требуется значительная сила. Такой внізней силы, которой было бы достаточно для. раздробленія на части св'ятила, состоящаго изъ сплошного вещества-мы не знаемъ. Существование же внутреннихъ силъ, могущихъ произвести взрывы, конечно, возможно, но тогда части разлетаются въ различныя стороны, чего ни разу не наблюдалось. Наконецъ, сплошное строеніе кометь несовм'встимо съ ихъ прозрачностью. Строеніе кометь должно быть. иное. Встръча кометы Біела всего лучше уясняеть намъ истинное ея строеніе. Дъйствительно, при встрічь съ нею мы наблюдали падающія звізды, которыя казались вылетающими изъ той точки небеснаго свода, гдв должна была находиться комета въ моментъ встръчи съ Землею. Нътъ сомнънія, что наблюденныя падающія звёзды составляли комету Біела. Падающія звізды, или метеоры, представляють собою, за малыми исключеніями, крошечныя твердыя тёла вёсомъ въ доли золотника. Если подобныхъ твлецъ много, и они близко одно отъ другого, то совокупность ихъ образуеть свътило, называемое нами кометою. Солнечный свъть, отражаемый оть отдёльной частицы или тёльца, для нась невидимъ, но свътъ, отраженный отъ множества частипъ, образующихъ комету, можеть быть видимъ. Видимый блескъ зависить, номимо другихъ причинъ, отъ большей или меньшей метеорной плотности кометы. Если разстояніе между частицами, образующими комету, мало, то съ единицы площади отражается много свѣта, и блескъ кометы яркій: мы видимъ обособленное свѣтило, красивую комету съ косою; если же разстояніе между частицами велико, то съ единицы площади отражается мало свѣта, и блескъ кометы незначительный; въ этомъ случав онъ можетъ быть такъ малъ, что комета невидима. О существованіи подобныхъ кометь мы ничего не знаемъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда ихъ орбита пересѣкаетъ орбиту Земли, и когда въ нашу атмосферу влетаютъ метеоры, составляющіе описанную комету.

Итакъ, комета состоитъ изъ собранія большого числа твердыхъ тѣлецъ, не соприкасающихся одно съ другимъ; они удерживаются взаимнымъ тяготѣніемъ и движутся вокругъ Солнца, подчиняясь великимъ законамъ Ньютона. Мы видимъ кометы только тогда, когда онѣ приближаются къ Солнцу; вдали же отъ него, за предѣлами Солнечной системы, онѣ для насъ совершенно невидимы.

## 13. Дробленіе кометь и образованіе метеор-

Кометы Віела, Брукса, Ліэ и другія представили случаи дробленія ихъ ядра на части; кромѣ того, комета Біела, раздѣлившись на двѣ части, послѣ двухъ оборотовъ вокругъ Солнца, исчезла; изъ нея образовался метеорный потокъ. Вещество, составлявшее прежде комету, разошлось по ея орбитѣ, и послѣ этого ежегодно 27 ноября мы встрѣчаемся съ падающими звѣздами, составлявшими когда-то комету Біела. Спрашивается, какая сила заставляетъ кометы дробиться на части, какимъ образомъ происходитъ ихъ дробленіе и какимъ образомъ космическое вещество, составлявшее комету, распредѣляется по ея орбитѣ? Составляетъ ли это событіе нѣчто особенное или же оно является необходимымъ слѣдствіемъ міровыхъ законовъ природы?

Вообразимъ комету, находящуюся въ афеліи въ самой отдаленной точкъ отъ Солнца. Предположимъ, что она состоить изъ множества отдъльныхъ тълецъ—твердыхъ частицъ,—и что она имъетъ шарообразную форму. Допустимъ, что взаимное тяготъніе между частицами невелико и на время пренебрежемъ имъ. Если бы комета состояла изъ сплошного твердаго вещества, то она обращалась бы вокругъ Солнца, какъ обособленное свътило; но такъ какъ комета состоитъ изъ отдъльныхъ тълецъ, то при движении кометы произойдетъ слъдующее явление. Ближайшая къ Солнцу частица А (Рис. 40) тяготъетъ къ нему сильнъе, чъмъ отдаленная В, и по третьему закону Кеплера должна двигаться быстръе, чъмъ послъдняя; поэтому она уйдетъ впередъ относительно другихъ чистицъ, и ко-




Рис. 40. Образование метеорныхъ потоковъ.

мета потеряеть шаровидную форму; она вытянется и приметь видь  $A_1B_1$ . При дальнѣйшемъ движеніи кометы, частица  $A_1$  еще болѣе уйдеть впередъ относительно всѣхъ другихъ, составляющихъ комету; комета еще болѣе вытянется, принявъ форму  $A_2B_2$ . Наконецъ, при дальнѣйшемъ движеніи разсматриваемыя частицы могутъ распредѣлиться вдоль всей орбиты кометы. Такимъ образомъ, дѣйствіемъ тяготѣнія къ Солнцу комета разложится въ метеорный потокъ.

Мы разсмотръли случай, когда взаимное тяготъніе частиць ничтожно мало; если же оно значительно, то комета можеть слъдать одинь, два или много обо-

ротовъ вокругъ Солнца, оставаясь обособленнымъ свътиломъ, но съ каждымъ оборотомъ разстояніе между частицами увеличивается, а въ зависимости отъ этого взаимное тяготъніе между частицами уменьшается; при уменьшеніи же его разложеніе кометы неизбъжно и является вопросомъ времени.

Небо можеть представить и иной порядокъ разложенія кометы въ метеорный потокъ. Вмѣсто шаровидной формы комета, мысленно помѣщенная въ афеліи, можеть имѣть неправильную форму и два или три центра сгущенія космическихъ частицъ. При предполагаемомъ строеніи комета сначала раздѣлится на двѣ или три части, смотря по тому, сколько было центровъ сгущенія вещества, а затѣмъ, черезъ болѣе или менѣе продолжительное время, каждое сгущеніе разложится въ метеорный потокъ. Подобные случаи представили намъ комета Біела, комета Брукса и друг. Комета Ліэ, вѣроятно, раздвоилась далеко за предѣлами видимости, и можеть еще долго двигаться какъ двойная, но затѣмъ и она превратится въ метеорный потокъ.

Если около одного центра космическое вещество имѣеть большее сгущеніе, чѣмъ около другого, то одна комета можеть разложиться въ метеорный потокъ раньше, чѣмъ другая; тогда рядомъ съ отдѣльными частицами будетъ двигаться обособленная комета. Подобные случаи представили намъ кометы Темпля 1866 I, Тетля 1862 III и 1861 I. Первая движется по орбитѣ потока Леонидъ, вторая—по орбитѣ потока Персеидъ, а третья по орбитѣ Геркулидъ (20 апрѣля по нов. ст.).

На основанін всёхъ изв'єстныхъ намъ явленій, разсмотрѣнныхъ въ настоящей главѣ, мы можемъ предугадать судьбу всёхъ кометь. Какъ только комета вступила въ сферу тяготънія къ Солнцу, судьба ея предръшена: послъ одного, нъсколькихъ или, въ случаяхъ, многихъ оборотовъ рѣдкихъ Солнца, она или прямо разложится въ метеорный потокъ, или же сначала раздробится на части, которыя въ свою очередь, въ большій или меньшій промежутокъ времени, разложатся въ метеорные потоки. Мы выводимъ заключение, что кометы являются временными свътилами; конечное ихъ состояніе-метеорный потокъ. Изъ числа метеорныхъ потоковъ, окружающихъ Солнце въ видъ ожерелій, мы знаемъ о существованіи только тіхь, которые пересікають земную орбиту; ихъ же число ничтожно сравнительно съ числомъ всёхъ потоковъ Солнечной системы; но и въ этомъ маломъ числъ заключается около двухъ тысячь метеорныхъ потоковъ; поэтому можно себъ представить, какое вообще число потоковъ обращается вокругъ Солнца, --потоковъ, невидимыхъ для насъ только потому, что земная орбита ихъ не пересъкаеть.

Итакъ, каждой кометъ предръшено рано или поздно разложиться въ метеорный потокъ, прекративъ свое временное существование, какъ отдъльное, независимое свътило.

Комета можеть раздвоиться или раздробиться и отъ другой причины. Профессоръ Московскаго университета П. Н. Лебедевъ 1) доказалъ, что свътовыя

<sup>1)</sup> Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 1902.

волны солнечныхъ лучей, упадая на небесныя свътила, отталкивають ихъ. Для большихъ планеть эта отталкивательная сила совершенно незамътна, для кометь, состоящихъ изъ мелкихъ частицъ, изъ такъ называемой космической пыли, сила эта вполнъ замътна; она тъмъ больше, чъмъ меньше діаметръ частиць, составляющихь комету или метеорный потокъ. Если, поэтому, комета состоитъ изъ частицъ неравнаго діаметра, то мельчайшія изъ нихъ будуть отброшены съ большею силою, чемъ крупныя: комета раздвоится. Подобный случай быль съ кометою Морхауза: отъ ея ядра отдёлилось облако мельчайшихъ частицъ, которыя въ свою очередь превратились въ газообразное состояние и образовали косу второго порядка (см. рис. 47). Подобныя же измёненія могуть постоянно происходить въ метеорныхъ потокахъ.

## 14. Семьи кометъ.

Явленіе дробленія кометь на части, разсмотр'внное нами въ предыдущей глав'в, наводить насъ на сл'вдующія мысли о движеніи кометь до вступленія въ пред'влы Солнечной системы и о возможныхъ явленіяхъ посл'в вступленія въ ея пред'влы.

Разсмотримъ сначала вопросъ теоретически, а затъмъ разыщемъ, нътъ ли среди кометъ такихъ, которыя подтверждали бы теоретическій выводъ.

Допустимъ, что на громадномъ разстояніи отъ Солнца въ небесномъ пространствѣ движется по направленію къ Солнечной системѣ метеорное облако, въ которомъ космическое вещество сгруппировалось около нѣсколькихъ центровъ; въ разсматриваемомъ облакѣ образовалось нѣсколько кометъ. Кометы могутъ быть вообще распредѣлены различнымъ образомъ относительно линіи движенія; онѣ могутъ лежать на одной и той же линіи или по сторонамъ отъ нея.

Находясь на громадномъ разстояни отъ Солнца, кометы движутся прямолинейно и равномърно по инер-

ціи. Проходять годы, вѣка и тысячелѣтія, и никакого уклоненія оть прямолинейнаго движенія не замѣчается. Съ каждымъ, однако, годомъ кометы приближаются къ Солнцу, и наконецъ наступитъ время, когда тяготѣніе къ Солнцу станетъ замѣтнымъ; тогда къ инертному движенію кометь присоединяется движеніе кометь подъ вліяніемъ тяготѣнія къ Солнцу; кометы начинають двигаться по весьма вытянутому эллипсу.

Разсмотримъ сначала частный случай, когда двъ или нъсколько кометь движутся одна вслъдъ за другой; всъ онъ опишуть одинъ и тотъ же эллипсъ. Разстояніе, бывшее между ними вначалъ небольшимъ, со временемъ увеличится, такъ какъ идущая впереди комета, тяготъя къ Солнцу сильнъе всъхъ остальныхъ, уйдеть впередъ, а послъдняя отстанетъ; разстояніе между кометами будетъ постоянно увеличиваться. Первая комета можеть пройти черезъ перигелій на нъсколько лътъ или десятилътій раньше второй, вторая въ свою очередъ раньше третьей и т. д. Всъ кометы будутъ двигаться по одной и той же орбитъ, одна вслъдъ за другою, и въ разное время пройдутъ черезъ перигелій.

Разсматриваемый случай движенія кометь по одной и той же орбить представили намъ кометы 1668, 1843 I, 1880 I, 1882 II и 1887 I. Всъ пять кометь были блестящія и отличались большою косою; всъ онъ почти коснулись поверхности Солнца. О сходствъ орбить этихъ кометь можно судить по слъдующимъ элементамъ;

Кометы.	Наплон- ность.	Допгота узла.	Разстояніе перигелія оть узла.	Наименьшее равстояніе отъ Солица.
1668	144°	$357^{\circ}$	80°	0.005
1843 I	144°	$359^{\circ}$	82°	0.005
1880 I	144°	<b>3</b> 56°	$82^{\circ}$	0.005
1882 II	142°	346°	70°	0.008
1887 I	138°	340°	65°	0.005

Орбиты первыхъ трехъ кометъ, въ предѣлахъ неизбѣжныхъ ошибокъ наблюденій, вполнѣ тождественны между собою, такъ что дѣйствительно кометы шли одна вслѣдъ за другою; двѣ же послѣднія




Рис 41. Движеніе семьи кометь до вступленія въ предѣлы Солнечной системы.

шли нѣсколько въ сторонѣ. Въ общемъ всѣ орбиты имѣютъ столь вначительное сходство между собою, что безъ опасенія ошибиться мы утверждаемъ, что всѣ пять кометъ принадлежатъ къ одной и той же группѣ. Относительное положеніе кометъ до вступленія въ предѣлы тяготѣнія къ Солнцу изображено на рисункѣ 41-мъ. Замѣтимъ, что самое незначительное уклоненіе отъ линіи движенія вызываетъ замѣтное различіе въ элементахъ движенія.

Разсмотримъ теперь общій случай, когда кометы, образовавшіяся изъ одного и того же космическаго облака, не лежать вдоль линіи движенія, а располо-

жены по сторонамъ отъ нея, какъ изображено на рисункъ 42-мъ. Всъ плоскости кометныхъ орбитъ, проходящія черезъ начальное движеніе каждой кометы Bb,




Рис. 42. Движеніе семьи комсть, орбиты которыхъ имѣютъ общую ось.

Cc или Dd, и черезъ центръ Солнца S, пересъкаются по одной и той же линіи PSA, проходящей черезъ перигелій P и афелій A всъхъ разсматриваемыхъ кометь. Въ общемъ случав орбита каждой кометы бу-

деть отличаться оть орбить другихъ кометь той же группы, но у нихъ будеть общій перигелій и общій афелій, т. е. общая ось. Мы приведемъ примърь общаго случая семьи кометь, заимствуя его изъ занимательной работы М. Хоека 1). Въ первыхъ столбцахъ помъщены элементы орбить кометь, а въ послъднихъ двухъ—долгота и широта перигелія: сходство или тождество послъднихъ указываеть на общность происхожденія кометь изъ одного и того же космическаго вещества.

Кометы, имъющія общій перигелій, составляють такь называемую семью комета.

Комета.	Навл.	Долг. <b>узла.</b>	Разстояніе перигелія.		Широта гелія.
	Семья Л	<u>.</u> 1.			
1845 I	47°	$337^{\circ}$	0.91	$280^{\circ}$	<b>42</b> °
1846 V	122	161	1.38	275	55
1845 VIII	50	5	0.83	281	<b>— 50</b>
	Семья Ж	<u>2</u> .	·		
1846 VII	151°	262°	0.63	341°	— <b>29</b> °
1847 II	100	174	2.11	347	32
	Семья М	<u>3</u> 3.			
1854 V	14 <sup>0</sup>	238°	1.36	346°	+14°
1661 III	138	145	0.84	347	+ 18

<sup>1)</sup> M. Hoek. On the Comets of 1677 and 1683; 1860 III, 1863 I and 1863 IV. Monthly Notices of the R. Astronomical Society, vol. 26.

Комета.	Накл.	Долг. узла.	Разстояніе перигелія.	Долг. пері	Широта игелія.
	Семья №	4.	C.		
1855 I	<b>129</b> °	190°	2.19	$35^{\circ}$	
1861 I	80	30	0.92	37	+33
	Семья №	5.			
1860 III	<b>79</b> °	85°	0.29	303°	— <b>73</b> °
1863 I	85	117	0.79	313	<b>— 74</b>
18 <b>63</b> VI	83	105	1.31	314	-76
	Семья №	6.			
18 <b>62 II</b>	172°	327°	0.98	120°	4º
1864 II	178	95	0.91	124	<b>—</b> 1

Весьма интересныя спеціальныя изслідованія о семействахь кометь читатель найдеть вы книгіз К. По-кровскаго: «Происхожденіе періодическихь кометь».

Если въ каждой семъв кометь сравнить между собою элементы орбить (числа первыхъ трехъ столбцовъ), то, за малыми исключеніями, никакого между
ними сходства нѣтъ, а между тѣмъ ось ихъ орбитъ
одна и та же, или, какъ мы говоримъ, перигелій направленъ въ одну и ту же точку неба. Напримѣръ,
въ семъв кометъ № 4 орбиты объихъ кометъ 1855 I и
1861 I никакого сходства между собою не имѣютъ, а
между тѣмъ ихъ перигеліи направлены въ одну и
ту же точку неба, опредѣляемую долготою въ 36° и
широтою въ 30°,5. Эта точка лежитъ въ созвѣздіи
Андромеды; противоположная же, соотвѣтствующая
Афелію, лежитъ въ созвѣздіи Центавра. Несомнѣнно,
обѣ кометы, до вступленія въ сферу тяготѣнія къ

Солнцу, двигались съ одною и тою же скоростью по линіямъ, параллельнымъ между собою, отъ созв'вздія Центавра къ Солнцу.

М. Хоекъ указываетъ на цълый рядъ кометныхъ семействъ; мы привели только нъкоторыя изъ нихъ, имъющія наиболье выраженный характеръ. Наибольшій интересъ представляеть описанная выше семья изъ пяти кометь, движущихся одна вслъдъ за другою.

Комета 1668 года была открыта невооруженнымъ глазомъ въ мартъ мъсяцъ въ Римъ; ея видимый путъ былъ зарисованъ на звъздномъ атласъ; точныхъ же наблюденій надъ нею не могло быть произведено: тогда телескопы еще не особенно примънялись къ точнымъ наблюденіямъ. Благодаря хорошимъ рисункамъ ), удалось опредълить ея орбиту и убъдиться, что она движется по той же орбитъ, по которой движутся кометы 1843 I, 1880 I, 1882 II и 1887 I; эти четыре кометы описаны въ главъ 11-й.

Замъчательно, что всъ пять кометь, составляющихъ разсматриваемую семью, принадлежать къ блестящимъ кометамъ, имъющимъ косы въ 40° длиною. Созданныя изъ вещества одной и той же туманности, всъ кометы имъють одинаковое движеніе и одинаковое строеніе. Однъ и тъ же причины вызывають одни и тъ же слъдствія.

Мы затронули здёсь вопрось о происхождении кометь; ихъ семьи дали намъ возможность заглянуть въ отдаленное прошлое и утверждать, что кометы,

<sup>1) «</sup>Observationes Goae habitae circa Phaenomenon coeleste, quod apparuit Mense Martio A. 1668, Romam missae ad P. Aegidium Franciscum de Gottignies in Coll. Rom. Math. Prof».

принадлежащія къ одной и той же семьѣ, имѣють общее происхожденіе. Но какъ произошли кометы изъ космическаго газообразнаго вещества—на это простое наблюденіе надъ движеніемъ кометь не можеть дать отвѣта. Для рѣшенія этого вопроса слѣдуеть изучить строеніе кометь и метеоритовъ—частей кометь, упавшихъ на Землю. Попытка къ уясненію этого вопроса будеть произведена въ главѣ «О происхожденіи кометь».




Рис. 43. Комета и туманное пятно.

## 15. Косы кометъ.

Вступая въ предълы видимости, комета почти всегда представляется въ видъ круглой туманности. По одному внъшнему виду отличить слабую телескопическую комету отъ туманности нътъ возможности; при болъе же внимательномъ наблюдени замъчается, что комета измъняеть свое положение относительно окружающихъ звъздъ, и это обстоятельство служить самымъ върнымъ доказательствомъ тому, что наблюдаемое свътило—комета.

По мёрё приближенія кометы къ Солнцу, она начинаеть удлиняться, и въ сторонё, противоположной Солнцу, появляется небольшая коса, или, какъ обыкновенно говорять, хвость кометы. Мы знаемъ, что въ нёкоторыхъ случаяхъ косы кометь достигають неимовёрной величины (см. стр. 11); въ настоящей главё мы разсмотримъ ихъ строеніе; мы узнаемъ, что косы кометь, подобно дыму идущаго локомотива или парохода, состоять изъ вещества, постоянно отдёляющагося отъ кометы; это вещество разсёивается въ небесномъ пространствё по строго опредёленнымъ механическимъ законамъ. Такимъ образомъ, коса кометы

является неограниченною, и если мы ее таковою не видимъ. то причина тому следующая: наиболее отдаленныя отъ кометы частипы имфють слишкомъ слабый блескъ, не вызывающій въ нашемъ глазу никакого впечатленія света. Съ другой стороны, мы знаемъ (стр. 10), что освъщение ночного неба имъетъ также большое вліяніе на видимую величину косы кометы; при малъйшемъ освъщении неба, зависящемъ отъ присутствія посторонняго свёта, слабейшія части косы кометы становятся невидимыми. Положимъ, напримъръ, что блестящая комета наблюдается въ тропическихъ приморскихъ странахъ или въ горахъ и у насъ на севере, где воздухъ, въ частности въ городахъ, не отличается особенною прозрачностью, гдф, кромф того, ночи летомъ светлыя. Въ тропикахъ будуть наблюдать большую косу у кометы, а на съверъ-сравнительно небольшую. Мы можемъ указать на подобные примъры. Большая комета 1759 года была наблюдаема въ различныхъ мъстахъ земного шара. Вотъ что говорить о ней де-Лаландъ: «Въ южныхъ странахъ, гдъ небо отличается большею чистотою и прозрачностью, косы кометь кажутся болбе яркими и болбе длинными. Комета 1759 года казалась въ Парижъ почти безъ хвоста, и съ трудомъ можно было отличить слабый слёдъ его въ одинъ или два градуса; между тъмъ какъ де-Рать въ Монцелье видълъ. 29 апръля, у кометы хвость въ 25 градусовъ, а наиболъе яркая часть его была въ 10 градусовъ длины. Въ то же самое время де-ла-Нюксъ, на островъ Бурбонъ, видъль болье длинный хвость вслъдствіе той же самой причины, по которой зодіакальный свёть виденъ тамъ ежелневно».

Итакъ, видимая величина косъ кометъ зависитъ въ большой степени отъ атмосферныхъ условій въ м'вст'в наблюденія; истинная же величина въ длину не им'ветъ границъ.

Наблюденія показали, что наибольшей своей величины коса достигаеть въ то время, когда комета находится около перигелія и при томъ вскорѣ послѣ его прохожденія. Затѣмъ, по мѣрѣ удаленія кометы отъ Солнца, она постепенно блекнетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ и ея коса.

Воть въ общихъ чертахъ описаніе кометной косы; при болъ тщательномъ наблюденіи раскрываются многія подробности, имъющія существенное значеніе въ дълъ изученія природы кометь.

При появлении своемъ комета имъетъ видъ круглой туманности. Какъ извъстно, шаровую форму принимають капельно-жидкія и газообразныя тела подъ взаимодействіемъ однёхъ только внутреннихъ, частичныхъ силъ. Если, напримъръ, жидкое тъло предоставить самому себъ, т. е. устранить всъ внъшнія постороннія силы, то оно принимаеть форму шара, капли. Въ этомъ весьма легко и наглядно убъдиться, если въ растворъ спирта съ водою или обыкновенную водку опустить немного прованскаго масла: при одинаковомъ удъльномъ въсъ масла и водки, опущенное масло приметъ форму шара. Въ этомъ опытъ растворъ играетъ роль компенсатора силы тяжести. Въ самомъ дълъ, капля, опущенная въ растворъ, не падаеть внизь, следовательно сила тяжести устранена; капля не поднимается вверхъ, потому что объемъ раствора, вытёсненный масляной каплей, въсить столько же, сколько и сама капля; итакъ, всъ постороннія силы устранены, и капля принимаеть шаровую форму. Такую же форму шара принимаеть собраніе твердыхъ частицъ, находящихся подъ дъйствіемъ одного взаимнаго тяготънія.

Очевидно, что если комета, при появленіи своемъ, представляется намъ въ видѣ круглой туманности, то, значить, она находится подъ взаимодѣйствіемъ однѣхъ только внутреннихъ силъ. Круглая форма кометы, однако, скоро исчезаеть и замѣняется другою, нѣсколько вытянутою по направленію къ Солнцу: ко взаимнымъ частичнымъ силамъ прибавилась какая-то другая, новая сила, при существованіи которой нарушается равновѣсіе, и прежняя шарообразная форма измѣняется въ нѣсколько продолговатую. Эта сила есть тяготѣніе къ Солнцу: ближайшія къ нему частицы движутся быстрѣе и уходятъ впередъ, а отдаленнѣйшія отстають.

Затъмъ замъчается, что изъ ядра кометы выдъляется тонкая свътовая полоска. Между тъмъ комета, приближаясь къ Солнцу, становится все ярче и ярче, но свътовая полоска, выдълившаяся отъ кометы, постепенно расширяется. Ядро кометы становится рельефнъе и ръзче выдъляется яркостью своего свъта отъ окружающей менъе яркой атмосферы. Все вмъстъ имъетъ видъ, какъ будто изъ кометы вытекаетъ какое-то вещество въ сторону Солнца. Мало-по-малу полоска расширяется и поворачиваетъ въ сторону, противоположную Солнцу, обхватывая ядро со всъхъ сторонъ, образуя собою косу кометы. Внутри коса можетъ быть паполнена сравнительно меньшимъ ко-

личествомъ вещества, и мы замѣчаемъ тогда внутри ея темную полость.

Разсмотримъ подробно голову кометы и отдъленіе отъ нея косы. Мы замъчаемъ, что вещество, вытекающее изъ кометнаго ядра, пронизываетъ атмосферу кометы, не нарушая ея равновъсія. Это явленіе ясно указываетъ на то, что вытекающее вещество какое-то



Рис. 44. Косы кометы Донати 1858 г.

особенное, могущее пронизывать густую атмосферу, не встръчая большого сопротивленія, или же оно то же самое, что и остальное вещество кометы, но находится въ какомъ-то особенномъ физическомъ состояніи, вслъдствіе котораго дальнъйшее пребываніе его въ средъ кометы невозможно. Что справедливо, —то или другое, —мы опредъленно сказать не можемъ, но склоняемся ко второму предположенію, такъ какъ

оно не требуеть особаго вещества, а лишь особаго состоянія того же самаго вещества. Впосл'єдствіи увидимь, что образованіе кометнаго вещества (хвостовой матеріи) зависить оть Солнца; очевидно, туть мы им'ємь д'єло сь веществомь, находящимся въ особыхъ условіяхъ. Иногда зам'єчается прерывающееся отд'єленіе вещества оть ядра кометы, такъ что одновременно отд'єлившіяся частицы образують собою отд'єльные параболоиды, которые прекрасно видны были у кометы 1858 г. Мы цом'єщаемь на особомъ лист'є (стр. 241) изображеніе головы этой кометы.

Выдъление вещества изъ ядра кометы замъчается только съ приближениемъ кометы къ Солнцу. При удалении ея, коса, а слъдовательно и самое истечение вещества прекращаются. Это явление позволяетъ намъ сдълать заключение, что сила, приводящая кометное вещество въ особенное состояние, кроется въ Солнцъ. Разборъ всъхъ другихъ явлений образования и развития хвоста вполнъ подтверждаетъ это предположение.

Отдёлившись отъ ядра, частицы всецёло подвергаются сильному дёйствію солнечныхъ лучей, которые и приводять вещество въ состояніе, благопріятное для образоваіня косы. Подъ дёйствіемъ солнечныхъ лучей, скорость отдёлившихся частицъ постепенно уменьшается; по прошествіи нёкотораго времени он'в совсёмъ останавливаются и затёмъ принимають движеніе обратное, т. е. по направленію отъ Солнца, которымъ он'в отталкиваются.

Прослѣдимъ теперь за частицами, перешедшими въ косу кометы, и посмотримъ сначала, что мы знаемъ изъ наблюденій, а затѣмъ постараемся объяснить ихъ

происхождение теоретически, на основании допущенной гипотезы солнечнаго вліянія.

Изложенное выше отдёленіе вещества отъ ядра общее для всёхъ кометь. Наблюденія приводять насъ къ заключенію, что въ устройств'я кометныхъ косъ можно подм'ятить н'якоторые общіе законы.

Общіе признаки, принадлежащіе косамъ всѣхъ кометь, суть слѣдующіе:

- 1) Косы всегда лежать въ плоскости кометныхъ орбитъ.
- 2) Косы всегда лежать во внѣшней части орбиты, т. е. всегда направлены въ сторону, противоположную Солнцу.
- 3) Косы кометь всегда направлены своею выпуклостью въ сторону движенія кометы.

Какъ извъстно, всъ кометы обращаются вокругъ Солнца въ плоскостяхъ, проходящихъ черезъ центръ Солнца; а такъ какъ косы лежатъ въ плоскости кометныхъ орбитъ, то плоскость, проходящая черезъ косу нъкоторой кометы, проходитъ черезъ Солнце.

Второй признакъ заключается въ томъ, что коса всегда находится внѣ орбиты и никогда не заходитъ внутрь. Представьте себѣ вытянутый эллипсъ, описанный около Солнца. Все пространство между орбитой и Солнцемъ называется внутреннимъ относительно орбиты, а все остальное пространство—внѣшнимъ: косы кометъ находятся всегда во внѣшнемъ пространствъ.

Наконецъ, третій признакъ заключается въ томъ, что косы всегда откинуты назадъ, какъ дымъ паровоза въ тихую погоду; вслъдствіе этого косы всегда на-

правлены своею выпуклостью въ сторону движенія кометы.

Эти признаки, какъ мы сказали, —общи всёмъ кометамъ; они провёрены надъ многими кометами.

Какіе же можно сдёлать выводы и заключенія изъ этихъ явленій?

Разберемъ этотъ вопросъ.

Если косы кометь происходять отъ действія какой-нибудь причины или силы (безпричиннаго ихъ существованія мы не можемъ допустить), то гдъ должна находиться эта сила? Косы, какъ мы замътили, всегда находятся въ плоскости орбиты кометы; очевидно, что и сила, ихъ производящая, должна находиться въ этой же плоскости. Допустите противное, и вы убъдитесь въ его невозможности; въ самомъ дёлё, положимъ, что сила, производящая косы кометь, лежить не въ плоскости кометной орбиты, а внъ ея; въ такомъ случат, и сила, направленная къ частицамъ кометнаго вещества, не лежитъ въ плоскости орбить; вследствие этого и коса, происходящая отъ разсматриваемой силы, не будеть совпадать съ этой плоскостью, а будеть лежать внв ся. Но такъ какъ наблюденія намъ показывають, что косы лежать въ плоскости кометной орбиты, то мы должны заключить, что и сила, ихъ производящая, должна лежать въ той же плоскости.

Спрашивается теперь, въ какой точкъ пребываеть эта сила? Гдъ она можеть находиться и гдъ она дъйствительно находится?

На этотъ вопросъ отвътить не трудно.

Мы знаемъ, что сила, производящая косу каждой

кометы, находится въ плоскости орбиты той же кометы. Въ то же самое время мы знаемъ, что всю плоскости кометныхъ орбитъ проходятъ черезъ центръ Солнца и всё въ немъ пересъкаются. Центръ Солнца—это единственная въ пространствъ точка, которая лежитъ въ плоскостяхъ всъхъ кометныхъ орбитъ. Слъдовательно, сила, производящая косы, можетъ находиться только въ центръ Солнца: въ немъ она дъйствительно и находится.

Итакъ, простыми умозаключеніями мы опредълили мѣсто, гдѣ пребываетъ интересующая насъ сила. Солнце служитъ источникомъ двоякаго рода силы: подъ дѣйствіемъ одной изъ нихъ кометное ядро слѣдуетъ движенію по общимъ законамъ тяготѣнія, а подъ дѣйствіемъ другой—образуются и развиваются чудесныя косы кометъ.

Пойдемъ далѣе.—Какого рода вторая сила, производящая косы кометъ? Очевидно, отталкивательная, или вообще сила меньшаго напряженія, чѣмъ притягательная сила Солнца. Въ самомъ дѣлѣ, если бы она была притягательная, и при томъ такая же, какъ и обыкновенная сила притяженія, то не было бы причины образоваться косѣ: всѣ частицы косы двигались бы такъ же точно, какъ и ядро. Если бы она была притягательная, но бо́льшаго напряженія, чѣмъ обыкновенная Ньютоніанская сила тяготѣнія, то частицы хвостовой матеріи приближались бы къ Солнцу болѣе, чѣмъ ядро кометы, а не удалялись отъ него. Поэтому, сила, подъ вліяніемъ которой образуются косы, есть отталкивательная сила.

О происхождении этой силы намъ уяснилъ проф.

П. Н. Лебелевъ. Сила тяготънія—это присущее свойство матеріи; но рядомъ съ нею существують другія силы, зависящія отъ особенныхъ свойствъ вещества. Напримъръ, сила электричества, магнетизма и проч. Очевидно, и тутъ проявляется особая сила, зависящая отъ состоянія хвостовой матеріи: назовемъ ее кометною. О кометной силъ мы можемъ сдълать слъдующія предположенія: такъ какъ она отличается отъ силы тяготънія и исходить все-таки отъ Солнца, то, по всей въроятности, посредствующимъ факторомъ служать лучи свъта, падающіе на комету; отъ нагръванія нъкоторая часть вещества приходить въ газообразное состояніе, а затъмъ отталкивается отъ Солнца давленіемъ его лучей.

Вещество, изъ котораго образуется коса, отдъляется изъ кометнаго ядра. Если бы этого не было, то хвостовое вещество, не отдъляясь отъ ядра, не вытекая, такъ сказать, изъ него, образовало бы, подъ дъйствіемъ какихъ бы то ни было силъ, болѣе или менѣе правильную форму и во всякомъ случат симметричную относительно радіуса-вектора кометы, т. е. относительно линіи, соединяющей Солнце съ кометой, по которой и направлены всё силы, исходящія отъ Солнда. Кром'в того, фигура косы была бы замкнутая. Въ дъйствительности же косы представляють намъ совершенно иное. Онъ всегда направлены въ одну сторону и расположены несимметрично относительно радіуса-вектора кометы; далье, форма косы не замкнутая, а безконечная, разомкнутая: узкая у головы и все болже расширяющаяся въ противоположную сто-DOHY.

Само собою разумѣется, что иначе и быть не можеть. Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что вещество косы отдѣляется отъ ядра и отталкивается отъ Солнца. Каждая частица, отталкиваемая Солнцемъ, движется по самостоятельной орбитѣ, вполнѣ отличной отъ кометной. О замкнутости косы ие можетъ быть и рѣчи, и наблюденія вполнѣ подтверждаютъ это заключеніе.

Мы можемъ составить также нъкоторое понятіе и о плотности вещества косы. Оно, несомивнио, должно быть весьма разр'вженно и несравненно меньше по своей массъ, чъмъ кометное ядро. Дъйствительно, вещество, образующее громадивний косы, не производить никакихъ видимыхъ возмущеній въ движеніи кометнаго ядра. Можеть ли это быть въ томъ случав если плотность косы значительная? Конечно, нътъ, и небольшой расчеть можеть нась убъдить, что разръжение этого вещества неимовърное и для насъ непостижимое. Непосредственныя наблюденія уб'єждають насъ въ томъ же. Мы знаемъ, что вещество косы пронизываеть кометную атмосферу, не нарушая ея равновъсія; слъдовательно, пронизывающее вещество должно быть гораздо разряженнъе пронизываемаго. Что же касается до последняго, то оно должно быть также въ необычайно разръженномъ состоянии. Кометы, находясь къ Землъ ближе, чъмъ неподвижныя звъзды, закрывають ихъ иногда; наблюденія показывають, что не только черезъ косу, но и черезъ ядро кометы проходять лучи мельчайщихъ звъздъ, нисколько, повидимому, не ослабъвая.

Посмотримъ теперь, какія слѣдствія можно выс. п. глазенапъ.

вести изъ допущенной гипотезы, что вещество косы, подъ дъйствіемъ отталкивательной силы, вытекаеть изъ кометы.

Первое необходимое слъдствіе допущенной гипотезы заключается въ слъдующемъ: если коса состоитъ изъ вещества, вытекающаго изъ кометы, то, какъ бы ничтожно оно ни было, масса кометы должна непремънно уменьшаться. Уменьшение косы кометы должно проявиться въ уменьшеніи ея яркости и величины, и если бы мы могли видъть кометы черезъ большіе промежутки времени, то замътили бы уменьшение ихъ яркости и величины. Мы имфемъ возможность провфрить эту гипотезу надъ періодическими кометами, совершающими свое обращение вокругъ Солнца по эллипсамъ. Эти кометы возвращаются къ Солнцу черезъ правильные промежутки времени, и въ ближайшемъ своемъ разстояніи отъ него становятся видимыми. Если масса кометь не измёняется, то и яркость ихъ остается постоянною. Наобороть, если масса кометь непрерывно уменьшается, то и яркость ихъ будеть уменьшаться, и при каждомъ появленіи періодическихъ кометь онъ будуть казаться намъ менъе яркими. Въ первомъ случав, допущенная гипотеза не оправдается наблюденіями, во второмъ же случав вполнъ ими оправдается. Наблюденія, дъйствительно, показали намъ, что яркость нъкоторыхъ періодическихъ кометъ съ каждымъ появленіемъ ихъ постоянно уменьшается. Такъ, напримъръ, комета Энке, имъющая весьма малый періодъ обращенія, въ 3 года и 110 дней, была въ началъ прошлаго столътія довольно яркою кометою, съ ясно выраженною косою и ядромъ. Еще во время появленія въ 1872 году она могла быть видима просто глазомъ въ теченіе двухъ дней, при весьма чистомъ и безлунномъ небѣ. Въ настоящее же время она слабая телескопическая. То же самое можно сказать и о знаменитой Галлеевой кометѣ. Она совершаетъ свое обращеніе около Солнца въ 76<sup>1</sup>/з лѣтъ. Ее наблюдали много разъ, но при послъднихъ своихъ появленіяхъ она была не такъ ярка, и коса ея была далеко не такъ пышна, какъ при прежнихъ ея появленіяхъ, описанныхъ Аппіаномъ, Кеплеромъ и Лонгомонтаномъ; въ особенности она была слаба въ своемъ появленіи 1909—1910 гг. Слъдовательно, въ данномъ случаѣ мы замѣчаемъ подтвержденіе допущенной гипотезы.

Наконецъ, подтвержденіе гипотезы мы можемъ видѣть также и въ томъ, что нѣкоторыя періодическія кометы исчезли: онѣ болѣе невидимы. Мы уже имѣли случай познакомиться съ подобными кометами. Хотя, само собою разумѣется, эти кометы могли исчезнуть и отъ другихъ причинъ, напримѣръ, отъ измѣненія вида орбиты, вслѣдствіе сильнаго вліянія большихъ планетъ, но самый фактъ исчезновенія не противорѣчитъ нашей гипотезѣ, а напротивъ, служитъ ей подтвержденіемъ въ томъ случаѣ, когда исчезновеніе кометы произошло не отъ измѣненія ея орбиты.

Итакъ, гипотеза истеченія вещества изъ кометнаго ядра для образованія косы подтверждается не только наблюденіями, произведенными надъ косами кометь, но и другими наблюденіями надъ измѣненіемъ яркости періодическихъ кометь.

Второе слъдствіе будеть слъдующее: если веще-

ство дъйствительно вытекаетъ изъ ядра, то мы можемъ это замътить непосредственно. И дъйствительно, наблюдая голову кометы, мы замічаемь, что изъ ядра ея выдъляется свътлая, иногда даже весьма яркая полоска, направленная въ сторону Солнца; но мъръ удаленія отъ ядра она расширяется и какъ бы разливается во всё стороны, охватывая голову и образуя косу. Очевидно, что эта полоска ни что иное, какъ яркое, отдъляющееся отъ ядра кометы, вещество. Далье, иногда замъчается, что это вещество, разлившись вокругъ ядра по поверхности шара, неодинаково свътится во всъхъ своихъ частяхъ, такъ что легко различаются нъсколько шаровыхъ поверхностей различной яркости. Эти поверхности перемъщаются, удаляясь отъ ядра или центра кометы, и принимаютъ постепенно форму параболоидовъ.

Такимъ образомъ, допущенная и изложенная въ предыдущихъ строкахъ гипотеза вполнъ подтверждается непосредственными наблюденіями.

Древніе отличали различнаго рода кометы по ихъ косамъ. Эти отличія носили много субъективности и могли служить скорѣе выраженіемъ состоянія умовъ, чѣмъ научныхъ изслѣдованій. Мы, напримѣръ, встрѣчаемъ кометы, изображенныя въ видѣ меча, копья, иламени, горящей лампады, въ видѣ головы барса съ длиннымъ пушистымъ хвостомъ, въ видѣ пылающаго сердца и проч. Плиній насчитываетъ двѣнадцать различныхъ типовъ косъ кометъ. Но, какъ сказано, въ подобномъ подраздѣленіи кометъ на типы кроется много субъективнаго.

Въ настоящее время косы также дълятся на типы,

но д'вленіе это основано на иныхъ началахъ. Д'вло въ томъ, что наблюденіе надъ косами показало, что у различныхъ кометъ, кром'в общихъ признаковъ, приведенныхъ нами въ предыдущей глав'в, существуютъ особенные, выражающіеся въ большей или меньшей кривизн'в косы.

Косы перваго типа менѣе искривлены и всего болье приближаются къ радіусу-вектору кометы, т. е. къ линіи, соединяющей комету съ Солнцемъ; эти косы представляются намъ въ большинствъ случаевъ въ видѣ прямыхъ линій, направленныхъ прямо отъ Солнпа.

Косы второго типа нѣсколько болѣе искривлены и болѣе удаляются отъ радіуса-вектора сравнительно съ косою перваго типа. Иногда эти косы представляются сложными, состоящими изъ нѣсколькихъ коноидовъ,—въ видѣ распахнутаго вѣера.

Наконецъ, косы третьяго типа имѣютъ наибольшую кривизну и всего болѣе удалены отъ радіуса-вектора кометы. Косы этого типа бываютъ также сложными, но въ нихъ незамѣтно яснаго отдѣленія коноидовъ другъ отъ друга: они всѣ какъ бы слились и образуютъ сплошной непрерывный вѣеръ.

Опредёленіе истинной фигуры кометной косы дёло довольно трудное. Не слёдуеть забывать, что мы видимъ косу въ перспективе, отъ которой надо перейти къ истиннымъ положенію, кривизнё и размёрамъ косы въ плоскости кометной орбиты. Эта работа выполнена съ необыкновеннымъ усердіемъ и достоинствомъ нашимъ знаменитымъ астрономомъ, бывшимъ директоромъ Московской Университетской Обсерваторіи, а затъмъ академикомъ Ө. А. Бредихинымъ. Въ теченіе тридцати пяти лъть онъ занимался изученіемъ кометныхъ косъ; болье сорока кометь подверглись его изслъдованію и тщательно имъ изучены. И всъ кометы блестящимъ образомъ подтвердили изложенное дъленіе косъ на три типа, ръзко отличающихся другь отъ друга.

Разсмотримъ причины, вслъдствіе которыхъ не у всъхъ кометъ косы имъютъ одну и ту же кривизну, почему вообще существуютъ типы и при томъ ихъ только три, а не больше. Эти вопросы возникаютъ сами собою, и отвътъ на нихъ будетъ вмъстъ съ тъмъ служить критическою оцънкою принятой гипотезы.

Мы видъли, что косы кометъ происходять отъ дъйствія отталкивательной силы Солнца на частицы кометной матеріи. Сила должна быть непремънно отталкивательная, или же меньше, чъмъ обыкновенная Ньютоніанская сила тяготінія, иначе коса была бы обращена во внутреннюю часть орбиты, а не во внѣшнюю. За всёмъ тёмъ, видъ косы кометы зависить отъ величины отталкивательной силы: каждой отталкивательной силь соотвытствуеть вполны опредыленный видъ косы. И не трудно убъдиться въ томъ, что чъмъ больше отталкивательная сила, тъмъ прямъе и длиннъе должна быть коса, и наоборотъ, чъмъ меньше отталкивательная сила, тъмъ болъе выгнута и короче она должна быть. Дъйствительно, при большой отталкивательной силь, частицы хвостовой матеріи удаляются отъ ядра съ большею скоростью и, следовательно, въ нъкоторый промежутокъ времени удалятся отъ кометнаго ядра на большее пространство, чъмъ




Рис. 45. Ө. А. Бредихинъ, профессоръ Московскаго Университета директоръ Пулковской обсерватори (1831—1904).

въ томъ случаъ, когда отталкивательная сила не велика; слъдовательно, большей отталкивательной силъ соотвътствуеть болье длинная и прямая коса.

Изъ ядра кометы вылетають частицы вещества, пришедшія въ особенное физическое состояніе, вследствіе котораго дальнъйшее ихъ пребываніе въ ядръ невозможно. Что за причина тому, пока не будемъ разсматривать. Мы имъемъ только данныя предполагать, что изменение физического состояния частиць, вытекающихъ изъ ядра, произошло отъ действія Солнца, такъ какъ только съ приближениемъ кометы къ Солнцу замъчается подобное явленіе. Вылетъвъ изъ ядра, частицы всецвло подвергаются сильному дъйствію солнечныхъ лучей, вслъдствіе чего происходить перемёна движенія частиць. Скорость ихъ, пріобрѣтенная при отдѣленіи отъ кометнаго ядра, постепенно уменьшается, уничтожается, и частицы начинають двигаться по гипербол' подъ действіемь отталкивательной силы, которая для косъ различныхъ типовъ имфетъ различное значеніе. Частицы, отдфлившіяся въ следующій моменть, опишуть подобнымъ же образомъ гиперболу, но такъ какъ въ это время комета усибеть перемъститься въ своей орбитъ, то гиперболы, которыя описываются частицами хвостовой матеріи, отдулившимися отъ ядра въ послудовательные моменты, не будуть совпадать между собою: онъ будуть лежать рядомъ, занимая другое положение и отличаясь своею формою. То же самое проивойдеть съ частицами, отдълившимися въ третій, четвертый и т. д. моменты. Частицы вытянутся въ нъкоторую линію, и ихъ совокупность образуеть косу кометы. Такъ какъ частицы движутся подъ дъйствіемъ отталкивательной силы, то коса всъми своими частями лежить во внъшней части орбиты, а не во внутренней.

По своему существу, притягательныя и отталкивательныя силы отличаются одна отъ другой только величиной и направленіемъ; если онъ по величинъ своей равны, то отличаются только направленіемъ. Но и то и другое проявляется прямо пропорціонально массъ и обратно пропорціонально квадратамъ взаимныхъ разстояній.

Каждой отталкивательной силъ соотвътствуетъ особая форма косы; обратно, каждой форм в косы соотвътствуетъ вполнъ опредъленная величина отталкивательной силы. Такимъ образомъ, по данной формъ косы, или по данному типу ея, можно судить о той отталкивательной силь, которая оживляеть частицы хвостовой матеріи. Для всёхъ кометь, изследованныхъ Бредихинымъ, онъ опредёлилъ величину отталкивательной силы и замётиль въ высшей степени выдающійся факть, именно, что каждому изъ трехъ типовъ кометныхъ косъ соотвътствуетъ вполнъ опредъленная отталкивательная сила, или, говоря другими словами, косы всёхъ кометь образовались отъ действія только трехъ родовъ отталкивательныхъ силъ, которыя и выражены Бредихинымъ численно. Силы эти измѣняются не непрерывно, а скачками. Выразимъ и мы эти силы въ числахъ.

Выше мы доказали, что сила, производящая косы, должна быть отталкивательная сравнительно съ Ньютоніанскою, т. е. или абсолютно отталкивательная,

или же уменьшенная Ньютоніанская. Подъ именемъ Ньютоніанской силы мы понимаемъ ту, которая проявляется между тълами нашей Солнечной системы и опрелъляется нами тъмъ, что единица массы притягиваеть другую массу, отстоящую отъ нея на разстояніи, равномъ единицъ, съ силою, принимаемою нами за единицу. Сила эта обратно пропорціональна квадрату разстоянія и можеть быть выражена черезъ единицу, раздъленную на r<sup>2</sup>, гдъ r и есть разстояніе между тягот вющими твлами; она пишется такимъ образомъ:  $\frac{1}{r^2}$ . Если же сила, происходящая отъ дъйствія массы на единицу разстоянія, меньше единицы, или равна нулю, или же отталкивательная, то силы подобнаго рода можно представить общею формулою:  $\frac{1-\mu}{r^2}$ , гдъ качество силы зависить отъ значенія и величины и. Легко видъть, что если и равно нулю, то разсматриваемая сила есть Ньютоніанская; если и величина положительная, но меньше единицы, т. е. правильная дробь, то 1- и будеть величиною тоже положительною и меньше единицы: въ этомъ случать разсматриваемая сила слабъе Ньютоніанской. Если и приметь значение единицы, то 1- д сделается нулемь, и никакой силы проявляться не будеть. Наконець, если и имъетъ значение больше единицы, то 1-и есть величина отрицательная, и соотвътствующая сила принадлежить къ отталкивательнымъ. Итакъ, отъ значенія и величины и зависить качество силы.

Ө. Бредихинъ, изучивъ форму косъ для многихъ кометь, нашелъ, что силы, соотвътствующія формъ

косъ, распадаются на три группы, ръзко отдъляющіяся одна отъ другой. Каждой группъ соотвътствують совершенно особенныя характерныя значенія, а именно слъдующія:

для косъ І-го типа 
$$\mu=17,5$$
 » » II-го »  $\mu=1,1$  » » III-го »  $\mu<0,3$ 

Косъ, имъющихъ промежуточную форму, между этими типами, не встръчается.

Сравнивая между собою приведенныя значенія  $\mu$ , мы замівчаємь, что  $\mu$  перваго типа далеко отстоить оть  $\mu$  второго и третьяго типовь. Воть причина, почему косы перваго типа являются всегда особнякомь и різко отділяются оть кось остальныхь двухь типовь. Для первыхь мы имівемь отталкивательную силу, которая въ 17,5 разь больше Ньютоніанской силы тяготівнія, и вслідствіе этого каждая частица хвостовой матеріи движется по гиперболів,—по выпуклой вітви ея.

Для косъ второго типа µ равна 1,1. Возьмемъ для µ округленное значеніе, равное единицъ, и посмотримъ, какъ образуется хвость для даннаго значенія µ.

Если μ=1, то разность 1—р равна нулю, й Ньютоніанская сила какъ бы уничтожена, т. е. обыкновенная сила солнечнаго притяженія парализована отталкивательной силой того же Солнца. При такомъ значеніи 1—μ, каждая частица хвостовой матеріи, отдѣлившись отъ ядра, движется по инерціи, а, какъ извѣстно, подобное движеніе совершается по касательной къ орбитѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ частица отдѣ-

лилась отъ ядра, и съ тою скоростью, которую имѣла комета въ этотъ моментъ. Отдѣлившіяся частицы и здѣсь вытянуты въ нѣкоторую линію, образуя собою косу кометы. Какой же видъ будетъ имѣть эта коса? Извѣстно, что до перигелія абсолютная скорость кометы увеличивается, а послѣ прохожденія черезъ перигелій—уменьшается. Вслѣдствіе этого до перигелія комета опережаетъ отдѣлившіяся частицы хвостовой матеріи, и относительно кометы коса будетъ лежать по другую сторону Солнца; послѣ же прохожденія кометы черезъ перигелій, когда скорость убываетъ, ядро кометы отстаетъ отъ отдѣляющихся постепенно частицъ хвостовой матеріи: послѣднія будутъ идти впереди кометы и также находиться въ противоположной сторонѣ относительно Солнца.

Намъ остается еще разсмотръть третій типъ косъ, для которыхъ р меньше 0,3. Въ данномъ случат р приблизительно равняется 0,7, и следовательно Ньютоніанская сила тяготфнія какъ бы нфсколько ослаблена. Косы этого типа будуть искривлены болже, чемь косы второго типа, и более приближаться къ кометной орбитъ. До прохожденія кометы черезъ. перигелій отдёлившіяся частицы кометнаго вещества будуть отставать отъ ядра, ибо онъ менъе притягиваются, чёмъ ядро; по той же самой причине оне никогда не переходять во внутреннюю часть орбиты, а всегда лежать во внешней части ея. Частицы вытянутся въ искривленную косу. Послъ прохожденія кометы черезъ перигелій, отділившіяся частицы кометнаго вещества будуть опережать комету по той же причинъ, какъ и частицы косъ I и II типовъ; и эти косы всегда лежать въ сторонъ, противоположной Солнцу.

У нѣкоторыхъ кометъ наблюдались косы только одного типа, у другихъ же двухъ типовъ, а у нѣкоторыхъ— всѣхъ трехъ. Наблюдались также и такіе случаи, что вначалѣ комета обладала косою одного типа, а затѣмъ другого.

Типы, вычисленные для нъкоторой воображаемой кометы, имъютъ видъ, изображенный на рисункъ 46.

Прекрасную косу І-го типа имѣла большая комета 1811 года. Коса была длинная, прямая, безъ замѣтной для глаза кривизны 1). Ольберсъ видѣлъ слѣды косы ІІ-го типа, но очень слабые.

Большая комета 1858 г., открытая Донати <sup>2</sup>), имѣла двѣ косы: І и II типовъ (рис. 44). Коса І-го типа




Рис. 46. Типы кометныхъ косъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) О кометѣ 1811 года см. мою книгу «Друзьямъ и Любителямъ Астрономіи».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же.

была двойная; она состояла изъ двухъ блестящихъ полосокъ. Въ дъйствительности это была одна коса, оба края которой блистали сильнъе, чъмъ середина. Коса кометы представляетъ собою полый коноидъ, оболочка котораго состоитъ изъ свътящагося кометнаго вещества.

Коса II-го типа у кометы Донати была раскошная; она разстилалась по всему небу, и ею любовались въ теченіе трехъ мъсяцевъ; въ особенности она была красива въ началъ октября.

Вторая комета 1861 года, кром'є огромной св'єтлой косы, им'єла другую, бол'є отставшую и бол'є изогнутую короткую косу; она была ІІІ-го типа.

Наконецъ, замъчательная комета 1744 года, описанная Шезо, имъла сложную косу въ видъ въера.

Наблюдая комету 8 и 9 марта 1744 года въ то время, когда голова кометы была уже подъ горизонтомъ, Шезо видълъ пять большихъ косъ. Косы состояли изъ бъловатыхъ лучей, поднимавшихся вверхъ, и имъвшихъ видъ распахнутаго въера. Каждый лучъ состояль изъ трехъ полосъ: средняя была темнъе и шире крайнихъ; промежутки между лучами были темные, какъ остальное небо. Кромъ описанныхъ пяти косъ была еще шестая, болъе короткая, находившаяся ближе къ горизонту; темной полосы не было замътно (см. стр. 167).

Большая комета 1901 года, тщательно изученная Бредихинымъ <sup>1</sup>), имѣла въ различное время косы

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Изв'ястія Импер. Академіи Наукъ, т. XV, 1901, стр. 451. См. также мою книгу «Друзьями и Любителями Астрономіи», стр. 358.

всѣхъ трехъ типовъ. При этомъ сначала была коса І-го типа, затѣмъ появилась коса ІІ-го типа исчезла, а появилась коса ІІІ-го типа.

Съ примѣненіемъ фотографіи къ изученію кометныхъ косъ удалось наблюдать въ нихъ любопытные переломы и искривленія. Комета Морхачза (рис. 47) имѣла изломанную косу. Головная часть составляетъ косу І-го типа, а отдаленная (верхняя) — косу ІІ типа. Мы вернемся на слѣ-




Рис. 47. Изломанная коса кометы 1908 г. Морхауза, по фотографіи Бернерда.


дующихъ страницахъ къ уясненію этого замъчательнаго случая.

## 16. Образование косъ кометъ.

Вопросъ объ образовании кометныхъ косъ древите вопроса о тяготънии; еще Кеплеръ высказалъ въ 1608 г. предположение, что косы кометъ состоятъ изъ испарений вещества кометной головы, что эти испарения движутся независимо отъ головы, и что они не притягиваются, а отталкиваются Солнцемъ.

Такимъ образомъ Кеплеръ объяснялъ происхождение кометныхъ косъ; причина ихъ образования лежить въ солнечныхъ лучахъ, отталкивающихъ кометное вещество отъ головы кометы. Въ главныхъ чертахъ гипотеза, высказанная Кеплеромъ, остается справедливою и въ настоящее время.

Въ предыдущей главъ, разбирая типы кометныхъ косъ, мы обратили вниманіе на явленіе отдъленія кометнаго вещества отъ ядра кометы и на существованіе отталкивательной силы, исходящей отъ Солнца. Разсмотримъ ближе причину образованія кометныхъ косъ; постараемся уяснить, почему вещество кометныхъ косъ, которое для простоты мы называемъ кометнымъ веществомъ, отдъляется отъ ядра, и почему оно затъмъ отталкивается Солнцемъ.



V. Голова кометы Донати 1858 г.

Мы знаемъ, что комета состоить изъ собранія множества твердыхъ частицъ, не соприкасающихся одна съ другой и образующихъ въ силу взаимнаго тяготънія обособленное свътило. Масса твердыхъ частицъ такъ мала, что вокругъ нихъ не можетъ быть атмосферы. Если бы атмосфера и появилась, то она отлетъла бы въ небесное пространство, какъ отлетъла




Рис. 48. Движеніе кометнаго вещества по направленію къ Солнцу.

атмосфера отъ нашего спутника—Луны, и, въроятно, отъ всъхъ спутниковъ иланетъ Солнечной системы.

По мъръ приближенія кометы къ Солнцу частицы подвергаются нагръванію солнечныхъ лучей. За отсутствіемъ атмосферы, нагръваніе должно быть весьма значительное. Подобное явленіе мы замъчаемъ на высокихъ горахъ, гдъ воздухъ разръженный и прозрачный, вслъдствіе чего свътовые и тепловые лучи

Солнпа мало поглощаются атмосферою и сильно освъщають и нагръвають горные склоны. Подъ дъйствіемъ солнечныхъ лучей твердое вещество, составляющее частицы кометнаго ядра, нагръвается и частью испаряется; изъ твердаго состоянія оно прямо переходить въ газообразное. Нагръвается, конечно, та сторона частицъ, которая обращена къ Солнцу, и въ его же отдъляется образовавшееся газообразное вещество. Такимъ образомъ газообразныя отдъленія прежде всего направляются къ Солнцу. Подобное движеніе кометнаго вещества по направленію къ Солнцу мы видимъ у всвхъ кометъ, имфющихъ косы. Мы приводимъ здъсь рисунки (рис. 48) кометы 1862 III. исполненные итальянскимъ астрономомъ Скіапарелли (Osservazioni astronomiche e fisiche sulla grande cometa del 1862 III. G. V. Schiaparelli. Publicazioni del Real Osservatorio de Brera in Milano. Nº 2. 1873).

Прошло то время, когда свътовой эниръ принимался за вещество воображаемое, не имънщее никакихъ физическихъ или химическихъ свойствъ, присущихъ всъмъ земнымъ элементамъ; эниръ представлялся какъ тъло невъсомое. Теперь свътовой эниръ признается какъ тъло вещественное, имънщее свойства въсомыхъ тълъ. Д. Менделъевъ изложилъ въ своей замъчательной брошноръ «Попытка химическаго пониманія свътового энира» свой взглядъ на этотъ вопросъ и вычислилъ предълъ, выше котораго не можетъ быть плотность свътоваго энира, и такимъ образомъ придалъвопросу о свойствахъ энира реальное значеніе.

Свътовая волна, представляющая движение вещественныхъ частиць, ударяясь о нъкоторый предметь,




Рис. 49. Профессоръ Московскаго Университета П. Н. Лебедевъ.

должна неминуемо произвести на него давленіе, оттолкнуть его оть источника севта. По изследованніямь профессора П. Н. Лебедева, для всёхъ шаровыхъ тёль, діаметрь которыхь больше двухь метровь и плотность которыхъ больше единицы, отталкивательная сила, вызываемая ударами световыхъ волнъ о предметь, лежить за предълами, доступными для измъренія 1). Что касается до тълъ меньшихъ размъровъ и меньшей плотности, въ особенности для разръженныхъ газовъ, то разсматриваемая отталкивательная сила имъетъ замътную величину и можетъ достигать большихъ значеній. Величина отталкивательной силы зависить оть строенія газообразнаго вещества: чъмъ меньше атомный въсъ газа, тъмъ значительнъе отталкивательная сила, и, — наобороть, — чъмъ больше атомный въсь газа, темъ меньше отталкивательная сила. Но помимо зависимости отталкивательной силы оть атомнаго въса газа, она еще зависить оть строенія молекулъ даннаго газа.

Что касается до отталкивательной силы солнечных лучей, упадающих на твердыя тёла, то она зависить отъ діаметра послёднихъ: чёмъ меньше послёдній, тёмъ больше отталкивательная сила.

Вернемся къ разсмотрѣнію дальнѣйшаго движенія отдѣлившагося оть ядра кометы вещества; оно, какъ мы знаемъ, имѣетъ видъ свѣтовой полоски, направленной къ Солнцу. Тотчасъ послѣ отдѣленія его отъ ядра кометы, оно подвергается дѣйствію солнечныхъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge, Band XLV, p. 294 n Vierte Folge, B. 32. p. 411.

лучей. Какъ мы только что видъли, солнечные лучи отталкивають его.

Вслъдствіе проявленія отталкивательной силы, кометное вещество замедляєть свое движеніе; оно задерживается солнечными лучами и черезъ нъкоторое время останавливается; послъ этого, будучи отталкиваемо лучами, оно измъняєть направленіе своего движенія и начинаеть двигаться отъ Солнца; изъ кометнаго вещества образуется коса, всегда направленная въ сторону, противоположную Солнцу. Порядокъ измъненія движенія кометнаго вещества и образованіе косы хорошо видны на особомъ рисункъ (стр. 241) головы кометы Донати 1858 г.

Нѣсколько свѣтовыхъ поверхностей, имѣющихъ своимъ центромъ ядро кометы, показываютъ, что кометное вещество отдѣляется вспышками. Явленіе происходитъ періодически: взрывы слѣдуютъ одинъ за другимъ черезъ нѣкоторые промежутки времени; каждой вспышкѣ соотвѣтствуетъ особая свѣтовая поверхность въ головѣ кометы.

По гипотезѣ Бредихина отталкивательная сила зависить отъ атомнаго вѣса газа, входящаго въ составъ кометнаго вещества, и при томъ обратно пропорціанальна этому вѣсу. Допустивъ эту гипотезу, мы можемъ вычислить отталкивательную силу для каждаго простого тѣла. Для этого выпишемъ въ таблицу всѣ простыя тѣла и расположимъ ихъ по порядку атомныхъ вѣсовъ, начиная съ легчайшихъ. Въ этой таблицѣ противъ каждаго элемента поставленъ атомный вѣсъ и затѣмъ вычисленное значеніе отталкивательной силы въ томъ пред-

положеніи, что водороду соотвѣтствуєть отталкивательная сила, равная  $17^1/_2$  единицамъ; это значитъ, что отталкивательная сила въ  $17^1/_2$  разъ больше силы тяготѣнія кометы къ Солнцу. Значенія отталкивательныхъ силъ вычислены согласно гипотезѣ Бредихина по формулѣ  $\mu = \frac{17 \cdot 5}{P}$ , гдѣ P есть атомный вѣсъ даннаго элемента  $^1$ ).

	Элементъ.		Атомный вѣсъ.	Отталкива- тельная сила.
H	Водородъ		. 1,0	17,5
He	Гелій		4,0	4,4
Li	Литій		7,0	$^{2,5}$
$\mathbf{Be}$	Бериллій		. 9,1	1,9
В	Боръ	, ,	. 11,0	1,6
$\mathbf{C}$	Углеродъ		. 12,0	1,5
$\mathbf{N}$	Азотъ		. 14,0	1,2
0	Кислородъ		. 16,0	1,1
${f F}$	Флоръ		. 19,0	0,9
Na	Натрій		. 23,0	0,8
Mg	Магній		24,4	0,8
Al	Алюминій		. 27,0	0,6
Si	Силицій		. 28,3	0,6
P	Фосфоръ		. 31,0	0,5
$\mathbf{s}$	Съра		. 32,0	0,5
Cl	Хлоръ		35,5	0,5
K	Калій		3 <b>9</b> ,1	0,5

<sup>1)</sup> Атомные вѣса элементовъ взяты мною изъ ежегодно издаваемой «Международной таблицы атомныхъ вѣсовъ» (Internationale Atomgewichte, 1910).

	Элементь.					Ā	Атомный въсъ.	Отталкива- тельная сила.
Ca	Кальцій.						40,1	0,4
$\mathbf{Cr}$	Хромъ .						52,0	0,3
Fe	Жельзо.						55,9	0,3
Ni	Никель.						58,7	0,3
Co	Кобальтъ						5 <b>9</b> ,0	6,0
$\mathbf{C}\mathbf{u}$	Мѣдь						63,6	0,3
							Болѣе.	Меньше.
(2)	$\Pi$ рочіе эл	ем	ен	ты		64	0,3	

Если принять, что косы І типа, какъ образующіяся подъ д'яйствіемъ наибольшей отталкивательной силы (17,5), состоять изъ легчайшаго газа водорода, то следующія затемь косы могуть состоять изъ гелія, литія и другихъ веществъ; образующая ихъ отталкивательная сила будетъ равна для гелія 4,4, а для литія и прочихъ тёлъ еще меньше. Мы видимъ, что между косами, образованными отталкивательными силами въ 17,5 и 4,4, никакой промежуточной косы не можеть быть, такъ какъ между водородомъ и геліемъ нътъ никакого тъла съ промежуточнымъ атомнымъ въсомъ. И дъйствительно, мы знаемъ, что косы I типа всегда стоятъ особнякомъ; онъ не сливаются съ косами другихъ типовъ; нътъ непрерывнаго перехода между косами I и II типа; косы I типа всегда отдёлены отъ косъ II типа промежуткомъ, никогда ничъмъ не занятымъ. Что же касается до косъ ІІ-го типа, то онъ могутъ состоять изъ нёсколькихъ пучковъ, содержащихъ гелій, литій, бериллій, боръ и углеродъ. Наконецъ, между косами II-го и III-го типовъ нѣтъ такого рѣзкаго отличія, какъ между касами I-го и II-го типовъ.

Если бы въ природѣ были тѣла съ атомными вѣсами въ 1,1, 1,2, 1,3 и т. д., то существовали бы всевозможные типы кометныхъ косъ, непрерывно измѣняющіяся отъ І до ІІ типа; но такъ какъ подобнаго измѣненія атомныхъ вѣсовъ нѣтъ, то очевидно, что между косами І и ІІ типовъ существуетъ пустота, никакимъ веществомъ не заполняемая.

Д. Менделъевъ, въ своей періодической системъ элементовъ, доказалъ, что атомные въса подчиняются извъстному періодическому закону; въ этой системъ нъть мъста тълу, атомный въсъ котораго лежалъ бы между водородомъ и геліемъ; отсюда мы выводимъ заключеніе, что между косами I и II типовъ не можетъ быть никакихъ косъ. Наблюденія вполнъ подтверждають этоть выводъ.

Лучшими примърами, оправдывающими изложенную гипотезу, тщательно разработанную  $\Theta$ . Бредихинымъ, могутъ служить кометы 1858 VI Донати и Шезо 1744 г.

Если коса II типа состоить изъ нѣсколькихъ пучковъ, то пучки, начиная слѣва, состоять изъ гелія, литія, бериллія, бора и углерода и сложныхъ веществъ, какъ-то углеводородовъ. По отношенію къ послѣднимъ веществамъ наблюденія вполнѣ подтверждаютъ приведенный выводъ; въ косахъ многихъ кометь спектральный анализъ указалъ присутствіе углеводорода.

Съ примѣненіемъ въ новѣйшее время самыхъ чувствительныхъ пластинокъ къ фотографированію ко-

меть и ихъ косъ, открыты явленія, указывающія на уклоненіе въ отдёльныхъ случаяхъ небесныхъ явленій отъ гипотезы, надъ которой такъ много трудился нашъ знаменитый ученый Ө. А. Бредихинъ.

Комета 1908 с, открытая Морхаузомъ 1 сентября въ обсерваторіи де-Муанъ (штать Айова Соед. Шт. Съв. Америки), представила удивительныя явленія въ своей косъ. Казавшаяся простою въ телескопъ, она на фотографическихъ пластинкахъ содержала цълый рядъ свътовыхъ пучковъ или струй; на одной изъ своихъ пластинокъ Вольфъ въ Кенигштулъ насчиталь 29 струй; изъ нихъ нѣкоторыя были параллельны между собою; другія же переплетались и придавали косъ винтовое строеніе. Но замъчательнъе всего, что каждая струя, при внимательномъ разсматриваній, въ свою очередь состояла изъ многихъ отдъльныхъ тонкихъ струекъ. Если принять согласно теоріи Бредихина, что каждый пучокъ или струя состоить изъ особаго вещества, то придется допустить, что въ кометъ Морхауза находится множество простыхъ или сложныхъ тёлъ, въ газообразномъ состояніи отталкиваемыхъ съ особою силою отъ Солнца. Нѣкоторыя струи такъ близко лежать одна отъ другой, что имъ соотвътствують мало различающіяся отталкивательныя силы, что указывало бы на пезначительное различие между атомными въсами. Подобнаго незначительнаго различія въ дъйствительности между простыми тёлами не существуеть. Поэтому приходится сдёлать заключеніе, что или въ комет'я Морхауза существують особыя тыла, намы неизвыстныя, или же косы кометы происходять иначе, чёмъ предполагаль Бредихинь. Комета Морхауза, а также и другія, указывають на особыя скорости кометнаго вещества, совершенно несогласныя съ теоріею.

На фотографіяхъ кометы Морхауза, полученныхъ Вольфомъ, замѣчено слѣдующее оригинальное явленіе: вблизи головы кометы кометное вещество двигалось, удаляясь отъ ядра въ сторону, противоположную Солнцу, со скоростью 17—20 километровъ въ секунду, а на разстояніи 4—5 милл. километровъ отъ ядра со скоростью 40—50 километровъ въ секунду 1). Увеличеніе скорости продолжалось и дальше, но уже не такъ быстро; на разстояніи 10 мил. километровъ скорость достигала 70 километровъ въ секунду. Всѣ эти скорости—среднія; въ отдѣльныхъ случаяхъ свѣтовыя облака, составлявшія косу кометы, двигались съ значительно большими скоростями, доходившими до 160 килом. въ секунду.

Кромѣ этихъ особенностей коса кометы Морхауза представила слѣдующее удивительное явленіе: на нѣкоторомъ разстояніи отъ ядра вспыхнуло какое-то облако, давшее весьма замѣтное расширеніе косѣ, и изъ него въ свою очередь отдѣлился цѣлый рядъ свѣтовыхъ струй; какъ будто произошла коса второго порядка. Явленіе это можно объяснить такимъ образомъ, что изъ ядра кометы отдѣлилась вмѣстѣ съ газообразнымъ веществомъ и часть твердыхъ частицъ, также оттолкнутыхъ давленіемъ солнечныхъ лучей; затѣмъ отдѣлившіяся частицы въ свою очередь на-

См. Русскій Астрономическій Календарь за 1910 годъ стр. 11. Приложеніе.

грѣлись Солнцемъ и выдѣлили газообразное вещество, которое и образовало второстепенную косу.

Большая комета 1901 года, наблюденная Лентомъ на Мысъ Доброй Надежды, обнаружила такія скорости движенія кометнаго вещества, которыя могли быть вызваны отталкивательною силою въ 77 разъбольше силы тяготънія 1).

Объ кометы убъждають нась, что образованіе кометныхъ косъ вовсе не такъ просто, какъ казалось прежде, что оно представляеть разнообразныя уклоненія въ ту или другую сторону отъ изящнаго и механическаго объясненія, предложеннаго еще Кеплеромъ, и затъмъ разработаннаго Бесселемъ и въ особенности Бредихинымъ. Изучение косъ кометь вступило въ новую фазу съ 1908 года, когда небесная фотографія была въ широкой мірів примінена къ изученію зам'вчательной кометы Морхауза. Въ настоящее время недьзя знать, какія открытія подарить наукъ небольшая фотографическая камера безмольно, но безошибочно передающая намъ всв явленія, происходящія на неб' вообще и въ косахъ кометь въ частности, явленія, подчась совершенно невидимыя пля глаза человъка, хотя бы послъдній и пользовался могущественнымъ телескономъ.

Приведенные факты указывають, что образованіе кометныхъ косъ не всегда происходить по шаблону, намѣченному Бредихинымъ. Кометное вещество отталкивается не только силою, зависящею отъ атом-

¹) Th. Brédikhine, «Sur les grandes valeurs de la force répulsive du Soleil» (Изв. Импер. Акад. Наукъ. 1904 г., т. XX, № 1).

наго въса тъла, но и отъ другой причины. Изслъдованія профессора П. Н. Лебедева раскрывають намъ иной путь образованія кометныхъ косъ и объясняють происхожденіе большихъ скоростей—простымъ давленіемъ солнечныхъ лучей на молекулы кометнаго вещества.

Газообразное вещество имъетъ сложное и притомъ разнообразное молекулярное строеніе. Давленіе, оказываемое солнечными лучами, а слъдовательно, и производимая ими отталкивательная сила, зависить оть величины молекуль, и при пъкоторомъ ихъ размъръ можетъ достигать большихъ значеній. Различныя скорости въ кост Морхуаза могли быть вызваны различнымь молекулярнымъ строеніемъ газообразнаго вещества. Та же причина могла вызвать образованіе большого числа струй въ ея косъ. За всёмъ темъ мы должны признать, что съ появленіемъ каждой большой кометы фотографія открываеть намъ новыя явленія, еще необъяснимыя и ожидающія своего Бесселя, своего Бредихина. Воть область астрономіи, гдё пытливый умъ и опытный наблюдатель можеть собрать обильную и драгоцвнную научную жатву.

## 17. Число кометъ.

Въ самыя сильныя трубы нельзя видеть всехъ кометь, обращающихся вокругь Солнца; изъ нихъ мы видимъ только тѣ, которыя проходять сравнительно близко отъ Земли, -- въ среднемъ не далъе, какъ на разстояній, равномъ двойному разстоянію Земли отъ Солнца; следовательно, намъ доступно только ограниченное число кометь. Далье, изъ всъхъ кометь, обращающихся въ этихъ предълахъ, мы замъчаемъ только наиболье яркія, но при условіи, что кометы видны на ночномъ небъ; если же онъ находятся днемъ надъ горизонтомъ, то кометы, за самыми ръдкими исключеніями, намъ не доступны. Кром в того, следуеть обратить внимание на два условія, при которыхъ происходить открытіе кометь. Во-первыхь, въ прошлыхъ стольтіяхь — до семнадцатаго — наблюдали только тѣ кометы, которыя были видимы просто глазомъ, слъдовательно самыя яркія, а ихъ очень мало; во-вторыхъ, въ большинствъ случаевъ кометы открываются совершенно случайно; ихъ открытіе зависить оть разныхъ причинъ, главнымъ же образомъ отъ числа астрономовъ, занимающихся разысканіемь кометь, оть ихъ оптическихъ средствь, оть ихъ усердія и умѣнія. Повидимому, многія кометы, при своемъ приближеніи къ Солнцу, постоянно остаются въ его лучахъ и совершенно для насъ невидимы <sup>1</sup>). Все, вмѣстѣ взятое, приводить насъ къ заключенію, что мы видимъ только малую долю всего числа кометъ, обращающихся вокругъ Солнца; поэтому опредѣленіе общаго числа кометъ представляетъ большія затрудненія. Можно только оцѣнить приблизительное число кометъ, но точно опредѣлить— нѣтъ возможности. Кеплеръ, задавшій себѣ этотъ вопросъ, отвѣтилъ на него весьма лаконически: «кометъ въ небѣ столько же, сколько рыбъ въ морѣ»— «ut pisces in oceano».

Разсмотримъ число появлявшихся въ прежнее время кометъ. Замътимъ, что число кометъ, наблюденныхъ въ древности, увеличивается по мъръ изученія древнихъ памятниковъ. Мы заимствуемъ подобный списокъ изъ сочиненій Хайнда (Hind) до 19-го стольтія, а начиная съ 1801 года—изъ сочиненія д-ра Галле (Galle, Verzeichniss der Elemente der bisher berechneten Cometenbahnen. Leipzig. 1894) и изъ Astronomische Nachrichten.

<sup>1)</sup> Д-ръ I. Holetschek въ 1886 г. напечаталъ интересное изследование о распределении осей кометныхъ орбитъ, въ которой разсмотрелъ условия видимости кометъ (Sitzungsberichte der k. Akad. der Wissenschaften. Wien, Band XCIV, II Abth. Dec. Heft).

## Вотъ этотъ списокъ:

					Число на- блюден- ныхъ ко- метъ.	Число появ- леній періоди- ческихь кометь
	нашей	_		• .	68	1
Въ	I	столѣтіи			21	1
>>	II	>>			24	1
>>	, III	>>		·	40	2
>>	IV	<b>»</b>			25	1
>>	V	*			18	1
>>	$\nabla \mathbf{I}$	>>			25	1
>>	$\mathbf{VII}$	>>			31	2
>>	VIII	>>			15	1
>>	ΙX	<b>»</b>			35	. 1
>>	$\mathbf{X}$	»			24	3
>>	XI	»			31	2
7	XII	»			. 26	1
>>	XIII	»			27	3
>	XIV	»			31	3
>>	$\mathbf{X}\mathbf{V}$	»			35	1
*	XVI	»			31	5
>>	XVII	»			25	5
>>	XVIII	<b>»</b>			69	8
>>	XIX	<b>»</b>			311	81
>>	$\mathbf{X}\mathbf{X}$	»			40	11
-	Итого		•		 952	135

Въ 20-мъ столътіи съ 1901 до 1910 года появилось 40 кометь; изъ нихъ 11 повторныхъ появленій. Итакъ всего зарегистрировано 952 кометы.

За послёднее время число открываемыхъ кометь значительно возрасло, какъ это видно по слёдующимъ числамъ:

за первую половину 19-го стольтія. . 93 кометы » вторую » » . . 218 »

Затьмъ ръзко бросаются въ глаза числа кометь, наблюденныхъ до и послъ изобрътенія телескопа. Хотя телескопъ изобрътенъ въ 1610 году, и въ теченіе XVII стольтія онъ не примънялся къ наблюденію кометь, такъ что за телескопическое время слъдуеть считать 18-е, 19-е и начало 20-го стольтія. Мы сопоставляемъ числа въ слъдующей табличкъ:

до 18-го столътія наблюдено. . . . 532 кометы начиная съ 18-го столътія наблюдено. 420 »

Относя эти числа къ столътіямъ, мы получаемъ слъдующій выводъ:

- 1) въ одно столътіе до изобрътенія телескопа наблюдалось . . . . . . 27 кометь

Въ настоящее время разыскание кометь правильно организовано; въ этомъ дѣлѣ принимають участие обсерватории съвернаго и южнаго полушарій, и едва ли останется незамѣченною комета, вступившая въ Солнечную систему и приблизившаяся къ Солнцу, — конечно, изъ числа тѣхъ кометъ, которыя могутъ быть доступны въ современные телескопы и которыя по своему положенію относительно Солнца находятся въ благопріятныхъ для наблюдателя условіяхъ.

Среднее число кометь, наблюдаемых за последнее

время въ теченіе одного года, нѣсколько болѣе четырехъ; изъ этого числа одно является повторнымъ появленіемъ періодическихъ кометь, такъ что новыхъ появленій нѣсколько болѣе трехъ. Остановимся на кругломъ числѣ трехъ кометь; это число будеть меньше пѣйствительнаго, но не больше.

Въ двадцать стольтій число кометь, приблизившихся къ Солнцу и прошедшихъ черезъ перигелій, будеть, следовательно, 6 000. Хотя это число, само по себъ, громадное, но оно сравнительно мало, такъ какъ принятое нами среднее ежегодное число (3 кометы въ годъ) меньше дъйствительнаго. Итакъ, число 6 000 кометь въ двадцать столетій меньше действительнаго. Оно меньше дъйствительнаго еще по слъдующей причинъ: Араго и Голечекъ замътили, что не во вст времена года наблюдается одинаковое число кометь; изъ 226 кометь, которыя Голечекъ изследоваль. 130 прошли черезъ перигелій зимою и только 96—льтомъ. Распространяя подобное изследование на кометы новъйшаго времени, мы замъчаемъ, что изъ 301 кометы 165 явились въ зимніе, а 136—въ лѣтніе мъсяцы; — отношение, очевидно, остается то же самое.

Причину этого явленія не трудно уяснить. Зимою въ сѣверномъ полушаріи ночи длиннѣе дней, а потому зимою большая часть неба можетъ быть осматриваема, лѣтомъ же—меньшая; кромѣ того, въ сѣверныхъ широтахъ лѣтомъ бываютъ продолжительныя сумерки, мѣшающія наблюденіямъ. Принявъ во вниманіе всѣ эти обстоятельства, мы можемъ сказать, что приведенное число кометъ значительно меньше дѣйствительнаго.

Здёсь можно было бы сдёлать возраженіе, что, когда у насъ лъто, то на южномъ полушаріи--зима, и въ это время тамъ длинныя ночи, благопріятствующія продолжительнымъ наблюденіямъ. Замѣчаніе это, безспорно, справедливо, но дело въ томъ, что большинство обсерваторій находится въ стверномъ полушаріи, а въ южномъ всего несколько обсерваторій; въ прошлыхъ же столътіяхъ ихъ было еще меньше; неудивительно, поэтому, что на зимніе місяцы приходится большее число кометь, чвмъ на лвтніе. Само собою разумъется, что если бы обсерваторіи были равномърно распредълены по земному шару, и астрономы съ одинаковымъ рвеніемъ занимались разысканіемъ кометъ въ обоихъ полушаріяхъ, то, при одинаковыхъ метеорологическихъ условіяхъ въ обоихъ полушаріяхъ, не было бы замічено никакой разницы между числомъ кометъ, открываемыхъ зимою и лътомъ.

Приведенное число, безъ сомнѣнія, ниже дѣйствительнаго. Мы уже замѣтили, что многія кометы могуть быть невидимыми, вслѣдствіе невыгоднаго своего расположенія относительно Солнца: онѣ исчезають въ его лучахъ. Еще Сенека обратилъ на это вниманіе: «Многія кометы, говорить онъ, невидимы потому, что исчезають въ лучахъ Солнца. Посидоній сообщаеть, что во время затменія этого свѣтила замѣтили комету, которая была невидна изъ-за близости къ нему». Послѣ открытія Ньютономъ всемірнаго тяготѣнія и уясненія истипнаго движенія кометь вокругъ Солнца, мы знаемъ, что мпогія кометы, огибая Солнце, могуть все время оставаться въ его лучахъ и быть для насъ невидимыми, хотя бы въ дѣйствительности онѣ

были очень яркія. Но кром'в того и другія еще обстоятельства им'вють большое вліяніе на число видимых кометь. Вспомнимь, что кометы видимы только тогда, когда он'в находятся близъ Земли, сл'вдовательно, только т'в, которыя им'вють разстояніе перигелія отъ Солнца не бол'ве двойного разстояніе Земли оть Солнца. Однако же н'втъ никакой причины предполагать, чтобы вс'в кометы обращались только въ этой ограниченной области небеснаго пространства.

Если бы можно было допустить равном врное распредъление кометь въ небесномъ пространствъ, то вопросъ разрѣшался бы очень просто; стоило бы выбрать опредъленный объемъ, сосчитать, сколько въ немъ было кометь въ извъстный періодъ времени; затъмъ сосчитать, во сколько разъ объемъ сферы, охватывающей отдаленнъйшую отъ Солнца планету, больше избраннаго объема, и помножить число кометь въ избранномъ объемъ на отношение къ нему объема всей Солнечной системы. Напримъръ, за орбиту Меркурія входило въ круглыхъ числахъ 50 кометь. Желая узнать, сколько кометь заключается въ пространствъ, ограниченномъ орбитой Нептуна, который въ 78 разъ дальше отъ Солнца, чёмъ Меркурій, мы должны 50 помножить на 78<sup>3</sup>, что дастъ намъ болъе двадцати трехъ милліоновъ. Такимъ образомъ, ВЪ пространствъ. окружающемъ Солнце и ограниченномъ орбитой Нептуна, обращается болже 23 милліоновъ кометъ.  $H_0$ нельзя допустить равномърное распредъленіе кометь въ небесномъ пространствъ. Въ силу тяготънія кометь больше около Солнца, чъмъ на предълъ Солнечной системы; слъдовательно, въроятное

число кометь за 2000 лёть должно быть меньше 23 милліоновъ. І. Клейберъ 1) сдёлаль оцёнку на основаніи закона всемірнаго тяготёнія и пришель къ заключенію, что въ предёлахъ Солнечной системы постоянно обращается 5 934 кометы; если округлить это число до 6 000 и предположить, что въ годъ вступаеть такое число кометь, то въ 20 столётій число ихъ было бы 12 милліоновъ,—въ два раза меньше того числа, которое получено выше въ предположеніи о равном'єрномъ распредёленіи кометь въ предёлахъ Солнечной системы.

Въ той же статъъ І. А. Клейбера мы находимъ и другіе интересные выводы, а именно:

- 1) Изъ числа 48 кометь, вступающихъ въ предълы Солнечной системы, только одна можетъ приблизиться къ Солнцу болъе, чъмъ Земля.
- 2) Изъ числа 362 кометь, разстояніе которыхъ отъ Солнца меньше, чѣмъ разстояніе Земли, только одна можеть задѣть за солнечную поверхность и упасть на Солнце.
- 3) Если принять, что ежегодно только одна комета вступаеть въ предълы земной орбиты, то въ 362 года одна комета можетъ упасть на Солнце.

Приведенные расчеты ограничены предълами Солнечной системы; если же выйти мысленно за предълы ея, то получимъ ужасающее число кометъ. Невольно вспоминаются слова Кеплера въ вопросъ о числъ кометъ: «ut pisces in oceano!»

<sup>1)</sup> Ioseph Kleiber. Ueber die Gesammtzahl der Cometen im Sonnensystem. Astron. Nachr., vol. 130, p. 121.

## 18. Происхождение кометъ.

Вопросъ о мірозданіи принадлежить къ самымь возвышеннымь въ астрономіи. Заглянуть въ отдаленное прошлое и нарисовать картину образованія міровътакъ, какъ будто человъкъ былъ дъйствительнымъ свидътелемъ ихъ творенія—является заманчивою задачею, увлекавшею многіе умы.

Построить гипотезу мірозданія легко; всякій можеть сдёлать это. И дёйствительно, астрономическая литература даеть намь хорошее тому доказательство. Но отнестись критически къ построенной гипотезё не всякій можеть; многіе авторы уклоняются оть критической оцёнки вслёдствіе неумёнія разобраться въ сложныхъ явленіяхъ мірозданія. За всёмъ тёмъ слёдуеть прибавить, что традиціонныя гипотезы мірозданія вовсе не касаются кометь и падающихъ звёздь, въ особенности послёднихъ; еще не такъ давно онё относились къ области Метеорологіи, а не Астрономіи. Отнестись критически къ нёкоторой гипотезё вовсе не такъ легко и во всёхъ случаяхъ труднёе, чёмъ построить самую гипотезу. Критически отнестись къ нёкоторой гипотезё мірозданія значить или до-

казать ея справедливость, или же отвергнуть ее, какъ невозможную или невъроятпую. Та гипотеза, которая выдержала экзаменъ научной критики, принимается всъмъ ученымъ міромъ и образованнымъ обществомъ и является достояніемъ широкихъ круговъчитающей публики.

Въ настоящей книгъ мы изучили движене кометь въ предълахъ Солнечной системы, ихъ видъ и строене; мы постарались изучить ихъ движене далеко за предълами Солнечной системы; на это указали намъ такъ называемыя семьи кометь; мы уяснили причину группировки періодическихъ кометь около большихъ планеть и, наконецъ, передъ нами раскрылась судьба періодическихъ кометъ. Поставимъ затъмъ вопросъ: какимъ образомъ происходятъ кометы? Вопросъ этотъ затрагиваетъ еще болъе отдаленное прошлое каждой кометы.

Кометы состоять изъ собранія твердыхъ частицъ, небольшихъ по своимъ размѣрамъ; изъ сотни тысячъ или милліона падающихъ звѣздъ попадается только одна большихъ размѣровъ, которую удается найти упавшею на Землю. Подпятыя падающія звѣзды или такъ называемые метеориты обыкновенно меньше фунта, въ рѣдкихъ случаяхъ больше и только въ исключительныхъ случаяхъ вѣсятъ пѣсколько пудовъ или болѣе. Отсюда мы выводимъ заключеніе, что падающія звѣзды въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ представляютъ собою крошечныя твердыя тѣла. Скіапарелли, оцѣнивая ихъ величину но видимому блеску, пришелъ къ заключенію, что вѣсомъ онѣ не болѣе долей золотника.



Рис. 50. І. В. Скіапарелли

Далѣе, мы знаемъ, что кометы дробятся и разлагаются въ метеорные потоки; если Земля пересѣкаетъ послѣдніе, то твердыя частицы, образующія ихъ, встрѣчаются съ Землею; влетая въ земную атмосферу, онѣ накаливаются отъ сопротивленія о воздухъ и свѣтятся; онѣ представляются намъ падающими звѣздами. Слѣдовательно, мы имѣемъ основаніе утверждать, что ядро кометы состоитъ изъ собранія множества твердыхъ частицъ, крошечныхъ тѣлецъ. Вопросъ о происхожденіи кометь сводится къ рѣшенію вопроса о томъ, откуда взялись эти твердыя частицы, какимъ путемъ онѣ образовались.

Небо представляеть намъ множество туманныхъ пятень, состоящихь изъ светящагося газообразнаго вещества. Лучшій примъръ подобныхъ свътилъ мы имфемъ въ большомъ туманномъ пятнъ Оріона, состоящемъ сплошь изъ свътящагося газа. При охлажденіи газообразнаго вещества оно переходить въ жидкое или твердое состояніе. Перехода газообразнаго вещества въ жидкое или твердое состояние въ небесныхъ пространствахъ никто никогда не наблюдалъ; вслъдствіе этого можно только строить гипотезы, какимъ образомъ это происходить. Можно здёсь поставить вопросъ, происходить ли вообще въ небесахъ переходъ вещества изъ газообразнаго состоянія въ другое-твердое или жидкое, или же всякое вещество въчно сохраняеть то состояніе, въ которомь оно создано. Поставленный вопросъ имфетъ вполнф опредъленный отвътъ. Съ одной стороны мы видимъ, какъ въ кометахъ отделяется образовавшееся изъ твердыхъ частицъ газообразное вещество, переходящее затъмъ въ косу кометь, съ другой же стороны мы имъемъ метеориты,—небесные камни, указывающе своимъ строеніемъ на ихъ образованіе изъ газообразнаго состоянія. Слъдовательно вещество переходить изъ одного состоянія въ другое.

Метеориты по своему строенію ділятся на желізные и каменные. Желъзные состоятъ главнымъ образомъ изъ чистаго желъза съ примъсью никеля и имѣютъ кристаллическое строеніе. Распиленные и отшлифованные, а затъмъ окисленные соляною кислотою, они представляють такъ называемыя видманштедтовы фигуры-красивое кристаллическое строеніе, которое могло произойти только при медленномъ охлажденіи жидкаго или газообразнаго вещества. Изученіе жельзныхъ метеоритовъ приводить насъ къ заключенію, что они образовались или прямо изъ газообразнаго вещества, или же изъ жидкаго. Вещество-въ жидкомъ состояніи встръчается только въ звъздахъ, въ свътилахъ уже созданныхъ и обладающихъ значительными массами; въ малыхъ массахъ вещество въ жидкомъ состояніи нигд'в не наблюдается; мы вследствіе этого склоняемся къ предположенію, что отдъльныя твердыя частицы или тъла, каковыми являются падающія зв'єзды вообще и въ частности метеориты, образовались прямо изъ газообразнаго состоянія. Кристаллическое строеніе могло произойти при постепенномъ, сравнительно медленномъ охлажденія.

Каменные метеориты представляють собою хондриты,—тѣла не однородныя, а состоящія изъ вкрапленныхъ въ минеральную массу шариковъ металла, главнымъ образомъ желѣза. Хондриты образовались

при быстромъ охлажденіи газообразной массы. Образованіе ихъ изъ жидкой массы трудно допустить; въ послѣднемъ случаѣ они имѣли бы сплошное однородное строеніе.

Итакъ, мы приходимъ къ заключению, что газообразная масса, составляющая туманное пятно, имѣющая ту или иную температуру, путемъ медленнаго или быстраго охлажденія, перешла прямо въ твердыя тѣла небольшихъ размѣровъ; число этихъ тѣлецъ весьма большое и прямо зависитъ отъ количества вещества первичной газообразной туманности.

Вотъ гипотеза образованія твердыхъ тѣлецъ, составляющихъ какъ кометы, такъ и метеорные потоки падающихъ звѣздъ. Является ли она вѣроятною и правдоподобною?

Какъ первичное состояніе газообразныхъ туманностей, такъ и конечное состояніе кометъ и метеорныхъ потоковъ падающихъ зв'єздъ, налицо; остается только пров'єрить, возможенъ ли описанный переходъ изъ одного состоянія въ другое.

Для освъщенія нашего вопроса у насъ нътъ прямыхъ данныхъ; но вспомнимъ о снътъ, дождъ и градъ, образующихся изъ водяныхъ паровъ, т. е. изъ воды, находящейся въ газообразномъ состояніи.

Снѣжинки, состоящія изъ кристалликовъ твердой воды, образуются прямо изъ газообразной воды. Медленное охлажденіе паровъ воды до температуры ниже нуля вызываеть образованіе кристалликовъ, составляющихъ снѣжинки. Мы видимъ, что водяной паръ переходитъ не въ сплошную снѣговую массу, а во множество отдѣльныхъ снѣжинокъ.

То же самое замъчается при образовании дождя. Водяной паръ, насыщающій верхніе слои воздуха, переходить во множество отдъльныхъ капелекъ; явленіе происходить при обыкновенной температуръ выше нуля, но при условіи ея пониженія. Образовавшіяся изъ насыщеннаго парами воды крошечныя капельки, падая подъ дъйствіемъ силы тяжести, встръчаются съ другими себъ подобными и увеличиваются въ объемъ и въ въсъ, достигая величины дождевыхъ капель.

Образованіе града отличается отъ образованія дождя тімь, что при быстромь охлажденіи водяного пара послідній переходить не въ кристаллическія формы, а въ ледяные шарики, которые, падая внизъ, могуть проходить нісколько слоевъ тучь съ различными температурами, а въ зависимости отъ этого получаются иногда слоистыя градинки.

Итакъ, явленіе снѣга, дождя и града, наблюдаемое въ предѣлахъ земной атмосферы, указываеть намъ, что переходъ газообразнаго вещества въ твердое или жидкое происходитъ путемъ образованія множества отдѣльныхъ твердыхъ тѣлецъ.

Возвращаясь къ разсмотрънію вопроса о метеоритахъ, мы видимъ, что порядокъ ихъ образованія въ общемъ такой же, какъ и снъга или дождя и града; различіе заключается только въ газообразномъ веществъ, изъ котораго они образовались, и въ температуръ. Въ небесномъ пространствъ первичное газообразное вещество и температура совершенно иныя, чъмъ въ атмосферъ Земли.

Итакъ, твердыя частицы, составляющія кометы и падающія зв'єзды, образовались изъ газообразнаго

вещества, путемъ его охлажденія. Образовавшаяся комета одушевлена тъмъ же движениемъ, которымъ обладала первичная газообразная туманность. Находясь въ безграничномъ пространствъ комета, совершенно для насъ невидимая, можетъ годами и въками двигаться по инерціи равном фрным в прямодинейнымъ движеніемъ; она можетъ двигаться подобнымъ образомъ не только годы и въка, но и тысячелътія и даже милліоны лъть. Но воть какая-то сила едва замътно уклонила комету въ сторону отъ первоначального пвиженія: это сила тягот внія къ одной изъ многочисленныхъ звъздъ вселенной. Съ того момента, какъ произошло описанное уклонение въ движеніи кометы, ея дальнъйшій путь предопредълень: она уже движется по направленію къ той зв'взд'в, которая силою своего тяготвнія отклонила комету оть своего первоначального направленія. Притягивающею звъздою можеть быть и Солнде; тогда комета направляется къ нему, и, вступивъ въ предълы Солнечной системы, становится видимою; она можеть украсить наше небо; она можеть выкинуть большую раскошную косу. Затъмъ, пройдя черезъ перигелій, она обогнеть Солнце и снова уйдеть въ небесное пространство, оставивъ по себъ воспоминание только среди астрономовъ.

Въ первичной туманности могутъ обособиться не одна, а нъсколько кометь; тогда къ Солнцу направится семья кометь, какъ изложено въ главъ 14-й.

Комета можеть совершить одинь или много оборотовъ вокругь Солнца, какъ обособленное свътило, но въ концъ-концовъ, какъ мы знаемъ, она должна раз-

дробиться и разложиться въ метеорный потокъ. Разсмотримъ, какимъ образомъ метеорное вещество кометы распредълится вдоль орбиты кометы. Комета, послужившая матеріаломъ для образованія метеорнаго потока, названа Бредихинымъ кометою-родоначальницею.

Какъ только комета, образовавшаяся изъ газообразнаго вещества путемъ его сгущенія на многія крошечныя тёла, начнеть замётно тяготёть къ Солнцу и въ зависимости отъ этого начнетъ отклоняться въ сторону относительно первоначальнаго направленія движенія кометы, наступаеть процессь разложенія кометы въ метеорный потокъ, о чемъ изложено въ главъ 13-й. Ближайтія къ Солнцу частицы будуть стремиться уйти впередъ отъ наиболъе отдаленныхъ, которыя отстануть. Если частицы, образующія комету, составляють сплоченную группу и удерживаются силою взаимнаго тяготвнія, то комета будеть болве или менъе продолжительное время двигаться какъ обособленное свътило; но если разстояние между частицами значительное, такъ что взаимное тяготъніе ничтожно-малое, то процессъ разложенія наступить немедленно же; комета потеряеть свой видь, будеть удлиняться и, вступивъ въ предълы Солнечной системы, будеть имъть видь метеорнаго потока, расположеннаго вдоль орбиты кометы-родоначальницы. При образованіи кометы обособленное ядро ея можеть быть окружено множествомъ частицъ (тълецъ, метеорнаго вещества), слабо тяготъющихъ къ ядру кометы; онъ движутся вмёстё съ кометою, окружая ее со всёхъ сторонъ. Вотъ эти частицы силою тяготвнія къ Солнцу будуть выхвачены оть кометы; одна часть ихъ уйдеть впередь, а другая отстанеть, и комета вступить въ предълы Солнечной системы, имъл впереди себя и за собою метеорный потокъ. Если комета родоначальница при своемь образованіи имъла внушительные размъры, то она будеть двигаться среди весьма длиннаго метеорнаго потока. Подобный случай мы имъемъ въ кометахъ 1862III, 1866I и 1861I, движущихся соотвътственно среди метеорнаго потока Персеидъ, Леонидъ и Геркулидъ; послъднія наблюдаются 20 апръля.

Въ предълахъ Солнечной системы метеорный потокъ можетъ пересъкать орбиты большихъ планетъ, а въ томъ числъ и орбиту Земли; въ послъднемъ случаъ мы будемъ съ нимъ встръчаться и каждый годъ въ день встръч наблюдать падающія звъзды, принадлежащія этому потоку. Если же потокъ не пересъкаєть земную орбиту, то о существованіи его мы ничего пе знаемъ и при современномъ состояніи науки знать не можемъ.

Комета-родоначальница можетъ продолжать обращаться вокругъ Солнца какъ самостоятельное свътило; съ каждымъ, однако, оборотомъ ея, съ каждымъ шагомъ по орбитъ разлагающая сила Солнца стремиться увеличить разстояніе между отдъльными частицами, составляющими комету. Много оборотовъ комета можетъ совершить какъ обособленное самостоятельное свътило, но въ концъ-концовъ она должна разложиться въ метеорный потокъ. Если, напримъръ, въ теченіе одного оборота вокругъ Солнца разстояніе между частицами увеличится на одну тысячную часть всей

орбиты, то въ тысячу оборотовъ всй частицы, составляющія комету, распредёлятся вдоль орбиты ея и составять сплошной потокъ, непрерывное ожерелье метеоровъ, окружающее Солице. Встрѣчаясь съ подобнымь потокомъ, мы ежегодно въ одно и то же календарное число будемъ наблюдать падающія звѣзды, принадлежащія этому потоку.

Если космическое вещество распределено равномърно вдоль всей орбиты кометы-родоначальницы, то. при встръчъ съ потокомъ, изъ года въ годъ мы будемъ наблюдать одно и то же число надающихъ звъздъ въ теченіе ніжотораго промежутка времени, напримітрь, одного часа; если же космическое вещество распредълено неравномърно, а скучено въ одномъ или нъсколькихъ мъстахъ орбиты, то часовое число падающихъ звъздъ изъ года въ годъ не будетъ постояннымъ: оно будеть то больше, то меньше, смотря по тому, какая часть потока дошла до пересъченія съ земною орбитою. Произошла встреча въ той части, где вещество весьма скучено, мы наблюдаемъ много падающихъ звъздъ; произошла она въ той части, гдъ метеорнаго вещества немного, мы наблюдаемъ сравнительно малое количество надающихъ звъздъ. Подобный примерь представили намь Леониды: наблюденіями, занесенными въ лѣтописи, установлено, что черезъ каждые 33-34 года ихъ появляется большое количество; очевидно, онъ не распредълены равномърно вдоль орбиты, а скучены въ одномъ мъстъ; образованная изъ нихъ туча или рой движется вокругъ Солнца по эллиптической орбить, совершая полное обращение въ 33<sup>1</sup>/4 года.

Персеиды (9, 10 и 11 авг. по нов. ст.) тоже обнаруживають періодичность, но не въ столь рѣзкой формѣ, какъ Леониды. Наблюденія, охватывающія значительный промежутокъ времени, указывають на періодичность въ 70 лѣтъ приблизительно. Скіапарелли первый обратилъ на это вниманіе. Къ сожалѣнію, прежнія малочисленныя наблюденія не дають возможности установить періодичность Персеидъ съ желаемою точностью.

Опредълить мъсто скученности метеорнаго вещества на орбитъ кометы-родоначальницы возможно только путемъ наблюденій надъ падающими звъздами; иного пути не существуетъ, такъ какъ падающія звъзды видны только тогда, когда онъ, влетая въ земную атмосферу, свътятся отъ накаливанія.

Кром' Персеидъ и Леонидъ, наблюдаемыхъ въ августв и ноябрв, мы можемъ наблюдать падающія звѣзды въ каждую ясную, и въ особенности безлунную, ночь. Ежедневно, постоянно, Земля встръчается съ метеорными потоками, образовавшимися изъ кометъ. Въ каталогъ метеорныхъ потоковъ, помъщенныхъ въ прекрасной книгъ I. Клейбера: «Опредъление метеорныхъ потоковъ», находится двъ тысячи отдъльныхъ потоковъ падающихъ звёздъ. Со столькими потоками Земля встръчается ежегодно; въ среднемъ въ сутки Земля встръчается съ шестью потоками. Слъдуеть, однако, заметить, что изъ этого числа только некоторые потоки хорошо изучены, остальные же неудовлетворительно; положение некоторыхъ радіантовъ метеорныхъ потоковъ основано только на четырехъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже на трехъ падающихъ

звъздахъ. Читатель согласится со мною, что этого недостаточно. Падающія звъзды еще слишкомъ мало изучены; онъ ждутъ своихъ наблюдателей. Всякое точное наблюденіе въ этой области Астрономіи явится цъннымъ научнымъ вкладомъ. Вотъ почему наблюденія надъ падающими звъздами являются весьма желательными. Читатели, интересующіеся падающими звъздами, найдутъ изложеніе выработанныхъ наукою правиль для ихъ наблюденія въ моей книгъ «Друзьямъ и Любителямъ Астрономіи».

#### 19. Значеніе кометъ въ мірозданіи.

Изученіе вида кометь привело насъ къ уясненію истиннаго ихъ строенія; затъмъ изученіе ихъ движенія повело къ открытію семействъ кометь, а это явленіе, въ свою очередь, дало возможность построить гипотезу о происхожденіи кометь. Постараемся свести въ одно- цълое всъ извъстныя намъ явленія изъ жизни кометь и освътить вопросъ о значеніи ихъ въ мірозданіи вообще и Солнечной системы въ частности. Вопросъ этотъ въ подробностяхъ не разсматривался творцами знаменитыхъ гипотезъ мірозданія. Канть, Лаплась, Фай и другіе обходили его; только Локіеръ въ своей метеорной гипотезъ далъ обстоятельное изложеніе значенія метеоровъ (падающихъ звъздъ) въ мірозданіи.

Вдали отъ Солнца, въ необозримомъ пространствъ великой вселенной движется газообразное облако, называемое астрономами туманнымъ пятномъ; находясь въ громадномъ разстояніи отъ Солнца и другихъ звъздъ, оно движется по инерціи равномърно и прямолинейно. Почему оно движется но извъстному направленію и съ извъстною скоростью—мы не знаемъ;

для насъ это тайна. Мы можемъ только сказать одно: движение есть свойство, присущее всякому веществу. Послъднее одушевлено поступательнымъ, вращательнымъ и молекулярнымъ движениемъ. Движения всъхъ трехъ родовъ встръчаются почти всегда вмъстъ. На вопросъ, откуда взялось у разсматриваемой туманности то или другое движение, мы не можемъ дать отвъта, такъ же точно, какъ не можемъ дать отвъта и на вопросъ: откуда взялось вещество туманности. Эти вопросы лежатъ на границъ нашихъ зна ній, и человъку не удалось ее переступить.

Изъ разсматриваемой туманности темъ или инымъ нутемъ образовались кометы, состоящія изъ собранія множества твердыхъ частицъ; изъ туманности могли образоваться одна или нъсколько кометь; всего въроятиве, ихъ образовалось ивсколько. Кромв обособленныхъ кометъ, частицы которыхъ удерживаются взаимнымъ тяготъніемъ, изъ туманности могли образоваться частицы, не принадлежащія ни къ одной изъ кометь. Народивнияся кометы и отдёльныя твердыя частицы одушевлены общимъ движеніемъ: онъ движутся равномърнымъ движеніемъ по линіямъ, параллельнымъ между собою; овъ движутся такимъ образомъ въка и тысячельтія, а можеть быть, даже и милліоны літь. Вдругь впереди идущая комета получила какой-то толчокъ и стала едва замътно уклоняться въ сторону; за нею и вторая комета стала уклоняться въ ту же сторону, за нею третья и т. д., и всъ отдъльныя частицы, сопровождающія разсматриваемыя кометы. Невидимая сила увлекаеть кометы въ сторону отъ ихъ первоначального прямодинейного движенія:

это—сила тяготънія къ одной изъ звъздъ вселенной. Предположимъ, что наши кометы начали тяготъть къ Солнцу, и мысленно послъдуемъ за ними.

Съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ и даже съ каждымъ мгновеніемъ, начиная отъ описаннаго уклоненія кометь отъ прямолинейнаго движенія, онѣ начинають двигаться ускореннымъ темномъ, направляясь по весьма вытянутому эллипсу, въ фокусѣ котораго находится Солнце. Если первоначальное движеніе туманности и образовавшихся изъ нея кометь могло измѣряться безконечнымъ числомъ лѣтъ, то и промежутокъ времени послѣ перваго толчка, полученнаго кометами отъ тяготѣнія къ Солнцу, до ихъ прохожденія черезъ перигелій измѣряется вѣками и тысячелѣтіями. Комета Галлея, напримѣръ, отъ орбиты Нептуна до перигелія проходить въ 38 лѣтъ, а у орбиты Нептуна тяготѣніе Солнца далеко не прекращается.

Съ момента перваго толчка, полученнаго кометами отъ тяготънія къ Солнцу, онъ становятся свътилами Солнечной системы; онъ будутъ обращаться вокругъ него, описывая эллинтическія орбиты большаго или меньшаго эксцентриситета, что всецьло зависитъ отъ тяготънія къ большимъ планетамъ, мимо которыхъ проходятъ наши кометы. Мы исключаемъ изъ разсмотрънія случай, когда кометы движутся по гиперболь. Подобныя кометы обогнутъ Солнце только одинъ разъ, и затъмъ уйдутъ въ безграничную вселенную; ихъ пребываніе въ предълахъ Солнечной системы имъетъ вообще малое значеніе для планетъ, развъ что онъ встрътятся съ одною изъ нихъ и отдадуть ей часть

своего вещества. Мы разсмотримъ кометы, движущіяся по эллиптическимъ орбитамъ.

Вступивъ въ предълы Солиечной системы, комета подвергается вліянію большихъ планеть: она тяготъетъ не только къ Солицу, но и къ нимъ; въ ея движеніи происходятъ возмущенія; подъ вліяніемъ большихъ планетъ, комета можетъ присоединиться къ одной изъ большихъ планетъ, вступивъ въ число членовъ ея кометной семьи. Кометы, образовавшіяся изъ туманности, становятся періодическими; при каждомъ своемъ оборотъ онъ испытываютъ разлагающую силу Солица; подъ вліяніемъ послъдней разстояніе между частицами, составляющими комету, постепенно увеличивается, и начинается процессъ дробленія кометы; она можетъ сначала раздробиться на нъсколько частей, которыя въ свою очередь со временемъ раздробятся и разложатся въ метеорный потокъ.

Вотъ исторія каждой кометы. Многія изъ нихъ уже раздробились въ метеорный потокъ, многія начали дробиться и, наконецъ, великое множество кометь еще не вступило въ сферу тяготвнія Солнца; онв движутся какъ вполнв обособленныя свътила, не подвергаясь силь тяготвнія Солнца; но и ихъ судьба предръшена: какъ только онв вступять въ сферу тяготвнія Солнца или одной изъ звъздъ, тотчасъ же разлагающая сила Солнца или звъзды начнеть подтачивать ихъ независимое существованіе, и кометы превратятся въ метеорные потоки. Рано или поздпо это превращеніе произойдеть со всякой кометой.

Изложенный порядокъ движенія кометь и ихъ жизни приводить насъ къ заключенію, что въ пре-

дълы Солнечной системы ежегодно приносится изъ необозримыхъ пространствъ вселенной изрядное количество космическаго вещества въ видъ обособленныхъ свътилъ-кометъ и въ видъ метеорныхъ потоковъ. Какова же судьба этого вещества?

Подъ вліяніемъ большихъ планетъ происходитъ дальнъйшее разсъивание вешества, составлявшаго когда-то комету; вдоль ея орбиты, а также по сторонамъ широкою полосою движутся многочисленныя частицы, называемыя также космическою пылью или метеорнымъ веществомъ. На своемъ пути онв могутъ встрътиться съ планетами, большими и малыми, при чемъ многія изъ нихъ упадутъ на планеты; тогда онъ прекратять свое небесное существование какъ отдельныя крошечныя небесныя свътила, но зато войдуть въ составъ планеты, увеличивъ ихъ объемъ и массу. Ежедневно на Землю падають сотни тысячь падаюшихъ звъздъ, и не меньшее ихъ число падаетъ на другія планеты; милліоны ихъ ежедневно падають на Солнце. Кометы постоянно приносять въ Солнечную систему космическое вещество изъ пространствъ вселенной и передають его планетамь; последнія растуть, увеличиваясь въ своемъ объемъ и въ своей массъ. Солице также растеть; слава его непрерывно увеличивается; расцвътъ блеска его еще впереди. Мы не замівчаемь этого роста небесныхь світиль, потому что онъ крайне незначителенъ, и за историческое время является незамътнымъ, недоступнымъ нашимъ измърительнымъ приборамъ. Но онъ несомнънно существуеть и продолжается, и черезъ многіе въка станеть замътнымъ. Онъ имъль мъсто вчера, годъ, сто и тысячу лёть назадь; онь имёль мёсто въ моментъ творенія Земли и въ моментъ творенія всёхъ планеть. Что касается до творенія планеть Солнечной системы, то порядокъ его совершенно намъ неизвъстенъ; существують объ этомъ только гипотезы, и если ихъ образование возможно въ томъ видъ, какъ его рисуеть Фай въ своемъ знаменитомъ сочинении «О происхождении міра», именно прямое образованіе изъ газообразной туманности, то разобранныя нами явленія изъ жизни кометь и падающихъ зв'єздъ указывають намъ на другой возможный и вероятный путь, именно взаимное столкновение частицъ. Столкновеніе двухъ частиць уже обезпечиваеть болье скорое столкновеніе съ третьей частицей, а соединеніе трехъ частицъ влечеть за собою более скорое, более въроятное столкновение съ четвертою и т. д. И чъмъ больше свътило, образовавшееся путемъ столкновенія космическихъ частицъ, тъмъ болъе въроятности ему столкнуться съ другими элементарными частицами.

Когда такимъ путемъ образуется свѣтило большихъ размѣровъ, то появляется внутренняя теплота, всецѣло зависящая отъ величпны массы свѣтила: Солнце, имѣющее наибольшую массу, паходится въ раскаленно-жидкомъ состояніп, окруженное раскаленно-газообразнымъ веществомъ. Юпитеръ, первая по величинѣ планета, находится, по всей вѣроятности, въ жидкомъ состояніи, обладая высокой температурой; цѣлый рядъ явленій, наблюдаемыхъ па поверхности планеты, свидѣтельствуетъ о томъ, что о твердой поверхности не можетъ быть и рѣчи. Земля, имѣющая значительно меньшую массу, представляеть свѣ-

тило твердое съ внутреннею массою возвышенной температуры. Луна, масса которой въ 81 разъ меньше массы Земли, является совершенно охлажденнымъ свътиломъ, температура котораго мало отличается отъ температуры небеснаго пространства.

Постараемся теперь заглянуть въ будущее. Ростъ планетъ и Солнца продолжается. Съ увеличениемъ массы Земли должна увеличиваться и ея собственная температура. Ростъ постепенный, но несомибнный. Съ увеличениемъ внутренней или собственной температуры климаты приполярныхъ странъ смягчатся, а тропическихъ стануть еще болье невыносимыми, чъмъ въ настоящее время. Если, напримъръ, къ средней температур В Петербургской губерній прибавится одинь градусь по Цельсію, то географическая граница дикихъ и культурцыхъ растеній измѣнится: она передвинется къ съверу. Въ Петербургской губерніи съ успъхомъ будутъ разводить нъжные сорта грушъ и яблокъ; что же касается прибавленія одного градуса къ знойному климату тропиковъ, то оно пройдетъ почти незамъченнымъ для жителей; съ дальнъйшей же прибавкой зной станеть невыносимымь, и тогда нашь съверъ пріобрътеть важное народное значеніе; начнется переселеніе на сѣверъ.

По вычисленіямъ І. Клейбера, ростъ планетъ настолько малъ, что могъ бы быть замѣченнымъ въ періоды, не поддающіеся измѣренію своею величиною. Если, поэтому, ледяной сѣверъ превратится когданибудь въ благословенную Аркадію, то можно сказать, что это произойдетъ въ такое отдаленное будущее, что за это время человѣкъ сумѣетъ приспосо-

биться къ увеличенной температуръ тропиковъ и сдълать свое тамъ пребывание пріятнымъ.

Не останавливаясь болъе на разсмотръніи подробностей будущей судьбы Земли, потому что многое не можеть быть намъ извъстно, мы должны признать, что кометы постоянно приносять въ Солнечную систему и оставляють въ ней значительныя массы космическаго вещества, отдавая его планетамъ и спутникамъ. Ростъ планетъ продолжается, и твореніе міровъ не закончено; оно будеть въчно продолжаться.

#### 20. О встрѣчѣ Земли съ кометою.

Послъ открытія Ньютона должны были исчезнуть вев предразсудки, относящіеся до кометь: стало изрестнымъ, что ихъ движенія подчиняются міровымъ законамъ тяготвнія, что ихъ появленіе ничего сверхестественнаго не имъетъ, и что слъдовательно ихъ присутствіе на неб'в не можеть предсказывать ни счастья, ни горя. И действительно, предразсудки о кометахъ сохранились только въ невъжественныхъ народныхъ массахъ; въ интеллигентномъ же классъ едва ли можно встрътить средневъковые предразсудки о кометахъ. Если исчезли предразсудки о кометахъ, то появился страхъ за Землю при столкновении съ кометою; столкновеніе же казалось вполнъ возможнымь, такъ какъ эллиптическія орбиты нікоторыхь кометь пересікають орбиту Земли. Незнаніе природы кометь увеличивало этотъ страхъ, а воображаемыя послъдствія были таковы, что Земля претерпить великое бъдствіе отъ столкновенія съ кометою. Стоитъ только вспомнить объ изображенной Вистономъ гибели Земли отъ встръчи съ кометою 1680 года при ея будущемъ появленіи. Позднъйшія изслъдованія убъдили насъ, что теорія Земли, написанная Вистономъ, является скор'ве необоснованнымъ воображениемъ, чъмъ научнымъ изысканиемъ.

Въ настоящее время, когда намъ извъстно строеніе кометъ, никакого опасенія за Землю отъ встръчи ея съ кометами быть не можетъ. Послъ этого, собственно говоря, вопросъ о встръчъ Земли съ кометою отпадаетъ самъ собою; онъ возбужденъ былъ Вистономъ и имъетъ исключительно историческае значеніе, освъщенное богатою литературою.

Теоретическія соображенія о безопасности для Земли отъ встрѣчи съ кометою были блестящимъ образомъ подтверждены неоднократною встрѣчею Земли съ кометою, при чемъ никогда никакихъ зловредныхъ событій не происходило. Встрѣчу съ кометою замѣчали и старательно наблюдали астрономы, а высшее интеллигентное общество любовалось чудеснымъ небеснымъ явленіемъ: полетомъ многихъ падающихъ звѣздъ; что же касается до народа, то, за малыми исключеніями, явленіе прошло совершенно незамѣченное имъ.

Встріча съ ядромъ кометы наблюдалась дважды: въ 1872 и 1885 годахъ, въ обоихъ случаяхъ съ кометою Віела; затімъ въ 1861 г. Земля прошла черезъ косу кометы.

Встрѣча съ кометою Біела хорошо извѣстна читателю: она изложена въ главѣ 13-й и въ моей книгѣ «Друзьямъ и Любителямъ Астрономіи», такъ что здѣсь мы не будемъ повторять изложеннаго. Напомнимъ только, что самое событіе встрѣчи съ кометою выразилось обильнымъ падепіемъ звѣздъ; падающія звѣзды такъ и сыпались на Землю. Никакихъ другихъ явленій

не паблюдалось. Что касается до погруженія Земли въ косу кометы 1861 II, то оно выразилось особымъ свъчениемъ неба; это было увеличенное изображение косы кометы, разсмотр внной съ близкаго разстоянія; никакихъ следовъ инородныхъ газовъ въ нашей атмосферѣ не удалось замътить. Могуть ли газообразныя тёла, заключающіяся въ косё кометы, хотя бы они были ядовитыя, нанести вредъ человеку, животнымъ и растительному царству Земли? Изучая строеніе кометь и ихъ косъ, мы пришли къ заключенію, что плотность кометнаго вещества такъ мала, что не поддается измъренію съ помощью самыхъ точныхъ инструментовъ. Если, слъдовательно, Земля и погрузится въ косу кометы, то при современныхъ приборахъ мы не будемъ даже въ состоянии уловить следы газовъ, составляющихъ косы кометь; говорить же о вредф отъ нихъ для жизни не приходится.

Не имѣя возможности уловить кометный газъ, постараемся сравнить его присутствіе и вліяніе со слѣдующимъ примѣромъ. Вообразите, что въ обширномъ помѣщеніи, напримѣръ въ большомъ пакгаузѣ, на полъ упала капля сильнѣйшаго яда—синерода. Послѣдній испаряется и въ газообразномъ состояніи наполняетъ весь пакгаузъ. Никакого вреда для здоровья человѣка отъ присутствія такого малаго количества синеродистаго газа не произойдетъ. Въ нашемъ примѣрѣ мы помѣстили измѣряемое количество синерода—цѣлую каплю. Для сравненія съ плотностью кометнаго вещества, каплю синерода слѣдовало бы помѣстить не въ обширный пакгаузъ, а въ такой объемъ, который равнялся бы не сотнѣ и не тысячѣ большихъ пакгау-

зовъ, а милліону ихъ! Тогда тѣмъ болѣе онъ не могъ бы принести вреда жизни человѣка; мало того, едва ли самыми тончайшими химическими изслъдаваніями можно было бы его открыть. На этомъ основаніи мы заключаемъ, что отъ погруженія Земли въ косу кометы никакого вреда для жизни не можетъ произойти.

Можеть, однако, возникнуть вопрось: а если появится комета, имъющая весьма большую косу, состоящую изъ весьма плотнаго и ядовитаго газа: неужели и она пе нанесеть намъ вреда?




Рис. 51. Погружение Земли въ косу кометы 1861 II.

На этотъ вопросъ мы отвътимъ совершенно опредъленно: нътъ, ни въ какомъ случать. Если появится подобная комета, то ея коса, имъющая неограниченные размъры, будетъ обладать такою большою массою, что уже мы не будемъ болте обращаться вокругъ Солнца, а вокругъ косы кометы; да н само Солнце будетъ обращаться вокругъ нея. Тогда мы станемъ неизмъннымъ спутникомъ этой воображаемой кометы и никогда не погрузимся въ нее, какъ въ настоящее время, обращаясь вокругъ Солнца, мы никогда

въ него не погружаемся. Какъ въ настоящее время для насъ совершенно безразлично, изъ чего состоитъ Солнце—изъ ядовитыхъ или нейтральныхъ газовъ,—такъ и въ то воображаемое время, когда мы превратимся въ спутника кометной косы, для насъ будетъ совершенно безразлично, изъ чего она состоитъ: мы всегда будемъ обращаться вокругъ нея и никогда на нее не упадемъ.

Итакъ, кометныя косы намъ не страшны: онъ никакого вреда не могутъ намъ нанести.

Передъ возвращениемъ кометы Галлея въ 1910 году въ газетахъ появились замѣтки, обсуждающія возможную катастрофу отъ погруженія Земли въ ея косу. Прочитавъ предыдущія строки, можно съ увѣрепностью утверждать, что возбуждавшіеся ежедневною прессою страхи не имѣли никакого основанія. Въчастности о погруженіи Земли въ косу кометы Галлея мы имѣемъ слѣдующія данныя.

Если бы комета Галлея при послъднемъ своемъ появленін въ 1910 г. была такая же блестящая, какъ и въ прежнія появленія, то можно было бы ожидать, что у нея разовьется нышная коса, и 6 мая по старому стилю мы могли бы погрузиться въ нее; но въ кометъ, повидимому, наступило явленіе дробленія; комета уменьшилась въ объемъ и уже не могла выкинуть такую чудную косу, какъ въ прежнее время, а слъдовательно погрузиться въ косу кометы Галлея не было надежды; сама же комета находилась въ этоть день въ разстояніи 29 милліоновъ километровъ отъ Земли.

Заканчивая настоящую главу и книгу, мы смѣемъ выразить надежду, что читатель, вмѣстѣ со мною, от-

странить оть себя всякую мысль о страхѣ передь кометами и передь возможною встрѣчею съ кометами. Я увѣренъ, что онъ признаетъ важное значеніе кометъ и падающихъ звѣздъ въ жизни Земли; эти свѣтила приносятъ намъ изъ небеснаго пространства твердое вещество, которое при встрѣчѣ съ Землею распыляется вслѣдствіе сопротивленія о воздухъ и въ видѣ мельчайшихъ частицъ ниспадаетъ на Землю. Наша планета получаетъ даръ съ неба, и этотъ даръ мы считаемъ драгоцѣннымъ. Вмѣстѣ со мною читатель пожелаетъ почаще видѣть блестящія кометы и дожди падающихъ звѣздъ.

### оглавленіе.

		CTPAH.
	Введеніе	. 1
1.	Видъ и размъры кометъ и ихъ косъ	. 3
2.	Кеплеръ и его законы движенія планеть	. 13
3.	Ньютонъ и законъ всемірнаго тяготвнія	. 25
4.	Элементы кометныхъ орбитъ	. 35
5.	Маркизъ де-Лапласъ и докторъ Ольберсъ	. 49
6.	Періодическія кометы	. 57
	Комета Энке 65.—Темпель и его кометы 74.—Комета	a
	Темпия - Л. Свифта 78. — Комета Брорзена 80.—Ко	-
	мета Виннеке 80. — Комета де-Вико-Э. Свифта 82.—	
	Комета Перрина 88. — Комета Финлея 89. — Комета	
	Д'Аррэ 90.—Комета Вольфа 91.—Комета Хольмса 92.—	
	Бруксъ и его періодическія кометы 93.—Комета Понса	
	Брукса 98. — Комета Ольберса-Брукса 100. — Комет	
	Брукса (1889 V) 101. — Комета Файя 104. — Комета	
	Тетля 107.—Комета Галлея 108.	
~	n	400
7.	Пропавшія кометы	. 122
0	Комета Лекселя 123.—Комета Біела 130.	
8.	Періодическія кометы, появлявшіяся только один	
	разъ	. 140
9.	Группировка періодических кометь около боль	
	шихъ планетъ. Въроятное существование занеп	[-
	тунной планеты	. 143
	0. п. глазенацъ.	19

		CTPAH.
4.1		эгран.
41.	Движеніе семьи кометь до вступленія въ предълы	
	Солнечной системы	209
42.	Движеніе семьи кометь, орбиты которыхъ имъють	
	общую ось	210
43.	Комета и туманное пятно	214
	Косы кометы Донати 1858 г	219
45.	Ө. А. Бредихинъ, профессоръ Московскаго Универ-	
	ситета, б. директоръ Пулковской обсерваторіи.	231
46.	Типы кометныхъ косъ	237
	Изломанная коса кометы 1908 г	239
	Движеніе кометнаго вещества по направленію къ	
-0.	Солнцу	241
49	Профессоръ Московскаго Университета П. Н. Ле-	
10.	бедевъ	<b>24</b> 3
50.	I. В. Скіапарелли	263
	Погружение Земли въ косу кометы 1861 II	
	1.0	
	РИСУНКИ НА ОТДЪЛЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ.	
τ	Семья Юпитеровыхъ кометъ	145
	. Большая комета Донати	169
	Большая комета 1843 г	177
	Комета Морхауза 1908 г. (для стереоскопа)	193
V.	Голова кометы Донати	241



Книга для подарковъ и для раздачи въ награду.

## ДРУЗЬЯМЪ И ЛЮБИТЕЛЯМЪ АСТРОНОМІИ

ЗАСЛУЖЕННАГО ОРДИНАРНАГО ПРОФЕССОРА

#### с. п. глазенапа

Со многими рисунками, портретами и звъздными картами.

Первое изданіе удостовно Русскимъ Астрономическимъ Обществомъ полной преміей имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Первое и второе изданія признаны Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. заслуживающимъ вниманія при пополненіи ученическихъ бабліотекъ и для раздачи въ награду.

#### ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

СОДЕРЖАНІЕ: Предисловіе.— І. Звѣздное небо.— ІІ. Координаты небесных в свѣтилъ.— ІІІ. Звѣздное, истинное и среднее время. — ІV. Звѣздныя карты и небесный глобусъ. — V. Созвѣздія.— VI. Солнечное кольцо—простѣйшій приборъ для опредѣленія времени.— VIII. Бинокль въ астрономическихъ наблюденіяхъ. — VIII. Перемѣнныя звѣзды.— ІХ. Новыя звѣзды.— Х. Замѣчательныя кометы.— XII. Розысканіе кометъ.— XII. Рисованіе косъ блестящихъ кометь.— XIII. Падающія звѣзды.— XVI. Болиды.— XV. Небесные камни.— XV. Млечный путь.— XVII. Мерцаніе звѣздъ. — XVIII. Игра Солнца.

Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 35 к.; нал. плат. 2 р. 45 к.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ «Новаго Времени», Невскій, 40, и у автора, В. О. Биржевая л., № 18, въ С.-Петербургѣ. гг. иногородные выписываютъ отъ автора.

### ТАБЛИЦЫ ЛОГАРИӨМОВЪ

СЪ ПЯТЬЮ ДЕСЯТИЧНЫМИ ЗНАКАМИ,

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ДРУГИХЪ ТАБЛИЦЪ, УПРОЩАЮЩИХЪ ВЫЧИСЛЕНІЯ.

Составиль Заслуженный Ординарный Профессорь С. ГЛАЗЕНАП Ъ

Допущены Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. въ качествъ пособія для среднихъ учебныхъ заведеній. Рекомендованы Въдомствомъ Учрежденій Императрицы Маріи въ качествъ

учебнаго пособія. Допущены въ качествъ учебнаго пособія въ среднихъ техническихъ учили-

шахъ

Одобрены Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сунодъ въ качествъ пособія для духовных в Семинарій.

#### ИЗДАНІЕ СТЕРЕОТИПНОЕ.

Цъна 85 коп., въ англійскомъ переплеть 1 руб.

Таблицы логариемовъ Профессора Глазенана заключають нікоторыя особенности, имъюція практическое значеніе:

1) Всъ таблиры составлены съ однимъ входомъ.

2) Во всъхъ таблицахъ даны разности логариемовъ. 3) Даны неличины, значительно облегчающія вычисленіе логариемовъ синусовъ и тангенсовъ малыхъ угловъ.
4) Даны логариемы суммъ и разностей (Гауссовы логариемы).

Складъ изданія въ книжномъ магазинъ «Новаго Времени», Невскій, № 40, и у автора С.-Петербургъ, В. О. Виржевая л., № 18.

### ВО ВСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ продается руководство

### КОСМОГРАФІЯ

Заслуженнаго Ординарнаго Профессора

С. П. ГЛАЗЕНАПА.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвъщенія допущена вы качествъ руководства для среднихъ учебныхъ заведеній.

Отличительнымъ признакомъ этого учебника является краткость изложенія въ связи съ совершенной ясностью, а извѣстно, что послѣднее условіе является наиболѣе трудно выполнимымъ въ трудахъ подобнаго рода. Въ книгѣ проф. Глазенапа нѣтъ утомительныхъ и мало существенныхъ деталей, но все дѣйствительно важное приведено и притомъ съ такою выпуклостью, при которой прочитанное неизбѣжно должно запечатлѣться въ памяти ученика. (Изъ отзыва В. В. Стратонова, разосланнаго при циркулярахъ Кавказскаго Учебнаго Округа).

Съ 118 рисунками въ текстъ.

"Космографія" Профессора С. Глазенана является пучшимъ руководствомъ пля самообразованія.

#### Цѣна 1 рубль

Складъ изданія въ книжномъ магазняѣ «Новаго Времени», Невскій, № 40, и у автора, С.-Петербургъ, В. О., Биржевая л., № 18.

# солнечное кольцо.


Проствйний инструменть для точнаго опредвления времени по соотвътствующимъ высотамъ Солнца.

Заслужевнаго Ординарнаго Профессора Императорскаго С.-Петербургскаго Университета

#### С. П. ГЛАЗЕНАПА.

С.-Петербургъ, В. О. Биржевая л., № 18.

**Солнечное Кольцо** Профессора Глазенапа представляетъ возможность просто провърить часы и легко получить весь-



ма точную ихъ поправку, т. е. опредълить, насколько они идутъ впередъ или отстаютъ. Употребленіе Солнечнаго Кольца основано на наблюсеніи Солнца на равныхъ высотахъ и не требуетъ особыхъ спеціальныхъ знаній. Точность въ опредъленіи времени, получаемая при помощи Солнечнаго Кольца, достилать ± 1,0 секунды времени, а при нъкоторомъ навыкъ получается большая точность.

Солнечное Кольцо является наиболье общедоступнымъ приборомъ для цълей опредъленія времени и заслуживаетъ самаго широкаго распространенія въ шко-

лъ, въ метеорологическихъ обсерваторіяхъ, среди любителей астрономіи и селькихъ хозяевъ.

Цѣна 17 руб.; съ упаковкой и пересылкой въ Европейской Россіи 17 р. 80 к. (за 3 фунта); налож. платеж. 18 р. 15 к. Объяснительная брошюра 30 к.