

## О гипотезе Локетта для классов Фиттинга конечных групп

Е.Н. Залесская, Ж.П. Макарова

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машиерова»

Класс Фиттинга  $F$  назовем классом Локетта, если имеет место  $F = F^*$ , где  $F^*$  – наименьший из классов Фиттинга, содержащий класс Фиттинга  $F$  такой, что  $(G \times H)_{F^*} = G_{F^*} \times H_{F^*}$  для всех групп  $G$  и  $H$ . Класс Фиттинга  $F$  удовлетворяет гипотезе Локетта, если справедливо равенство  $F^* = F^* \cap \mathcal{S}_*$ . Доказано, что если  $F = (\mathcal{S}_{PR})_* \gamma$ , где  $\gamma$  – такой локальный класс Фиттинга, что  $\mathcal{S}_{PR} \cap \gamma = (1)$ , то  $F$  удовлетворяет гипотезе Локетта и не является классом Локетта. Доказано также, что если  $\mathfrak{H} = F_* \gamma_i$ , где  $F$  – конструкция класса Фиттинга, предложенная Бергером и Косси,  $\{\gamma_i \mid i \in I\}$  – семейство насыщенных радикальных гомоморфов таких, что  $\gamma_i \cap \gamma_j = (1)$ ,  $\bigcup_{i \in I} \gamma_i = \mathfrak{E}$ , то найдется такое  $i \in I$ , что класс Фиттинга  $\mathfrak{H}$  не удовлетворяет гипотезе Локетта.

**Ключевые слова:** класс Фиттинга, класс Локетта, гипотеза Локетта, локальный класс Фиттинга, формация, радикальный гомоморф.

## On Lockett conjecture for Fitting classes of finite groups

E.N. Zalesskaya, Zh.P. Makarova

Educational establishment «Vitebsk State University named after P.M. Masherov»

By Lockett class we shall mean Fitting class  $F$  if  $F = F^*$  is valid, where  $F^*$  – the least out of Fitting classes that contains such Fitting class  $F$  that the equation  $(G \times H)_{F^*} = G_{F^*} \times H_{F^*}$  is valid for all  $G$  and  $H$  groups. Fitting class  $F$  meets Lockett conjecture if the equation  $F_* = F^* \cap \mathcal{S}_*$  is valid. It is proved that if  $F = (\mathcal{S}_{PR})_* \gamma$ , where  $\gamma$  – local Fitting class is such that  $\mathcal{S}_{PR} \cap \gamma = (1)$ , then  $F$  meets Lockett conjecture and is not Lockett class. It is also proved that if  $\mathfrak{H} = F_* \gamma_i$ , where  $i \in I$  and  $F$  – Fitting class construction proposed by Berger and Cossey and  $\{\gamma_i \mid i \in I\}$  – a family of saturated radical homomorphs such that  $\gamma_i \cap \gamma_j = (1)$ ,  $\bigcup_{i \in I} \gamma_i = \mathfrak{E}$ , then there will appear such  $i \in I$  that Fitting class  $\mathfrak{H}$  does not meet Lockett conjecture.

**Key words:** Fitting class, Lockett class, Lockett conjecture, local Fitting class, formation, radical homomorph.

Все рассматриваемые в работе группы конечны.

Классическими объектами исследования в теории классов групп и ее приложениях являются разрешимые группы. Более полутора вековая история развития теории разрешимых групп связана с крупнейшими достижениями в этой области.

Со второй половины 1960-х годов важное место в теории разрешимых групп стали занимать исследования, связанные с классами Фиттинга. Напомним, что классом Фиттинга (или радикальным классом) называется класс групп, замкнутый относительно нормальных подгрупп и их произведений.

Впервые классы Фиттинга упоминаются в статье Фишера [1] в 1966 году. В статье Фишера, Гашюца, Хартли [2] впервые рассматриваются классы Фиттинга конечных групп. В первой статье (1966 г.) классы Фиттинга были вве-

дены двойственным образом к формациям – классам групп, замкнутым относительно фактор-групп и относительно подпрямого произведения. Классы Фиттинга замкнуты относительно нормальных подгрупп и прямого произведения нормальных  $\times$ -подгрупп. Двойственность заключалась в том, что определение классов Фиттинга получалось из определения формаций заменой фактор-групп на нормальные подгруппы. Ввиду двойственности формацию называют корадикальным классом (класс Фиттинга – радикальный класс). Двойственность наблюдается и в теории  $F$ -проекторов (формации) и  $F$ -инъекторов (классы Фиттинга).

Следует отметить, что сам термин «класс Фиттинга» возник исходя из долгосрочной программы структурного анализа конечных групп, предложенной в 1938 году Х. Фиттингом, в которой впервые систематически использовался нильпотентный радикал групп. В дальнейшем

классы Фиттинга стали рассматриваться и как самостоятельные объекты изучения.

В 70-е годы XX века сформировался ряд проблем, связанных с построением структурной теории классов Фиттинга. Среди них центральное место занимала общая проблема определения структуры класса Фиттинга, известная в теории классов групп под названием «гипотеза Локетта». Ее возникновение обусловлено результатами Блессеноля–Гашюца [3] и Локетта [4], которые в терминах радикалов определили два обширных семейства классов Фиттинга: нормальные классы и классы, которые в дальнейшем стали называть классами Локетта.

Напомним, что нормальный класс Фиттинга – такой класс Фиттинга  $F$ , у которого в любой группе  $G$  ее  $F$ -радикал  $G_F$  является  $F$ -максимальной подгруппой  $G$ , и что каждому непустому классу Фиттинга  $F$  Локетт [4] сопоставляет класс  $F^*$ , который определяется как наименьший из классов Фиттинга, содержащий  $F$  такой, что для всех групп  $G$  и  $H$  справедливо равенство  $(G \times H)_{F^*} = G_{F^*} \times H_{F^*}$ , и класс  $F_*$  как пересечение всех таких классов Фиттинга  $\chi$ , для которых  $\chi^* = F^*$ . Класс Фиттинга  $F$  называют классом Локетта [4], если  $F = F^*$ .

**Гипотеза Локетта [4].** Каждый ли класс Фиттинга  $F$  определяется как пересечение некоторого нормального класса Фиттинга и класса Локетта, порожденного  $F$ ?

Класс Фиттинга  $F$ , удовлетворяющий гипотезе Локетта, будем называть  $\mathcal{L}$ -классом. Если же класс  $F$  не является  $\mathcal{L}$ -классом, то мы будем называть его  $\overline{\mathcal{L}}$ -классом.

Примечателен тот факт, что первоначально гипотеза Локетта была подтверждена для следующих отдельных случаев локального класса Фиттинга: наследственного (Брайс, Косси, 1975 г., [5]), классов вида  $XN$ ,  $XS\pi\pi R$  (Бейдлеман, Хаук, 1979 г., [6]), классов вида  $X(\cap \pi \pi \pi R)$  (Дерк, Хоукс, 1992 г., [7]). Для произвольных локальных классов Фиттинга указанная гипотеза подтверждена в разрешимом случае в 1988 году Н.Т. Воробьевым [8] и в произвольном случае в 1996 году Галледжи [9]. Кроме того, Е.Н. Залесской совместно с Н.Т. Воробьевым [10] была подтверждена гипотеза Локетта для  $\omega$ -локальных классов Фиттинга заданной характеристики, причем эти классы являлись классами Локетта. Вместе с тем Бергер и Косси [11] установили, что это предположение неверно для нелокальных классов Фиттинга.

Заметим, что семейство классов Локетта обширно: оно содержит наследственные и обобщенно наследственные классы Фиттинга (классы Фишера), а также классы Фиттинга, замкнутые относительно гомоморфных образов или конечных подпрямых произведений (в частности, формации Фиттинга).

Ввиду результата Дерка и Хоукса Х.6.1 [7] естественно следующее обобщение гипотезы Локетта и понятия  $\mathcal{L}_\chi$ -класса.

**$\mathcal{L}_\chi$ -гипотеза.** Пусть  $\chi$  и  $F$  – классы Фиттинга, причем  $F \subseteq \chi$ . Класс Фиттинга  $F$  удовлетворяет гипотезе Локетта в  $\chi$ , если справедливо равенство

$$F_* = F^* \cap \chi_*.$$

Класс Фиттинга  $F$  тогда мы будем называть  $\mathcal{L}_\chi$ -классом.

Однако проблема описания классов Фиттинга, не являющихся классами Локетта и удовлетворяющих гипотезе Локетта, остается по-прежнему актуальной. В данной работе описаны новые классы Фиттинга, не являющиеся классами Локетта и удовлетворяющие гипотезе Локетта, а также построен новый контрпример к гипотезе Локетта.

## 1. Вспомогательные результаты

**Теорема 1.1** [4, с. 164]. Если  $F$  – некоторый класс Фиттинга и  $\chi$  – насыщенный радикальный гомоморф, то  $(F\chi)^* = F^*\chi$ .

**Теорема 1.2** [7, с. 682]. Пусть  $\chi$  и  $\gamma$  – классы Фиттинга. Справедливы следующие утверждения:

- 1) если  $\chi \subseteq \gamma$ , то  $\chi^* \subseteq \gamma^*$  и  $\chi_* \subseteq \gamma_*$ ;
- 2)  $(\chi_*)_* = \chi_* = (\chi^*)_* \subseteq \chi \subseteq \chi^* = (\chi_*)^* = (\chi^*)^*$ ;
- 3)  $F \subseteq F_* \mathfrak{A}$ ;

4) если  $\mathfrak{F}_i \mid i \in I$  – множество непустых классов Фиттинга, то  $(\bigcap_{i \in I} F_i)^* = \bigcap_{i \in I} F_i^*$ .

**Теорема 1.3** [7, с. 757]. Пусть  $p$  и  $q$  – различные простые числа. Тогда  $\mathcal{S}_q \mathcal{S}_p \not\subseteq \mathcal{S}_*$ .

**Теорема 1.4** [7, с. 762]. Класс Фиттинга  $F$  удовлетворяет гипотезе Локетта тогда и только тогда, когда  $F_* = F^* \cap \mathcal{S}_*$ .

**Теорема 1.5** [12, с. 106]. Пусть классы Фиттинга  $\chi$  и  $\gamma$  таковы, что  $\chi$  является  $\mathcal{L}$ -классом, а  $\gamma$  – насыщенная радикальная формация, тогда если класс  $\chi^* \gamma$  является  $\mathcal{L}$ -классом, то и класс  $\chi_* \gamma$  является  $\mathcal{L}$ -классом.

## 2. О гипотезе Локетта для классов Фиттинга, не являющихся классами Локетта

Проблема описания классов Фиттинга, удовлетворяющих гипотезе Локетта и не являющихся классами Локетта, остается по-прежнему актуальной. Следующая теорема доказана в классе  $\mathcal{S}$  всех конечных разрешимых групп.

**Теорема 2.1.** Пусть  $F = (\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon$ , где  $\Upsilon$  – локальный класс Фиттинга такой, что  $\mathcal{S}_{PR} \cap \Upsilon = (1)$ . Тогда  $F$  –  $\mathcal{L}$ -класс, который не является классом Локетта.

**Доказательство.** Так как  $\mathcal{S}_{PR}$  и  $\Upsilon$  – локальные классы Фиттинга, то из того, что произведение локальных классов Фиттинга является локальным классом Фиттинга,  $\mathcal{S}_{PR} \Upsilon$  является  $\mathcal{L}$ -классом. Но  $\mathcal{S}_{PR}$  – класс Локетта, следовательно,  $(\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon$  является  $\mathcal{L}$ -классом. Таким образом, по теореме 1.5, ввиду того, что  $\mathcal{S}_{PR}$  –  $\mathcal{L}$ -класс,  $\Upsilon$  – насыщенная радикальная формация,  $(\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon$  также является  $\mathcal{L}$ -классом.

Остается показать, что класс  $F$  не является классом Локетта, т.е., что  $F \neq F^*$ .

Если предположить, что  $F$  – класс Локетта, то  $(\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon = ((\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon)^*$ .

Но тогда учитывая, что  $\Upsilon$  – насыщенная радикальная формация, то по теоремам 1.2 и 1.1 имеем

$$((\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon)^* = ((\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon)^* \Upsilon = (\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon = \mathcal{S}_{PR} \Upsilon$$

и справедливо равенство  $\mathcal{S}_{PR} \Upsilon = (\mathcal{S}_{PR})_* \Upsilon$ .

Так как  $\mathcal{S}_{PR}$  является  $\mathcal{L}$ -классом, то  $(\mathcal{S}_{PR})_* = \mathcal{S}_{PR} \cap \mathcal{S}_*$ .

Следовательно,  $(\mathcal{S}_{PR} \cap \mathcal{S}_*) \Upsilon = \mathcal{S}_{PR} \Upsilon$ .

Но тогда ввиду того, что  $\Upsilon$  – насыщенная радикальная формация, следует, что

$$(\mathcal{S}_{PR} \cap \mathcal{S}_*) \Upsilon = \mathcal{S}_{PR} \Upsilon \cap \mathcal{S}_* \Upsilon.$$

Значит,  $\mathcal{S}_{PR} \Upsilon \cap \mathcal{S}_* \Upsilon = \mathcal{S}_{PR} \Upsilon$ , и поэтому  $\mathcal{S}_{PR} \Upsilon \subseteq \mathcal{S}_* \Upsilon$ .

Очевидно, что  $\mathcal{S}_{PR} \subseteq \mathcal{S}_* \Upsilon$ .

Следовательно, справедливо включение:

$$\mathcal{S}_{PR} \cap \mathcal{S}_* \mathcal{S}_{PR} \subseteq \mathcal{S}_* \Upsilon \cap \mathcal{S}_* \mathcal{S}_{PR}.$$

Ясно, что  $\mathcal{S}_{PR} \cap \mathcal{S}_* \mathcal{S}_{PR} = \mathcal{S}_{PR}$  и  $\mathcal{S}_* \Upsilon \cap \mathcal{S}_* \mathcal{S}_{PR} = \mathcal{S}_* (\Upsilon \cap \mathcal{S}_{PR}) = \mathcal{S}_*$ , так как  $\Upsilon \cap \mathcal{S}_{PR} = (1)$  по условию.

Следовательно,  $\mathcal{S}_{PR} \subseteq \mathcal{S}_*$ .

Последнее противоречит тому, что по теореме 1.3  $\mathcal{S}_{PR} \not\subseteq \mathcal{S}_*$ . Значит, наше предположение неверно и класс Фиттинга  $F$  не является классом Локетта.

Теорема доказана.

## 3. Контрпример к гипотезе Локетта

В работе [11] Бергером и Косси доказано существование классов Локетта, которые не являются классами Фишера (в частности, нелокальны) и для которых гипотеза Локетта неверна.

В работе [12] было доказано, что не каждый разрешимый  $r$ -локальный класс Фиттинга является  $\mathcal{L}$ -классом. В данном разделе с помощью указанных результатов мы построим новый пример разрешимого класса Фиттинга, опровергающий гипотезу Локетта.

Для построения таких классов будем использовать конструкцию класса Фиттинга, предложенную Бергером и Косси [11].

Пусть  $R$  – экстраспециальная группа порядка 27 и экспоненты 3 и  $W$  – точный неприводимый  $R$ -модуль над полем  $GF(7)$  размерности 3. И пусть  $Y = WR$ . Обозначим через  $A$  группу автоморфизмов группы  $R$ . Пусть  $B = C_A(Z(R))$ ,  $Q$  – подгруппа кватернионов группы  $B$  и  $X = Z(Q)Y$ .

Следуя [11], определим класс  $F$  следующим образом:

$$F = (G \mid O_2(G|O_{(2,3)}(G)) \in \mathcal{S}_n D_0(X)) \cap \mathcal{S}_7 \mathcal{S}_3 \mathcal{S}_2,$$

где  $D_0(X)$  – класс всех конечных прямых произведений изоморфных копий группы  $X$ .

В работе [11] доказано, что класс  $F$  является классом Локетта и не удовлетворяет гипотезе Локетта [7, с. 773]). Нами в классе  $\mathcal{S}$  всех конечных разрешимых групп доказана следующая теорема.

**Теорема 3.1.** Пусть  $H = F_* \Upsilon_i$ , где  $i \in I$  и  $F$  – конструкция класса Фиттинга, предложенная Бергером и Косси в [10] и  $\{\Upsilon_i \mid i \in I\}$  – семейство насыщенных радикальных гомоморфов таких, что  $\Upsilon_i \cap \Upsilon_j = (1)$ , а  $\bigcup_{i \in I} \Upsilon_i = \mathcal{E}$ . Тогда найдется такое  $i \in I$ , что класс Фиттинга  $H$  не удовлетворяет гипотезе Локетта.

**Доказательство.** Методом от противного. Предположим, что для каждого  $i \in I$  класс Фиттинга  $F_* \Upsilon_i$  является  $\mathcal{L}$ -классом. Тогда согласно теореме 1.4  $(F_* \Upsilon_i)_* = (F_* \Upsilon_i)^* \cap \mathcal{S}_*$  для каждого  $i \in I$ .

Так как  $\Upsilon_i$  – насыщенный радикальный гомоморф для любого  $i \in I$ , а  $F_*$  – класс Фиттинга,

то по теореме 1.2 имеем  $(F_* \gamma_i)^* = (F_*)^* \gamma_i$  для каждого  $i \in I$ .

По второму утверждению теоремы 1.2 получим:  $(F_* \gamma_i)^* = (F_*)^* \gamma_i = F_*^* \gamma_i$  для каждого  $i \in I$ .

Тогда, так как  $F_* \gamma_i$  для каждого  $i \in I$  является  $\mathcal{L}$ -классом (по предположению) и, учитывая последнее равенство, получаем:

$$\begin{aligned} \bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* &= \bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)^* \cap S_* = \bigcap_{i \in I} ((F_* \gamma_i)^* \cap S_*) \\ &= \bigcap_{i \in I} (F_*^* \gamma_i \cap S_*) = \bigcap_{i \in I} (F_*^* \gamma_i) \cap S_*. \end{aligned}$$

Так как

$$\bigcap_{i \in I} \gamma_i = (1), \text{ то } \bigcap_{i \in I} (F_*^* \gamma_i) \cap S_* = F_*^* \cap S_*.$$

Окончательно имеем  $\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* = F_*^* \cap S_*$ .

Докажем теперь, что  $\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* = F_*$ .

Ввиду утверждения 2 теоремы 1.2 имеем  $(F_* \gamma_i)_* \subseteq F_* \gamma_i$  для каждого  $i \in I$ . Следовательно,

$$\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* \subseteq \bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i) = F_* \left( \bigcap_{i \in I} \gamma_i \right) = F_*.$$

Таким образом,  $\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* \subseteq F_*$ .

С другой стороны,  $F_* \subseteq F_* \gamma_i$  для каждого  $i \in I$ . Тогда по утверждению 1 теоремы 1.2

$$(F_*)_* \subseteq (F_* \gamma_i)_*$$

для каждого  $i \in I$ .

По второму утверждению теоремы 1.2  $(F_*)_* = F_*$ , тогда  $F_* \subseteq (F_* \gamma_i)_*$  для каждого  $i \in I$ . Следовательно,  $F_* \subseteq \bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_*$ .

Таким образом, из включений  $\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* \subseteq F_*$  и  $F_* \subseteq \bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_*$  следует, что  $\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* = F_*$ .

Из равенств  $\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i) \cap S_* = F_*^* \cap S_*$  и  $\bigcap_{i \in I} (F_* \gamma_i)_* = F_*$  следует, что  $F_*^* \cap S_* = F_*$ .

Ввиду результата Бергера–Косси [11] это противоречит тому, что  $F$  является  $\bar{\mathcal{L}}$ -классом.

Следовательно, наше предположение неверно, и существует такое  $i \in I$ , что класс  $F_* \gamma_i$  является  $\bar{\mathcal{L}}$ -классом.

Теорема доказана.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Fischer, B. Klassen konjugierter Untergruppen in endlichen auflösbaren Gruppen / B. Fischer. – Habilitationsschrift, Universität Frankfurt (M). – 1966.
2. Fischer, B. Injektoren endlicher auflösbarer Gruppen / B. Fischer, W. Gaschutz, B. Hartley // Math. Z. – 1967. – Bd. 102, № 5. – S. 337–339.
3. Bleszenohl, D. Über normal Schunk und Fittingklassen / D. Bleszenohl, W. Gaschutz // Math. Z. – 1970. – Bd. 148, № 1. – S. 1–8.
4. Lockett, P. The Fitting class  $F^*$  / P. Lockett. – Math. Z. – 1974. – Vol. 137, № 2. – P. 131–136.
5. Bryce, R.A. A problem in Theory of normal Fitting classes / R.A. Bryce, J. Cossey // Math. Z. – 1975. – Vol. 141, № 2. – P. 99–110.
6. Beidleman, J.C. Über fittingklassen und Lockett-Vermutung / J.C. Beidleman, P. Hauck // Math. Z. – 1979. – Bd. 167, № 2. – S. 161–167.
7. Doerk, K. Finite solvable groups / K. Doerk, T. Hawkes // Walter de Gruyter. – 1992. – N. Y.–Berlin. – 891 p.
8. Воробьев, Н.Т. О радикальных классах конечных групп с условием Локетта / Н.Т. Воробьев // Матем. заметки. – 1988. – Т. 43, № 2. – С. 161–168.
9. Gallego, M.P. Fitting pairs from direct limits and the Lockett conjecture / M.P. Gallego // Comm. Algebra. – 1996. – Vol. 24, № 6. – P. 2011–2023.
10. Залеская, Е.Н. Классы Фиттинга с заданными свойствами функций Хартли / Е.Н. Залеская. – Гомель, 2003. – 45 с. – (Препринт / Гомельск. гос. ун-т имени Ф. Скорины; № 60).
11. Berger, T.R. An example in the theory of normal Fitting classes / T.R. Berger, J. Cossey // Math. Z. – 1977. – Bd. 154. – S. 287–293.
12. Воробьев, Н.Т. О проблемах структуры классов Фиттинга / Н.Т. Воробьев, Е.Н. Залеская, Н.Н. Воробьев // Весн. Віцебск. дзярж. ун-та. – 2007. – № 2(44). – С. 105–108.

Поступила в редакцию 23.10.2012. Принята в печать 14.12.2012

Адрес для корреспонденции: e-mail: alenushka0404@mail.ru – Залеская Е.Н.