

НАХОДКИ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ В 2013 ГОДУ

**Ю.И. Высоцкий, В.М. Коцур, С.Э. Латышев,
В.П. Мартыненко, Л.М. Мерзвинский, И.И. Шимко**
ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, e-mail: yura-v@tut.by

Сегодня нами ведется работа по созданию на основе современных технологий базы данных о местах произрастания и состоянии популяций редких и охраняемых видов растений. База создается путем нанесения GPS координат на карту при проверке состояния ранее известных популяций, а также при обнаружении новых мест произрастания.

В 2013 г. проводилось изучение флоры и растительности на территории Витебского, Городокского, Россонского, Сенненского и Шумилинского районов. Флора обследованных участков отличается наличием комплекса редких и охраняемых видов.

EN – II категория охраны: исчезающие виды

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – Хаммарбия болотная.

1. Россонский р-н, Заборское л-во, окрестности д. Гришино, 5,8 км на север, лесная дорога на оз. Ямно. Западный берег оз. Язьменка, (14.08.13 г., т.692: 55°58'35,1''N, 29°14'58,0''E). Биотоп: сплавинный берег среди болотных сосен по сфагнуму на клюквеннике. Здесь же встречается пальчатокоренник (*Dactylorhiza* sp.).

NT - IV категория охраны: потенциально уязвимые виды

Iris sibirika L. – Ирис сибирский.

Шумилинский р-н, д. Коновалово, (02.08.13 г., т.655: 55°39'50,9''N, 29°41'57,8''E). Биотоп: зарастающий луг на окраине деревни, спорадически вдоль поймы озера Оболь (разливы).

Hyperzia selago (L.) Bernh – Баранец обыкновенный.

1. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, 5,8 км на север. С-З берег оз. Ямно (14.08.13 г., т.692: 55°59'10,9''N, 29°14'37,0''E). Биотоп: ельник с серой ольхой по склону озерной котловины, 13 локалитетов по 1-2 м².

2. Россонский р-н, окрестности д. Перевоз, 3,7 км на восток. Ю-В берег оз. Норина (15.08.13 г., т.694-697: 55°55'48,9''N, 29°27'48,6''E). Биотоп: ельник с серой ольхой по склону озерной котловины, 4 локалитета по 1-2 м² на удалении 100-200 м.

3. Шумилинский р-н, окрестности ж.д. станции Оболь 3,2 км к С (на территории республиканского заказника «Козьянский» (02.10.13 г.: N55°23'29,43'', E29°17'17,69'')). Биотоп: мелколиственный лес с примесью ели и широколиственных пород (липа, клен), 2 локалитета по 0,5 м².

Linnaea borealis L. – Линнея северная.

1. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, лесная дорога на оз. Ямно по правой стороне, (14.08.13 г., т.657: 55°58'08,8''N,

29°14'18,1''E). Биотоп: зрелый ельник с примесью сосны. Территория республиканского ландшафтного заказника «Синьша»

2. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, лесная дорога на оз. Ямно по правой обочине напротив оз. Язьменка, куртина 5х5м (14.08.13 г., т.686: 55°58'48,1''N, 29°14'54,9''E). Биотоп: зрелый ельник с примесью сосны.

Lycopodiella inundata (L.) Holub – Плауночек заливаемый.

Сенненский район, Осиновское л-во, окрестности д. Щитовка, 1,2 км к С популяция 150х30м (16.07.13 г., 54°53'15,84''N, 30°23'07.45''E). Биотоп: сырые зарастающие песчаные почвенные обнажения под ЛЭП и на просеке над газопроводом. Довольно плотные заросли совместно с кукушкиным льном, росянкой и вереском.

Виды, внесенные в список растений и грибов, нуждающихся в профилактической охраны

Betula humilis Schrank – Берёза низкая.

1. Шумилинский р-он, Шумилинское л-во, окрестности д. Городно, 0.5 км на восток, западный берег оз. Лезвинка (02.08.13 г., т.653: 55°26'41,4''N, 29°34'48,8''E). Биотоп: зарастающая кустарником и тростником сплавина в 100-200 м от воды, спорадически.

2. Россонский р-н, Заборское л-во, окрестности д. Гришино, лесная дорога на оз. Ямно. Западный берег оз. Язьменка (14.08.13 г., т.688: 55°58'41,6''N, 29°14'57,5''E). Биотоп: закустаренный участок сплавины, спорадически, на открытых местах.

3. Россонский р-н, окрестности д. Перевоз, 3,7км на восток. Ю-В берег оз. Норино (15.08.13 г., т.697: 55°55'47,7''N, 29°27'51,6''E). Биотоп: закустаренный участок сплавины, спорадически.

4. Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино, от Ю-З оконечности оз. Белое вдоль квартальной просеки на оз. Исса (21.08.13 г., 55°49'03,4''N, 29°51'44,8''E). Биотоп: заболоченный сосново-березовый лес, спорадически, на открытых местах.

5. Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино, южная оконечность оз. Черное (21.08.13 г., 55°49'35,6''N, 29°52'22,3''E). Биотоп: Закустаренная сплавина, спорадически по границе кустарника и клюквенника до реки Чернуя.

6. Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино, на пешейке между озерами Белое и Черное южный берег восточного плеса оз. Черное (18.06.13 г., 55°50'13,2''N, 29°53'86,2''E). Биотоп: Заболоченный черноольшаник.

Empetrum nigrum L. – Водяника черная.

1. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, 5,8 км на север, лесная дорога на оз. Ямно. Западный берег оз. Язьменка, (14.08.13 г., т.692: 55°58'35,1''N, 29°14'58,0''E). Биотоп: сплавинный берег, спорадически по сфагнуму на клюквеннике.

2. Россонский р-н, окрестности д. Перевоз, 3,7 км на восток. Ю-В берег оз. Норино (15.08.13 г., т.694-697: 55°55'48,9''N, 29°27'48,6''E). Биотоп: сплавинный берег, спорадически по сфагнуму на клюквеннике.

Digitalis grandiflora Mill. – Наперстянка крупноцветковая.

Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино. Ю-З берег оз. Черное, южный плес, перед перешейком на заброшенном хуторе (21.08.13 г., 55°50'12,2''N, 29°53'07,8''E). Биотоп: луг на опушке леса.

Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr – Хвощ пёстрый.

Шумилинский р-н, д. Тербешово, 0,5 км на Ю-З по дороге на гравийный карьер (02.08.13 г., т.644: 55°11'45,1''N, 29°48'24,0''E). Биотоп: зарастающий старый карьер.

Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка лёгочная.

1. Шумилинский р-н, д. Коновалово, 2 км на юг, вниз по р. Оболь, сразу за мостом, (02.08.13 г., т.654: 55°38'45,1''N, 29°41'55,8''E), биотоп: зарастающий луг на левом берегу, две куртины по 15-20 растений.

2. Шумилинский р-н, д. Мал. Тешелово, 0,6 км на юг по дороге на Мишутино, слева, на холмах (02.08.13 г., т.656: 55°42'15,9''N, 29°45'00,3''E). Биотоп: луг на крутых склонах маренных холмов.

3. Сенненский р-н, окр. д. Щитовка, южная оконечность деревни, за лесопилкой (18.07.13 г., 54°87'52''N, 30°38'24''E), биотоп: закустаренная мезофильная луговина, ранее используемая для выпаса скота и сенокоса.

В дальнейшем, наличие GPS координат позволит накапливать картографические данные о локализации мест произрастания охраняемых растений и вести объективный мониторинг состояния популяций на протяжении неограниченного времени.