

**СОЗОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАЛОИЗУЧЕННЫХ  
РЕДКИХ ЛИХЕНИЗИРОВАННЫХ ГРИБОВ (ЛИШАЙНИКОВ)  
РОДА *USNEA* В БЕЛАРУСИ. *USNEABARBATA* (L.) F.H. WIGG**

**В.В. Голубков**

ГрГУ имени Я. Купалы,  
г. Гродно, Беларусь, e-mail: vgolubkov@tut.by

На протяжении последних нескольких столетий учеными разных стран отмечается исчезновение лихенизированных грибов, многие из которых представлены видами рода *Usnea*, относящихся к группе одних из самых уязвимых кустисто повисающих жизненных форм. Изучение видов этого рода на территории Беларуси показало, что на сегодняшний день об их распространении можно судить только по информационным данным, которые ранее приводились и по образцам, сохранившимся в различных коллекциях. К одним из таких лишайников относится *Usneabarbata* (L.) F.H. Wigg. На территории республики этот вид впервые был собран в 1923 году А.Н. Окснером в окр. д. Медвежино (KW, №4409) под названием *Usneaplicata* (L.) Hoffm. [1]. Впоследствии, в 2005 году он был включен в список растений и грибов, вероятно, исчезнувших с территории Беларуси («Черный список»), где входил в подгруппу **A1** (виды, нахождение которых на территории республики Беларусь документировано гербарием) группы **A** (виды, которые не были найдены на протяжении 35 – 100 лет). В 1962 году под названием *Usneaprostrata* Vain. этот вид был приведен J. Motyka на территории Национального парка «Беловежская пуща» [2], а в 2005 году, под этим же названием, включен в список растений и

грибов, нуждающихся в профилактической охране[3]. В 1964 г. на территории «Беловежской пуши» под названием *Usneasilvatica* Mot. *Usneabarbata* (L.) F.H. Wigg. приводился М. Ф. Макаревич[4]. Впоследствии в 2005 г. как самостоятельный вид *Usneasilvatica* была включена в Красную книгу РБ в список растений и грибов, нуждающихся в профилактической охране[3]. В 1964 г., а затем в 1965 г. в окрестностях г. Ружаны Пружанского района Брестской области и д. Залужье Ляховичского района Гродненской области под названием *Usneascabrata* Nyl. было выявлено еще 2 местонахождения *Usneabarbata*, найденных Н.В. Горбач и Осмоловской (№82, MSK-L). В 2005 году как самостоятельный вид он был включен в список растений и грибов, нуждающихся в профилактической охране [3]. В 1983 году в окрестностях д. Каменюки Каменецкого района Брестской области территории Национального парка «Беловежская пуца» *Usneaprostrata* Vain. была зафиксирована еще в одном местонахождении (№58, MSK-L).

В 2009 согласно публикации «Key to European *Usnea* species» все вышеуказанные названия *Usneabarbata* (L.) F.H. Wigg., на территории Беларуси, ранее считавшихся самостоятельными видами, были сведены в синонимы [5]. В течение последних 30 лет, и до настоящего времени, местонахождение *Usneabarbata* (L.) F.H. Wigg. 1983 года, вероятно, следует считать последним.

В связи с редкой встречаемостью в равнинных условиях и даже в лесных поясах гор западноевропейских стран, соседствующих с республикой Беларусь, *Usneabarbata* уже стала объектом Красных Книг и Красных списков [6]. Всего, на протяжении 90 лет, под разными названиями было найдено 6 местонахождений этого вида, из которых 3 (1963 г., 1965 г., 1983 г.) известны на территории западного региона Беларуси («Беловежская пуца»), 2 (1965 г.) в юго-западной части республики (Брестская область) и 1 (1925 г.) в центральной части Беларуси (Минская область). Поэтому есть все основания рекомендовать его для включения в Список растений и грибов, вероятно, исчезнувших с территории Беларуси («Черный список») следующего 4-го издания Красной книги РБ (2015 г.).

#### Литература

1. Окснер А.Н. // Вістник Київського Ботанічного саду. 1925. Вып. 3. С. 33-34.
2. Motyka J.W. Porosty (Lichens). - Warszawa, 1962. - Т. 5. Cz. 2. - 253 s.
3. Красная книга Республики Беларусь: растения. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений. Официальное издание. Гл. редколлегия: Л. И. Хоружик (предс.), Л. М. Суцень, В. И. Парфенов и др. Минск: БелЭн, 2005.
4. Макаревич М.Ф., // Ботан. материалы отд. споровых растений Ботан. ин-та им. Комарова. 1960. Т. 13. С. 25-29.
5. Tiina Randlane, Tiit Tõrra, Andres Saag & Lauri Saag // *Bibliotheca Lichenologica*, 2009 (100).— 419–462.