

В.И. Пискунов

## Три редких вида выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) палеарктической фауны

Просмотр коллекции выемчатокрылых молей Биологического музея Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова выявил три редких вида этого семейства, один из которых оказался новым для фауны Беларуси. Ниже приведена подробная информация об этих видах, относящихся к подсемейству Gelechiinae Stt. Все определения принадлежат автору; коллекционные этикетки цитируются в подлинниках. За присылку оттисков отдельных лепидоптерологических работ автор признателен А.В. Бидзиле (Национальный университет им. Т.Г. Шевченко, Киев, Украина) и Н.В. Савенкову (Музей природы Латвии, Рига, Латвия).

### Триба Gnorimoschemini Povolnэ, 1964

1. *Scrobipalpula ramosella* (Müller – Rutz, 1934). Видовая синонимика опубликована [1]. «Мало – Курильские о-ва, о. Шикотан, склоны г. Шикотан, в окр. Мало – Курильска, 22.8.1971, Ю. Костюк», 1 самец, микропрепарат в сахаре, при монтированном насекомом. Распространение [1]: Западная Европа (Швейцария, Греция). Для Азии, России, Дальнего Востока России и Курильских островов указывается впервые. Хортофил, минер; гусеницы на *Erigeron* sp., *Centaurea pindicola*, *Achillea holosericea* [1]. В литературе изображались имаго [1] и гениталии [1,2] этого вида.

2. *Scrobipalpula tussilaginis* (Stainton, 1867). История описания вида и его синонимика обсуждались [1]. «Витебск, Белоруссия, Пискунов, 12.VII.1969, кошение (по траве), опушка парка», 1 самец, микропрепарат в глицерине № 278. Распространение [1]: Западная Европа (Великобритания, Франция, Нидерланды, Германия, Швейцария, Австрия, Польша, Италия, Венгрия, Греция); Турция. Для Беларуси указывается впервые, в списке видов чешуекрылых этого семейства [3] данный вид нужно поместить между видами № 30 и № 31; род *Scrobipalpula* Pov. в фауне республики теперь представлен двумя видами, а всего в региональной фауне сейчас известно 127 видов выемчатокрылых молей. Хортофил, минер; гусеницы на *Tussilago farfara* и *Petasites* sp. [1,4]. В литературе изображались имаго и гениталии [1,4] этого вида. Оба рассмотренных выше вида ранее определялись как *S. psilella* (H. – S.), так как еще совсем недавно [5] для запада Палеарктики указывался лишь этот вид, типовой для рода. Определение двух других палеарктических видов стало надежно возможным с 1998 года [1].

### Триба Teleiodini Piskunov, 1973

3. *Teleiodes fugacella* (Zeller, 1839). «Латвия, Sabile, дол. р. Abava, Солодовников, 22.VII.1998; лес: Fraxinus, Pinus», 1 самец, микропрепарат в сахаре, при монтированном насекомом. Распространение, по новой литературе [5], коллекциям Биологического музея Витебского госуниверситета, Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) и кафедры зоологии Самарского госуниверситета (г. Самара): юг и средняя полоса Западной Европы, на север до Нидерландов, Германии, Дании и Польши включительно; Ук-

раина (Донецкая область, Крым); Россия (Самарская область). Для Латвии не отмечался [5,6]; новый вид для Латвии, а также [5] стран Балтии. Дендрофил, гусеницы на *Ulmus* spp. [7]; возможно, круг кормовых растений более широкий. Включен в справочник «Вредители леса» [7]. В литературе имаго и гусеницы этого вида изображались несколько раз, в том числе в новой работе [8] по фауне микрошешуекрылых Дании.

## ЛИТЕРАТУРА

1. **Huemer P., O.Karsholt.** A review of the Old World Scrobipalpula (Gelechiidae), with special reference to central and northern Europe // *Nota lepid.*, 1998, Vol. 21, №1. P. 37-65.
2. **Sauter W.** Über einige von J.C. de la Harpe, J. Müller – Rutz und P. Weber aus der Schweiz beschriebene Kleinschmetterlinge (Lep.) // *Mitt. Schweiz. Entomol. Ges.*, 1960, Vol. 33, № 4. S. 264-274.
3. **Пискунов В.И.** Фауна выемчатокрылых молей (Lepidoptera, Gelechiidae) Беларуси // *Вестник БГУ. Сер. 2: Химия, биол., географ.*, 1997, №3. С. 39-46.
4. **Pelham-Clinton E.C.** *Scrobipalpula tussilaginis* (Frey) (Lepidoptera, Gelechiidae) new to the British isles // *Entomol. Gaz.*, 1989, Vol.40, №2. P. 103-108, pl.8.
5. **Karsholt O., T. Riedl, D. Povolný et al.** Gelechiidae // *The Lepidoptera of Europe: A Distributional Checklist*. Ed. By O. Karsholt, J. Razowski, Stenstrup, 1996. P. 103-122.
6. **Savonkov N. I. Šulcs, S. Kerppola et al.** Checklist of Latvian Lepidoptera – Latvijas Taurinu Katalogs // *Vaptria*, 1996, Vol.21, №3a. P. 1-71.
7. **Кожанчиков И.В.** Сем. Gelechiidae (=Dichomeridae) – выемчатокрылые моли // *Вредители леса: Справ. М.- Л.*, 1955, Т.1. С. 146-155.
8. **Buhl O., P. Falck, B. Jørdensen et al.** Fund af småsommerfugle fra Danmark i 1994 (Lepidoptera) // *Entomol. Medd.*, 1995, Vol. 63, 13. С. 61 – 74.

## S U M M A R Y

An annotate list of 2 rare species of tribe *Gnorimoschemini* and 1 rare species of tribe *Teleoidini* is presented. *Scrobipalpula tussilaginis* is a new species for Belarus; *S. ramosella* is a new species for Asia, Russia and Kuril Islands; *Teleiodes fugacella* is a new species for Latvia.

Поступила в редакцию 25.05.1999