

О конечных группах с копростым автоморфизмом, стабилизатор которого имеет нормальную абелеву 2-подгруппу

В работе используются стандартные обозначения и терминология, которые можно найти в [1-5].

Всюду ниже X обозначает конечную группу, допускающую автоморфизм σ простого порядка r , $(|X|, r) = 1$, $V = C_X(\sigma)$.

В теореме 9 работы [5] с использованием классификации конечных простых групп доказана разрешимость группы X , у которой $V = V_2 \times V_2$.

В данной статье без использования классификации конечных простых групп показывается, что если $V = V_2 \times V_2$ и V_2 – абелева группа, то X – разрешимая группа 2-длины 1. При этом используется классификация конечных простых групп компонентного типа (например, [6], глава 5). Для удобства необходимые факты собраны в теореме 1.

Теорема 1. ([2], теорема 9.1.11; [7], леммы 2.2, 2.3; [8], следствия 0.3, 0.4, 0.5; [9], лемма 2.12) Пусть A есть π' -группа автоморфизмов π -группы X , обладающей свойством D_σ для некоторого $\sigma \in \pi(X)$, $V = C_X(A)$. Тогда:

- 1) по крайней мере одна S_σ -подгруппа из X A -инвариантна;
- 2) любые две A -инвариантные S_σ -подгруппы из X сопряжены элементами из V ;
- 3) любая A -инвариантная σ -подгруппа из X содержится в A -инвариантной S_σ -подгруппе из X ;
- 4) если $K \triangleleft X$ и K – A -инвариантная подгруппа, то $C_{X/K}(A) = C_X(A)K/K$;
- 5) если $H \subseteq V$, то $N_X(H) = C_X(H)(N_X(H) \cap V)$;
- 6) если $u \in A$, $u^p = 1$ и H – u -инвариантная нормальная в X подгруппа, K – u -инвариантная подгруппа в X и $X = HK$, то $C_X(u) = C_H(u)C_K(u)$;
- 7) если H – A -инвариантная подгруппа из X , то $N_X(H)$ и $C_X(H)$ являются A -инвариантными подгруппами;
- 8) $X = [X, A] \cdot V$, $[X, A, A] = [X, A] \triangleleft X$; если $[X, X] = 1$, то $X = [X, A] \times V$;
- 9) если H – A -инвариантная S_σ -подгруппа из X , то $V \cap H$ – S_σ -подгруппа в V .

Лемма 1. Пусть X – r -разрешимая группа, $V = V_p \times V_p$ и V_p – абелева группа. Тогда X – r -разрешимая группа r -длины 1.

Доказательство. Если $O_p(X) \neq 1$, то в силу теоремы 1 к $X^* = X/O_p(X)$ можно применить индукцию. Тогда X^* и X будут иметь r -длину 1.

Поэтому пусть $O_p(X) = 1$. Но тогда $O_p(X) = T \neq 1$. Из r -разрешимости X следует, что X $\{p, q\}$ -отделима в смысле определения 1.15.1 из [10] для любого простого делителя q числа $|X|$. Из теоремы 1.15.1 в [10] следует, что в X существуют холловские $\{p, q\}$ -подгруппы, которые все сопряжены в X . Из леммы Фраттини тогда следует, что в X имеется u -инвариантная холловская $\{p, q\}$ -подгруппа H . Если $H \subset X$, то по индукции H имеет r -длину 1. Если q пробегает все простые делители числа $|H|$, отличные от r , то получается, что все би- p - r -подгруппы из X имеют r -длину 1. Тогда из следствия 1 в [11] следует, что и X – группа r -длины 1. Поэтому пусть $X = H$. Но тогда X – разрешимая

мая группа, а $V = V_p \times V_q$ – нильпотентная группа. Из абелевости V_p и теоремы 2.12 в [7] следует, что X имеет r -длину 1. Лемма доказана.

Теорема 2. Пусть X – конечная группа, $V = V_2 \times V_2$ и V_2 – абелева группа. Тогда X – разрешимая группа 2-длины 1.

Доказательство. Пусть $1 \neq K$ – характеристическая подгруппа в X . Предположим, что $K \subset X$. Тогда из теоремы 1 следует, что K и $X^* = X/K$ удовлетворяют условиям теоремы. Применение индукции дает нам, что K и X^* – разрешимые группы 2-длины 1. Тогда X – разрешимая группа и по лемме 1 она имеет 2-длину 1. Поэтому пусть $K = X$. В частности, $O(X) = 1$ и $O_2(X) = 1$. Поэтому X не является 2-скованной группой. Из предположения 1.24 и следствия 1.28 в [12] следует, что слой $E(X)$ группы X отличен от 1. Из $K = X$ следует, что $E(X) = K = X$ есть прямое произведение изоморфных простых неабелевых групп (в противном случае в $E(X)$ нашлась бы отличная от $E(X)$ неединичная характеристическая подгруппа). Так как $u^r = 1$, то

$$X = X_1 \times X_1^y \times \dots \times X_1^{y^i}.$$

Если $i < r-1$, то для $X_0 = X_1^{y^{r-1}}$ имеем

$$X_0 \subseteq X_1 \times X_1^y \times \dots \times X_1^{y^i} \subseteq C_X(X_0) = X,$$

что противоречит неабелевости X_0 . Поэтому либо $i = r-1$ и u переставляет X_1, \dots, X_{n-r} транзитивно, либо $X = X_1$. Если имеет место первый случай, то из предположения 3.27 (vii) в [13] следует, что $V = C_X(u) \cong X_1$ (Тогда V состоит из элементов вида $x \cdot x^y \cdot \dots \cdot x^{y^{r-1}}$, где $x \in X_1$). Это противоречит условию теоремы, что $V = V_2 \times V_2$. Поэтому пусть $X = X_1$ – простая неабелева группа.

Пусть T – u -инвариантная S_2 -подгруппа из X , $1 \neq H \text{ char } T$. Тогда по теореме 1 (7) и $L = N_X(H)$ есть u -инвариантная собственная подгруппа группы X . По индуктивному заключению L – разрешимая группа 2-длины 1. Так как $\Omega_1(Z(H)) = H_0 \text{ char } H$, то $L \subset N_X(H_0) = L_0$. Поэтому по теореме 1 (7) и L_0 – u -инвариантная подгруппа группы X . Так как $L_0 \subset X$, то по индукции L_0 – разрешимая группа 2-длины 1. Если $O(L_0) \neq 1$, то из теоремы 1 в [14] следовало бы, что X – известная простая группа. Поэтому предположим, что $O(L_0) = 1$. Но тогда L_0 – 2-замкнутая группа. Ввиду произвольного выбора H имеем, что $C(X, T) = N_X(T) \neq X$, где $C(X, T) = \langle N(H) : 1 \neq H \text{ char } T \rangle$. Если X – группа компонентного типа, то X – известная простая группа ([6], глава 5). Если же X – группа характеристического 2-типа, то ввиду $C(X, T) \subset X$ из [15] следует, что X – известная простая группа. Значит $X \in \text{Chev} \cup \{A_n | n \geq 5\} \cup \text{Spor}$. Группы из множеств $\{A_n | n \geq 5\} \cup \text{Spor}$ не имеют копростых автоморфизмов. Поэтому $X \in \text{Chev}$. Так как копростым автоморфизмом X является полевой автоморфизм ([16], таблица 5), то из заключения (1) теоремы (9-1) в [17] следует, что V – группа лиевского типа $G(q)$, а X – группа лиевского типа $G(q^r)$, где q – степень некоторого простого числа. Из теоремы 2.13 в [12] следует, что $V \cong G(q)$. Поэтому X не может быть простой группой. Противоречие. Теорема доказана.

В заключение выражаю признательность своему научному руководителю профессору Э.М. Пальчику за постоянное внимание к моей работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Huppert B.** Endliche Gruppen, I. Berlin: Springer-Verlag, 1967.
2. **Huppert B., Blackburn N.** Finite groups, II. – Berlin: Springer-Verlag, 1982.
3. **Huppert B., Blackburn N.** Finite groups, III. – Berlin: Springer-Verlag, 1982.
4. **Холл М.** Теория групп. М.: ИЛ, 1962
5. **Гарист Ю.Э., Пальчик Э.М.** О конечных группах, допускающих копростой автоморфизм // Вопросы алгебры. Гомель: Издательство Гомельского Государственного университета, 1997. Вып. 11. С. 20-26.

6. **Gorenstein D.** The classification of finite simple groups. Vol.1 : Groups of noncharacteristic 2 type. New York, London: Plenum Press, 1983.
7. **Rickman B.** Groups with a fixed-point-free automorphism of order p^2 // J.Algebra. 1979. Vol 59. № 1. P. 77 – 171.
8. **Гаген Т.М.** Некоторые вопросы теории конечных групп. // В кн. «К теории конечных групп». М.: Мир, 1979. С. 13-97.
9. **Глауберман Дж.** О разрешимых сигнализаторных функторах на конечных группах // В кн. «К теории конечных групп». М.: Мир, 1979. С. 112-143.
10. **Чунихин С.А.** Подгруппы конечных групп. Мн.:Наука и техника, 1964.
11. **Ведерников В.А.** О конечных группах с данными бипримарными подгруппами // В кн. «Конечные группы». Мн.: Наука и техника, 1975. С. 24-29.
12. **Горенштейн Д.** Конечные простые группы. Введение в их классификацию. М.: Мир, 1985.
13. **Gorenstein D., Lyons R., Solomon R.** The classification of finite simple groups // Math. Surveys and monographs, V. 40, N 2, Providence, RJ: AMS, 1994/
14. **Walter J.H.** The B-conjecture: characterization of Chevalley groups // Memoirs AMS, 1986. V.61. N 3. P.1-196.
15. **Solomon R.** Some results on standard blocks // "Santa-Cruz Conf. finite groups. Santa Cruz, Calif., 1979". Proc. Sumpos. pure math., 1980. V.37. P.43-46.
16. **Conway J., Curtis R., Norton S., Parker R., Wilson R.** Atlas of finite groups. Oxford: Clarendon Press, 1985.
17. **Gorenstein D., Lyons R.** The local structure of finite groups characteristic 2 type // Memoirs AMS.1983, N 276.

S U M M A R Y

The paper proves the following theorem: Let X be a finite group admitting automorphism γ of order r , $(X, \gamma) = 1$, $B = C_X(\gamma) = B_2 \times B_2$ and B_2 – Abelian group. Then X is solvable group 2-length 1.

Поступила в редакцию 25.01.2001

УДК 539.3

С.П. Кунцевич

Параметрические колебания оболочки вращения, близкой к цилиндрической

Благодаря своей легкости и прочности тонкие оболочки получили широкое распространение в инженерных конструкциях. Важной задачей на стадии проектирования таких конструкций является динамический расчет. Для оболочек, испытывающих периодические (силовые, температурные и др.) воздействия, во многих случаях определяющим является расчет на параметрическую устойчивость.

подавляющее большинство работ по параметрической неустойчивости тонких оболочек относится к тому случаю, когда геометрические и физические характеристики оболочки постоянны, а возбуждаемые колебания покрывают всю поверхность оболочки. Однако наличие косых краев, отклонения срединной поверхности от цилиндрической, неоднородность силового воздействия и ряд других факторов могут приводить к сильной локализации колебаний.